

SERIE 7.^a

NÚM. 50

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

PERIODICO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, DESTINADO AL FOMENTO DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y LAS LETRAS EN EL ECUADOR.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL
CONTENIDO.

Botánica, por el R. P. Luis Sodiro S. J.—*Zoología*, por el Sr. D. Vicente Ortoneda, Ayudante del Museo Zoológico.—*Documentos inéditos para la Historia de la Universidad de Quito*, editados por el Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar.—*Boletín Universitario*.

QUITO.

Imprenta de la Universidad Central del Ecuador.

1892.

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO.

SERIE VII. >

Quito, septiembre de 1892.

< NUMERO 50.

CIENCIAS

CRYPTOGAMAE VASCULARES QUITENSES.



[Continuatio. vid. pág. 50].

5. *D. Sprucei* Bk. *rhizomate* longe repente, sinuoso, squamis grumoso-concretis tecto; *stipitibus* segregatis, robustis, 30-50 ^{ct.} longis, squamis piliformibus, articulatis, fuscis consperso, ^{EA} iisque ^R delapsis, submuricato, scabro; *frondibus* elongato oblongis, deorsum angustioribus pinnatis vel pinnato-pinnatifidis, infra in rachibus, venis et margine glanduloso-pubescentibus, supra glabris; *rachi* subtereti, flexuosa; indumento stipitum; *pinnis* suboppositis, refractis et arcuato-falcatis, pinnatis vel profunde pinnatifidis; inferioribus plus minusve reductis; *segmentis* ligulatis vel lanceolato-acutis, 3-4 ^{ct.} longis, 1 - 1 ½ ^{ct.} latis, margine incisis vel lobulatis, basi lata rachibus adcreta; *venis* numerosis, pinnatis inferioribus plures furcatis; *soris* in sinubus marginis insidentibus; *involucro* patulo, limbo aequaliter truncato, vix bivalvi.

D. Sprucei Bk. loc. cit.

Rizoma sinuosamente rastrero, corto, arrugado por escamas conglutinadas en grumos y esparcido, así como los estípites, las raques, los nervios y el borde de las pinas, de pelos cortos, blandos y articulados; *estípites* apartados, en las plantas tiernas jugosos y cortos (igualando apenas la quinta parte de la fronde) en la adulta robustos, rígidos, casi cilíndricos, 40-60 ^{ct.} largos,

pulverulento-pubescentes, ásperos; *frondes* uno ó más metros largas, 40-60^{ct.} anchas, pinado ó bipinado-pinatífidas, oblongo-deltoides; *raquis* alargada, flexuoso-recorvada, con frecuencia en las axilas prolífera; *pinas* opuestas, distantes, recorvadas, arqueado-falcadas, más ó menos profundamente lobuladas ó divididas hasta la raquis en segmentos enteros ó, más ó menos, profundamente lobulados; las inferiores reducidas, venas pinadas, las inferiores repetidas veces bifurcadas; *soros* colocados en las sinuosidades del margen; *involucro* anchamente cupuliforme, con el limbo igualmente truncado, indistintamente bivalve.

Crece en lugares silvestres y muy húmedos de la cordillera occidental, entre 1500-2300 metros. s. m.

6. *D. divaricata* nov. spec. *rhizomate* repente hypogaeo; *stipitibus* remotis, nudis, glabris; *frondibus* ovatis vel late lanceolatis, bipinnatis, nudis, aut infra brevissime puberulis; *consistentia* herbacea; *pinnis* ovato-lanceolatis, subfalcatis, suboppositis, horizontaliter divaricatis, subsessilibus, infimis diminutis; *pinnulis* lanceolatis, sursum integris, acuminatis, deorsum inciso-lobatis, cum rachi late adnatis, basi inferiore obliqua, exsecta, superiore producta, cum rachi parallela; *soris* paucis, in sinibus lobulorum sitis; *involucri* valva superior maiore, supra sorum incurvata.

Rizoma leñoso, largamente rastrero, hipogeo; *estípites* apartados, desnudos, lampiños, 40-50^{ct.} largos; *frondes* aovadas ó anchamente lanceoladas, 40-90-1,30^{ct.} largas, 50-60^{ct.} anchas, de consistencia herbácea, firme, superiormente lampiñas, inferiormente pulverulento-pubescentes; *pinas* casi opuestas, subsésiles, ligeramente dislocadas, horizontalmente patentes, aovado-lanceoladas, casi falcadas, pinatifidas en el ápice; *pínulas* lanceoladas, acuminadas y casi enteras en el ápice, inferiormente de ambos lados remotamente inciso-lobuladas, con lóbulos obtusos ó truncados, adherentes á las raquillas, por la base enanchada; *base* inferior oblicuamente cortada, la superior prolongada, paralela con la raquilla; *soros* pocos y diminutos, colocados en los senos de las pínulas; *valva* superior del involucro, mayor y encorvada sobre el soro.

Crece en los bosques occidentales, del volcán "Pululahua" á 2000 metros. s. m.

7. *D. coronata*, nov. spec. *stipitibus* robustis, nudis 60-80^{ct.} longis; *frondibus* amplis, subdeltoides, herbaceis, glabris, bipinnatis; *pinnis* alternis remotis; *rachibus* gracilibus, supra pulverulento-tomentosis, elongato-lanceolatis; *pinnulis* linear-lanceolatis, apice angus-

tato-acuminatis, margine profunde pinnato-lobatis; *lobis* oblique deltoideo-ovatis, obtusis, subintegerrimis *soris* numerosis, secus marginem in seriem fere continuam dispositis; *involucro* caliciformi; *limbo* aequaliter truncato.

D. adiantoides, β *coronata* Sod. loc. cit. pag. 23.

Rizoma hipogeo, rastrero; *estípites* apartados, robustos, rígidos, desnudos 80-100^{ct.} largos; *frondes* vastas, subdeltaideas, bipinadas; *pinas* irregularmente alternas, apartadas, en el ámbito lanceoladas, las mayores, 50-60^{ct.} largas, 20^{ct.} anchas, lampiñas, herbáceas, con las raques desnudas, relativamente delgadas; *pínulas* lanceoladas, brevemente pecioladas, profundamente pinatífidas, largamente acuminadas en el ápice, las inferiores reducidas; *lóbulos* oblicuamente deltoideo-ovalados, obtusos y muy enteros; *venas* repetidas veces dicótomas, numerosas; *soros* numerosos, dispuestos en serie continua en ambos bordes de cada lóbulo; *involucro* herbáceo, al principio claramente bivalve, finalmente cáliciforme, con el limbo truncado.

Ciuce en la pendiente occidental, del volcán el "Corazón" entre 1600-2500 metros s. n.

8. *D. adiantoides* H. B. K. *rhizomate* hypogaeo, robusto, repente; *stipitibus* remotis, robustis, nudis, basin versus muricatis, 1-1,50^{ct.} longis, siccitate latere interiore trisulcis; *frondibus* amplis, bipinnato-pinnatifidis; *pinnis* suboppositis, divaricato patentibus, late lanceolatis, 50-60^{ct.} longis, circa medium 25-30^{ct.} latis; *consistentia* herbacea, subcartilaginea; *infra* in *rachibus* pinnulisque pulverulento-pubescentibus; *pinnis* infimis reductis; *pinnulis* suboppositis, elongato-lanceolatis, apice caudato-cuspitatis, profunde pinnatipartitis, infimis depauperatis; *laciniis* rhomboideis, margine posteriore integro, ceterum inciso-crenatis, infim's posticis majoribus; *soris* in sinubus lobulorum sitis, utrimque binis ternisve; *involucro* tenui, cartilagineo, apice aequaliter truncato.

D. adiantoides et D. erosa Hk. Sp. Fil. I. pag. 75.
D. adiantoides Hk. et Bak. Synopsis. pag. 52.

Rizoma hipogeo, robusto, largamente rastrero; *estípites* apartados, robustos, desnudos, casi lampiños, muricados inferiormente, radicantes en la base, largos 1-1,50^{ct.}, interiormente, después de secos, trisurcados; *frondes* vastas, 1,50-2^{mt.} largas, 1,30-1,50 anchas, bipinato-pinatífidas; *pinas* y *pínulas* casi opuestas, divaricato-patentes, anchamente lanceoladas, 50-60^{ct.} largas, hacia la mitad, 25-30^{ct.} anchas, consistencia herbácea, casi cartilaginosa, inferiormente en las raques y *pínulas* pulverulento-pu-

bescentes, las inferiores menores; *pinnulas* largamente lanceoladas y adelgazadas hacia el ápice, divididas casi hasta la raquis, en segmentos romboídeos, con el lado posterior entero, en la mitad inferior, el anterior inciso-lobulado; el superior afeastonado; los inferiores y posteriores más grandes; *soros* colocados en los senos de los segmentos, 4-8 en cada uno; *involucro* tenuemente cartilagíneo, cupuliforme, con el limbo igualmente truncado.

Crece en los bosques occidentales de la región subandina.

9. *D. Lagerheimii*, nov. spec. *rhizomate hypogaeo*, repente; *stipitibus* remotis rachibusque castaneis, setoso-tomentosis, denique glabris et minute muriculatis; *frondibus* deltoideo-ovatis, bipinnato-pinnatisectis; *pinnis* alternis, breviter petiolatis, ovali-lanceolatis, basi leviter constrictis, apice gradatim attenuatis; *pinnulis* subsessilibus, ovali-lanceolatis, apice acuminatis, usque ad rachin leviter alatam in laciniis subrhomboideo-ovatas, apice inciso-crenatas, margine lobulatas, divisis; *consistentia* dense cartilaginea; *venis* lobulorum subtus exculptis, nigrescentibus; *soris* in segmentorum sinibus sitis, in latere utroque plerumque binis vel ternis, parvis; *involucro* cartilagineo, cupuliformi, ore aequaliter truncato.

Rizoma hipogeo, brevemente rastrero; *estípites* distantes, así como las raques, de color castaño pajizo, cubiertos al principio de un tomento cerdoso, finalmente lampiños y ásperos por puntos sobresalientes; *frondes* deltoideo-aovadas, bipinato-pinnatisectas; *raques* tortuosas; *pinas* alternas, brevemente pecioladas, aovado-lanceoladas, adelgazadas gradualmente hacia la punta; *pinnulas* de igual forma que las pinas, alternas, con el lado inferior algo más ancho, brevemente pecioladas, divididas hasta las raques angostamente aladas, en segmentos aovado-romboídeos, obtusos y afeastonados en el ápice, inciso-lobulados en los bordes; *consistencia* densamente cartilaginosa; *venas* superiormente impresas, inferiormente sobresalientes; *soros* 4-8 en cada segmento, situados en los senos de los lóbulos; *involucro* cartilagíneo, con el borde igualmente truncado.

Crece en los bosques del volcán "el Corazón", entre 2000-2800 metros s. m.

Dedicamos esta especie á nuestro distinguido amigo y colega, Dr. D. Gustavo de Lagerheim, profesor de Bacteriología en la Universidad de Quito, y autor de varias publicaciones sobre las Criptógamas celulares.

10. *D. c. cutaria* Sw. *rhizomate* elongato, repente; *stipitibus* distantibus, nudis, robustis, 60-70^{ct.} longis; *frondibus* bipinnatis, amplis; *pinnis* suboppositis (iugis inter-

se distantibus); *pinnis* lanceolatis, caudato-acuminatis, fere usque ad *rachin* in segmenta oblongo-deltoidea pinnatifidis, superne glabris, inferne, cum rachibus, breviter pubescenti-tomentosis; *segmentis* inciso-pinnatifidis, basi posteriore exsecta, integra in *rachin* anguste decurrente, superiore producta cum *rachi* parallela; *margine* breviter inciso-lobatis; *soris* minutis, 2-12 in quoque segmento, in sinubus lobulorum sitis.

D. cicutaria Hk. Sp. Fil. I. pag. 76., *D. tenera* Presl. *D. ordinata* Kaulf. *D. cicutaria*. Hk. & Bk. loc. cit. pag. 53.

B. cicutarioides *segmentis* pinnularum profunde lobulatis, obtusis, fertilibus contractis; *soris* extra sinus in laciñis segmentorum sitis.

Rizoma largamente rastrero, robusto y provisto de raíces ramificadas y muy largas; *estípites* distantes, desnudos, robustos, acanalados del lado interior, 60-70^{ct.} largos; *frondes* bipinadas; *pinas* opuestas ó ligeramente dislocadas, divaricato-patentes, 40-50^{ct.} largas, 25-30^{ct.} anchas; *pinnulas* linear-lanceoladas, largamente prolongadas en el ápice, divididas hasta la raquis, ligeramente alada en segmentos oblongo-deltoídeos, obtusos ó truncados en el ápice, é inciso-lobulados en los bordes, la base inferior entera y escorrida en la raquis, la superior paralela con ésta; *soros* diminutos, colocados en las escotaduras de los segmentos.

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Creece con la especie anterior y en la zona tropical.

B. cicutarioideis. Estatura, proporciones y consistencia de la anterior; *segmentos* de tercer orden profundamente lobulados, más anchos y obtusos, los fértiles algo contraídos y casi coriáceos; los *soros* situados fuera del seno, en las laciñulas de los segmentos. *D. cicutarioides* Fee.

Varía además, en la consistencia, indumento y por tener los segmentos fértiles notablemente contraídos. A consecuencia de esta contracción resulta que los soros, en lugar de hallarse en las sinuosidades de los lóbulos, se hallan en el ápice de las laciñas. Modificación de suyo muy notable; pero deja de tener valor característico desde que se la observa muy á menudo en una misma planta y hasta en las diferentes partes de una misma fronde.

II. *D. apiifolia* Hk. "frondibus tripinnatis; *pinnis* inferioribus, 25-40^{ct.} longis, 15-20^{ct.} latis; *pinnulis* linearibus, usque ad *rachin* penitus divisis; *segmentis* infimis deltoideo-vel oblongo-rhomboideis, fere usque ad *rachin* in parte inferiori in lobulos profunde et acute dentatos, partitis; *consistentia* herbacea; *rachi* et superficie

utraque nuda aut fere nuda; *soris* in segmento qu^o
2-12, in imis loborum sinibus sitis; *involucro* subglobo que
cupuliformi, tertiam lineae partem diametro aequante^{oso},

D. apiifolia Hk. spec. 1º pag. 77. Hk. et. Bak: loc.
cit. pag. 53.

Frondes tripinadas; *pinas* inferiores, 25-40^{ct.} largas, 15-
anchas; *pínulas* lineares, partidas hasta la raquis en la parte²⁰ inferior en lóbulos profundamente dentados; *consistencia* h^e in-
cea; *raquis* y entradas superficies desnudas, ó casi desnudas;
soros 2-12 en cada segmento, situados en el fondo de los se-
gumentos; *involucro* subgloboso, cupuliforme, del diámetro de la tercera
parte de una línea.

Esta especie nos es todavía desconocida. Hemos tomado su
descripción de la obra: "Synopsis Filicum", por Hk. & Bak.
loc. cit.

12. *D. rubiginosa* Kaulf, rhizomate repente; est._{r.}
tibus remotis, rigidis, breviter pubescentibus, metrum et
ultra longis; frondibus amplis, tripinnatis, undique vil-
losis vel pubescentibus; pinnis infinitis, 70-80^{cc.} longis,
25-30^{cc.} latis, pinnulisque breviter petiolatis; pinnulis ultimis lanceolato-oblongis, obtusiusculis, fere usque ad ra-
chin in segmenta pinnatifido-lobata, subovata, apice ob-
tuso incisa, dissectis; soris in segmentorum sinibus sitis;
involucro cupuliformi, tenui, membranaceo.

D. rubiginosa Kaulf. Enumeratio Fil. pag. 226.,
Hk. loc. cit. pag. 79. tab. 27. A., Hk. & Bak. loc. cit. pag. 53.

Rizoma rastrero, robusto, escamoso; estípites distantes, rí-
gidos, robustos, lisos, así como las raques primarias, pulverulen-
to-pubescentes; frondes 1.50-2 metros largas, 1 metro 1,30 an-
chas, cuadripinatífidas, vellosas ó pubescentes, membranaceas;
pinas inferiores 70-80^{ct.} largas, 25-30^{ct.} anchas, oblongo-lanceo-
ladas, contraídas igualmente hacia la base y el ápice; *pínulas*
primarias brevemente pecioladas, oblongo-lanceoladas, divari-
cato-patentes; *raquillas* gráciles, endebles, angulosas; *pínulas*
secundarias subsésiles, con la base inferior oblicua, la superior ma-
yor y paralela con la raquilla, obtusas en el ápice y divididas
casi hasta la raquis en segmentos lobulados, obtusos e incisos
en el ápice; *soros* hasta 8 en los segmentos mayores, situados
en el seno de los lóbulos; *involucro* tenue, membranáceo, pu-
bescente, con la valva superior, al principio mayor y recorvada,
finalmente cupuliforme y con el limbo igualmente truncado.

Crece en los bosques subandinos y subtropicales de la región
occidental, hasta 2000 mts de elevación.

TRIBUS II. DAVALLIAE.

Sori globosi vel oblongi, laminae dorso vel margini, et venarum dorso vel apici incidentes; *involucrum* dimidiatum, basi lata vel punctiformi infra sorum affixum, lateribus, liberis vel laminae adnatis.

Soros globosos ó oblongos, marginales ó intramarginales, situados en el dorso ó en el ápice de las venas; *involucro* reducido á la mitad inferior, (siendo la otra reemplazada por el limbo de la fronde) reniforme ó suborbicular ó en forma de escama, con los lados libres ó adherentes al limbo del soro y la base ancha ó puntiforme, pegada debajo.

Helechos tropicales ó subtropicales, la mayor parte asiáticos, con *rizoma* hipogeo ó epígeo, por lo común, largamente rastreiro; los *estípites* distantes ó aglomerados, ya continuos ya articulados con el rizoma; *frondes* uniformes ó disiformes, herbáceas ó, más ó menos densamente cartilaginosas y divididas; *soros* marginales, ó más ó menos, aproximados al margen y colocados ya en el dorso, ya en el ápice de las venas; *involucro* herbáceo, cartilaginoso ó casi coriáceo, formado por una membrana ó escama tendida debajo del soro, de forma aovada, oblonga, orbicular ó arriñonada, soldada más ó menos anchamente en la base y en los lados con la lámina de la fronde.


 CLAVE DE LOS GÉNEROS.
AREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

- | | |
|--|--------------------------|
| <i>Soros</i> marginales ó intramarginales; <i>involucro</i> colocado en el ápice de las venas..... | 9. <i>Davallia</i> . |
| <i>Soros</i> colocados en el dorso de las frondes y de las venas; <i>involucro</i> suborbicular..... | 10. <i>Cystopteris</i> . |

G. 9. DAVALLIA Sm.

Sori marginales aut intramarginales, in apice venarum incidentes; *involucrum* forma et proportione variabile; *sporangia* pedicellata.

Soros marginales ó algo intramarginales; colocados en la extremidad de las venas; *involucro* redondo, oblongo ó reniforme, con los lados libres ó soldados, la punta siempre libre; *esporangios* pedicelados.

Frondes herbáceas ó cartilaginosas, de tamaño y divisiones variables; *venas* siempre libres, una ó más veces dicótomas; *rizoma* por lo común largamente rastreiro y escamoso.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

Involucro coriáceo, utriculiforme, adherido á la lámina por la base y por los lados; *soros* 1-2 en cada segmento.....

1. *D. thecifera*.

Involucro membranáceo, transversalmente oblongo; *soros* numerosos, marginales..... 2. *D. Saccoloma*.

1. *D. thecifera* H. B. K. *Rhizomate* brevi, erecto, squamoso; *stipitibus* congestis, basi squamosis, erectis, 8-12^{cc.} longis, herbaceis, viridibus; *frondibus* ovali-lanceolatis, acuminatis, bipinnatis. v. tripinnatifidis, stipite plerumque brevioribus, subcoriaceis, glabris; *pinnis* remotis, oblique subrhomboideis, longe petiolatis; *pinnulis* remotis, linearibus, simplicibus, vel bi-trifurcatis; *venis* solitariis; *soris* in margine interno, infra apicem cornutum segmentorum sitis *involucris* coriaceis, utricleformibus, margine integro rotundato.

D. concinna Hk. *Spec. I.* pag. 63. *D. concinna* Schrad. *apud Hk.* *ibid.* pag. 169. *D. Lindenii* Hk. *ibid.* pag. 193., *D. thecifera* H. B. K., *Hk.* et *Bk.* *ut supra* pag. 100.

Rizoma muy corto, carnoso, erguido, cubierto de escamas aovado-lanceoladas, acuminadas, reticuladas, laciniadas en el margen; *estípites* fasciculados, densos, esparcidos de escamas análogas á las del rizoma; finalmente, salvo la base, lampiños, erguidos, herbáceos, 8-12^{cc.} largos; *frondes* aovado-lanceoladas, angostadas en la base, acuminadas, bipinadas, ó tripinatifidas ordinariamente más cortas que los estípites; *raques primarias y secundarias*, comprimidas, superiormente estriadas, lampiñas, así como las pinas, esparcidas de escamas raras y caducas; *pinas* remotas, alternas, largamente pecioladas, subromboideas, acunadas en la base; *pinnulas* alternas, sencillas ó una ó más veces bifurcadas; segmentos últimos lineares; *soros* 1-2, situados en el margen interior y bajo el ápice encorvado hacia adentro de cada segmento; *involucro* utricular, oblicuo, redondeado en el margen; *esporangios* largamente pedicelados.

Crece adherido á los troncos vetustos, en la región subandina. Esporádicamente y bastante rara.

Observación: En nuestros ejemplares, son muy frecuentes, los esporangios abortivos, reducidos al pedicelo tan sólo, en forma de pelos articulados, ó al pedicelo, con rudimentos más ó menos desarrollados de la membrana del esporangio.

2. *D. Saccoloma* Spreng. *Rhizomate* repente, vel

scandente, setuloso et parce squamoso; *stipitibus* segregatis, robustis, nudis, secus basin setulosis, castaneo-nitidis; *frondibus* pinnatis, metrum et ultra longis, ovali-lanceolatis; *rachibus* rigidis, subteretibus, supra striato-nervosis, glaberrimis, castaneo-nitidis; *pinnis* elongato-lineari-oblongis, apice profunde inciso, acuminatis, deorsum argute denticulatis, basi integris, breviter petiolatis, utrimque glabris; *consistentia* dense cartilaginea; *venis* patentibus, utrimque exculptis, simplicibus aut semel furcatis; *soris* minutis in seriem continuam, secus utrumque marginem dispositis; *involucro* tenui cartilagineo.

*D. Saccoloma Spreng. apud Hk. loc. cit. pag. 171.
Hk. et Bk. loc. cit. pag. 77.*

Rizoma largamente rastrero ó trepador, esparcido de escamas raras y de pelos negros y cerdosos; *estípites* más ó menos distantes, cerdosos en la base, superiormente lampiños, lustrosos, ligeramente muriculados, marcados en la mitad inferior, con dos líneas laterales, sobresalientes, blanquecinas, 70-100^{cc.} largos; *frondes* aovado-oblongas, pinadas, 80-130^{cc.} largas, 40-50^{cc.} anchas; *raquis* rígida, casi rolliza, superiormente, estriado-nervosa, con líneas sobresalientes bajo la inserción de cada pina, de color castaño ó pajizo-brillante; *pinas* numerosas, alternas, largamente linear-lanceoladas, brevemente pecioladas, puntiagudas y desiguales en la base, argutamente denticuladas en la parte superior del margen, rematadas en el ápice en punta adelgazada y profundamente dentada, lampiñas, lustrosas, en ambas superficies; *consistencia* cartilaginosa ó casi coriácea; *venas* patentes y sobresalientes, de ambos lados; *soros* transversalmente oblongos, distribuidos en serie continua en ambos márgenes de las pinas; *involucros* tenuemente cartilaginosos, membranáceos, angostos y redondeados en el ápice.

Crece en la región tropical, entre 300 y 500 metros á las orillas del río Toachi.

GEN. 10. CYSTOPTERIS BERNH.

Sori globosi, hypophylli, dorso venarum impositi; *involucrum* tenue, membranaceum, suborbiculare, vel apice acuminato, basi ampla soro subtensum; *sorum* primum obtegens, demum apertum et reflexum.

Soros globosos, situados, en la página inferior de las frondes y en el dorso de las venas; *involucro* tenuemente membranáceo, jugoso, orbicular ó acuminado en el ápice, el margen

dentado ó ligeramente laciniado, adherido al limbo, por la base ancha, cóncavo y tapando al principio el soro, finalmente contraido y reflejado.

Helechos de pequeña talla, herbáceos y jugosos; *frondes* tiernas, membranáceas, y diversamente divididas; *venas* pinadas, repetidas veces dicótomas; *venillas* libres, terminadas dentro del margen.

1. *C. fragilis* Bernh. *Rhizomate breviter repente*, herbaceo; *stipitibus* dense cespitosis, semicylindricis, herbaceis, fragilibus, *præterquam ad basin*, ut raches frondesque glaberrimis; *frondibus* ovali-lanceolatis, tri-pinnatifidis; *pinnis* suboppositis, remotiusculis, deltoideo-ovatis, inaequilateris; *pinnulis* isomorphis, profunde pinnatifidis; *segmentis* subovatis, obtusis, lobulato-incisis; *lacinulis* apice retusis; *soris* 1-6 in segmento quoque, circa aut infra medium venularum sitis.

C. fragilis Bernh. *apud Hk. loc. cit. pag. 197. Hk.*
et Bk. loc. cit. pag. 103.

Rizoma herbáceo, brevemente rastrero, escamoso, en el ápice, densamente poblado de raíces tomentosas; *estípites* fasciculados, lampiños, pajizos, frágiles, 10-20^{cc.} largos; *frondes* aovalo-ó deltoideo-lanceoladas; *pínulas* inferiores, liguliformes, divididas hasta el eje central en segmentos oblicuamente romboideos ú oblongos, más ó menos profundamente laciniados; *lacinias* lineares, escotadas en el ápice; *soros* colocados cerca de la base de las vénulas.

ÁREA HISTÓRICA
Crece en lugares sombríos ^{INTER} y húmedos en toda la altiplanicie.

TRIBUS III. LINDSAYEAE.

Sori lineares vel oblongi, 'in laminae margine et in apice venularum siti; *involucrum*, bivalve, valvis rectis, angustis, extrorsum apertis.

Soros colocados en línea en el margen, ó casi en el margen de las frondes y en el ápice de las venas; *involucro* bivalve; *valva* interior membranácea, la exterior (que á veces en el género *Dictyoxiphium* es rudimentaria) formada por el margen de la fronde.

GÉNERO II. LINDSAYA Dryvand.

Caracteres de las tribus.

1. *C. trapeziformis* Dry. *Rhizomate breviter repente*; *stipitibus* rigidis, glabris, nitidis, angustatis, supra-

planis; *frondibus* rhombeo-ovatis, bipinnatis. undique glabris; *pinnis* utrinque 1-3. alternis, breviter petiolatis, lanceolatis, acuminatis, terminali majore; *pinnulis* numerosis, contiguis, subimbricatis, cartilagineo-membranaceis, breviter petiolatis, divaricato patentibus, 3-4^{ml.} latis, 10-20^{ml.} longis, infimis diminutis, latere interiore cum rachi parallelo, inferiore et superiore rectis aut curvatis, exteriore rotundato-obtuso aut truncato; *soris* linearibus, secus marginem exteriorem et superiorem dispositis; *involucro* margine integro, valva inferiore valde angusta.

L. quadrangularis Raddi apud Hk. loc. cit. pag. 214. *L. trapeziformis* Dry. ibid. et Hk. & Bk. loc. cit. pag. 107. cum aliis synonymis numerosis.

Estípites rígidos, robustos, lampiños, casi cuadrangulares, lustrosos, de tamaño variable; *frondes* romboideo-aoadas, bipinnadas, cartilagineo-membranáceas, lustrosas; *pinas* de ambos lados 1-3, erecto-patentes, brevemente pecioladas, oblongo-lanceoladas, adelgazadas, hacia el ápice, 10-20^{cc.} largas, 3-4^{cc.} anchas; *pínulas* romboideo-lineares, mutuamente aproximadas, casi empizarradas, 10-20^{ml.} largas, 3-4^{ml.} anchas, las inferiores frecuentemente menores y heteromorfas; (en nuestros ejemplares con el lado interior recto y paralelo con la raquis, el inferior y el superior, también rectos y enteros el exterior obtuso ó truncado); *soros* dispuestos en serie continua en el lado superior y en el exterior; *involucro* entero, con la valva inferior mucho más angosta que la superior.

EL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

CRECE EN LA ORILLA DEL RÍO TOACHI. RARA.

TRIBUS IV. PTERIDEAE.

Sori marginales vel leviter intramarginales, lineares, oblongi, reniformes seu orbiculares; *involucrum* superum, e margine superiore frondis producto et revoluto, plus minusve immutato, formatum, introrsum dehiscens, univalve aut rarius subbivalve.

Soros marginales ó ligeramente intramarginales, lineares; oblongos, arriñonados ó casi orbiculares, colocados en el ápice de las venas; *involucro* supero, bivalve, formado por el margen del limbo prolongado, revuelto y más ó menos transformado, raras veces bivalve, dehiscente hacia la parte interior.

CLAVE DE LOS GÉNEROS.

- I.** *Soros* adheridos á la cara interior del involucro, separados ó, raras veces, continuos..... *G. 12. ADIANTUM.*
- II.** *Soros* adheridos al margen del limbo; *involucro* formado por el margen replegado.
- A.** *Soros* más ó menos separados.
- Soros* colocados en los senos de los segmentos, casi redondos, *venas* libres..... *13. HYPOLEPIS.*
 - Soros* marginales ó intramarginales, al principio separados y redondos, finalmente más ó menos confluentes.
 - Involucro* distinto ó algo confluente, pero no continuo..... *14. CHEILANTHES.*
 - Involucro* casi continuo, inciso-afestonado, entre los soros..... *15. PELLEA.*
- B.** *Soros* lineares del todo continuos.
- Soros* marginales..... *16. PTERIS.*
 - Soros* intramarginales en línea continua, entre el nervio medio y el margen..... *17. LOMARIA.*
- III.** *Soros* lineares, laxos, situados en venas longitudinales entre el nervio medio y el margen; *esporangios* globuliformes apartados; *involucro* formado por el margen arrollado de la fronde..... *18. CERATOPTERIS.*

G. 12. ADIANTUM L.

Sori marginales, facie*i* interiori involucri reflexi adhaerentes, lineares, reniformes, hippocrepici vel discoidei, separati vel continui; *involucra* cum soris homomorpha.

Soros marginales, adheridos á la superficie interior del involucro doblado sobre la superficie inferior del mismo limbo; lineares ó arriñonados, hipocrépicos ó discoideos, separados ó continuos; *involucro* de igual forma que los soros.

Helechos de estatura mediana, con rizoma rastrero ó erguido. *Estípites* erguidos, rígidos y quebradizos, de color castaño ó negro, por lo común desnudos y lustrosos; *frondes* ordinariamente pinadas, raras veces sencillas ó dicotómicamente flabeladas; *segmentos* últimos, herbáceo-cartilaginosos, las más veces romboidales, de ordinario insertados excéntricamente con el pecíolo; *nervio primario* poco sobresaliente, diagonal respecto al segmento, ó contraido al lado inferior, en cuyo caso parece existir sólo una mitad de los segmentos (segmentos demidiados) ó divididos dicotómicamente desde la base; *venas* secundarias repetidas veces bifurcadas desde la base del segmento y desde el nervio principal y, ó del todo libres (*Euadiantum*), ó reticuladas ó anastomosadas hacia el margen (*Edwardia*).

CLAVE DE LAS ESPECIES.

§. 1º (EUADIANTUM) venas libres (no anastomosadas ó reticuladas). dicótomas.

I. Involucros en líneas marginales, continuas ó ligeramente interrumpidas; frondes 1-2-pinadas.

A. Pinas (las sencillas) opuestas, no demediadas; soros en los bordes, del lado superior y exterior. 1. *A. macrophyllum*.

B. Pinas alternas, más ó menos distintamente demediadas.

a. Frondes 1-2-pinadas; estípites y raques lampiños; soros ordinariamente sólo en el borde superior, raro en el exterior. 2. *A. incisum*.

b. Frondes bipinadas; estípites y raques tomentosos; soros sólo en el borde superior. 3. *A. pulverulentum*.

II. Involucros separados, oblongos, reniformes ó discoídeos; frondes 1-4 pinadas.

A. Frondes 1-2-pinadas; segmentos últimos no demediados; soros en el margen superior y exterior.

a. Frondes pinadas (raro bipinadas); estípites filiformes, lampiños; raques pubescentes.

1. Soros curvados, separados; pinas inferiormente glaucescentes. 4. *A. Kaulfussii*.

2. Soros casi rectos, poco separados; pinas, aun inferiormente, verdes. 5. *A. obliquum*.

b. Frondes bipinadas; estípites robustos, lampiños ó tomentosos; raques tomentosas. 6. *A. intermedium*.

B. Frondes 2-3-pinadas; segmentos demediados, romboídeos, no flabeliformes.

a. Estípites y frondes lampiños; frondes 2-3-pinadas.

1. Soros reniformes, situados entre los lóbulos de los segmentos. 7. *A. sinuosum*.

2. Soros oblongos, numerosos, contiguos, colocados en ambos márgenes de los segmentos. 8. *A. trapeziforme*.

3. Soros discoídeos ú oblongos; segmentos casi enteros, inferiormente glaucescentes. 9. *A. glaucescens*.

b. Raques y frondes más ó menos velludas; frondes 2-3-pinadas.

1. Estípites desnudos, lustrosos; frondes tripinadas; soros reniformes. 10. *A. Henslovianum*.

2. Estípites tomentosos; frondes bipinadas; soros oblongos ó reniformes. 11. *A. tetraphyllum*.

C. Frondes 2-4-pinadas; píñulas últimas flabeladas; involucros reniformes ó lineares.

a. Involucros discoídeo-reniformes ú oblongos.

a. Píñulas últimas distintamente pecioladas; frondes deltoioides, 3-4-pinadas.

1. Píñulas últimas con el lado superior redondeado, ligeramente lobulado.

* *Involucros* reniformes, más ó menos abiertos, colocados en los senos interlobares de los segmentos..... 12. *A. aethiopicum*.

** *Involucros* redondos ó transversalmente oblongos, situados en los lóbulos de los segmentos..... 13. *A. tenerum*.

2. *Pínulas* últimas con el lado superior distintamente lobulado; lóbulos incisos y en las incisiones soríferos; *soros* 2-6 por cada pínula.

* *Involucros* discoídeos; *segmentos* últimos con la base inferior truncada, formando línea recta con el pecíolo, la superior incumbente á la raquis..... 14. *A. Wagneri*.

** *Involucros* reniformes; *segmentos* últimos cuneiformes..... 15. *A. cuneatum*.

3. *Pínulas* últimas, al menos las inferiores de cada pina, sésiles ó casi sésiles

1. *Pínulas* inferiores equiláteras, sésiles, apegadas á la raquis.

* *Frondes* ovato-deltoídeas, tripinadas, 30-40^{cc.} largas; *pínulas* superiores brevemente pecioladas.....

..... 16. *A. concinnum*.

** *Frondes* oblongas, tripinadas, casi trepadoras; muy largas; *raques* flexuosas; *pínulas* todas casi sésiles.....

..... 17. *subvolubile*.

2. *Frondes* deltoídeas tripinadas; *pinas* inferiores horizontalmente patentes; *pínulas* casi todas sésiles.....

..... 18. *A. colpodes*.

b. *Involucros* en láminas lineares, al rededor de los segmentos, excepto en la base; *estípites* trepadores, muy largos.....

ÁREA HISTÓRICA

..... 19. *A. digitatum*.

D. *Divisiones* primarias de las frondes dicótomas; ramos últimos pinados; *segmentos* demediados, incisos; *soros* discoideo-reniformes..... 20. *A. patens*.

2. (HEWARDIA) *Venas* reticuladas; *frondes* pinadas; *pinas* lanceoladas, enteras; *nervio* medio distinto; *soros* en línea continua en ambos márgenes de las *pínulas*.....

..... 21. *A. dolosum*.

§. 1. (EUADIANTUM) *Venas* libres, dicótomas; *frondes* una ó más veces pinadas.

1. *A. macrophyllum* Swartz. *rhizomate* brevi, crasso, lignoso; *stipitibus* congestis, 12-30^{cc.} longis, erectis, nigris, nitidis; *frondibus* 12-20^{cc.} longis, 8-12^{cc.} latis, pinatis (raro bipinnatis); *pinnis* oppositis. (in *frondibus* bipinnatis alternis), subsessilibus, 4-7-jugis; *sterilibus* basi superiore cum rachi parallelis, rotundata; inferiore subcuneata, exsecta; *fertilibus* plerumque angustioribus,

integratis, acuminatis; rachibus subcylindricis, ebeneis, nudis; soris secus marginem superiorem et exteriorem in lineas continuas digestis.

Hk. Sp. II. pag. 3., Hk. et Gr. Ic. tab. 132., Hk. et Bk. Syn. pag. 121.

Rizoma robusto, flexuoso, brevemente rastrero, cubierto de escamas densas, angostamente lineares; estípites aproximados, erguidos, rígidos, negros, lustrosos; frondes 12-30^{cc.} largas, 8-12^{cc.} anchas, pinadas ó, (las fértiles) bipinadas, lampiñas, de consistencia cartácea, verdes ó, cuando tiernas, de color rosado; pinas opuestas ó (en las frondes bipinadas) alternas, brevemente pecioladas, (las estériles) oblicuamente aovadas, con la base superior paralela á la raquis, obtusa; la inferior divergente, truncada y cuneiforme; margen del lado superior y del exterior lobulado-dentado; nervación desde la base flabeliforme; nervio medio poco distinto. Las fértiles más largas, adelgazadas hacia el ápice, rómbicas ó, diversamente modificadas en la base; las frondes bipinadas con una ó dos pinas pinadas en cada lado y la terminal mucho mayor; soros dispuestos en líneas continuas en el lado superior y exterior; en las frondes bipinadas casi sólo en el superior.

Crece en los bosques de la región tropical y subtropical, desde el nivel del mar, hasta 1.400 metros. Frecuente.

2. A. incisum Presl. rhizomate breviter repente, lignoso; stipitibus congestis, rigidis, ebeneis, nitidis, 15-40^{cc.} longis; frondibus pinnatis aut bipinnatis, 15-30^{cc.} longis; 5-20^{cc.} latis; consistentia herbacea aut papyracea; rachi castaneo-aut ebeneo-nitida, supra tomentosa; pinnis (simplicibus) alternis, breviter petiolatis, oblique linear-i-oblongis, basi inferiore cuneiformi, superiore recta, cum rachi parallela; margine superiore et exteriore duplicato-inciso-dentatis; fertilibus angustioribus, longioribus, sursum plus minusve falcatis et acuminatis; soris in lineam continuam, secus marginem superiorem, raro etiam exteriorem, dispositis; venis e basi flabellatis; mesoncuro indistincto, a basi ad apicem pinnae producto. In frondibus bipinnatis; pinnis utrinque 2-5. pinna terminali maiore; pinnulis subintegris.

Hk. loc. cit. pag. 16.; Hk. et Bk. loc. cit. pag. 122.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, cubierto de escamas negras y cerdosas; estípites fasciculados, rígidos, negros, lustrosos, esparcidos en la base de escamas caducas, 15-20^{cc.} largos en las formas pinadas, 25-40^{cc.} en las bipinadas; frondes lampi-

ñas, pinadas ó bipinadas; las primeras, 15-30^{cc.} largas, 4-8^{cc.} anchas; las segundas, 15-40^{cc.} largas, 15-25^{cc.} anchas; consistencia herbácea ó cartácea cuando secas; *raques* de color negro ó castaño, lustrosas, superiormente tomentosas; *pinas* alternas, numerosas, brevemente pecioladas; en la forma pinada oblicuamente lanceoladas ó linear-oblongas, con la base inferior cuneiforme, truncada, la superior recta y paralela con la raquis; *margen* superior y exterior doblemente inciso-dentados; *venas* flabeliformes desde la base; *vena media* poco marcada, extendida desde la base hasta el ápice de las *pinas*; *pinas* fértiles, algo contraídas, más angostas y más largas, casi rectas ó encorvadas hacia arriba ó falcadas, adelgazadas en la parte superior estéril, doblemente dentadas; *soros* en linea continua en la mitad ó los dos tercios inferiores del lado superior, raras veces aun en el exterior. Las frondes bipinadas con 2-5 *pinas* de cada lado, la terminal mayor, las *pínulas* casi enteras.

Crece en la región tropical y subtropical en Balao, Guayaquil, Bodegas, Nanegal, etc.

Observación. Las frondes bipinadas son siempre fértiles y raras veces se encuentran solas, casi siempre van acompañadas por otras, ya estériles, ya fértiles, simplemente pinadas. Parecen pues, aludir al estado más adulto de la planta. Lo mismo se observa aún en otras especies.

3. *A. pulverulentum* L. *rhizomate* breviter repente, crasso, lignoso; *stipitibus* remotiusculis, rigidis, ebenis, leviter tomentosis, 30-40^{cc.} longis; *frondibus* bi-pinnatis *pinnis* utrimque 3-6^{cc.} alternis, terminali parum majore; *rachi* *rachillisque* tomentosis; *pinnis* elongato-lanceolatis, 10-20^{cc.} longis, 2-4^{cc.} latis, apice acuminate; *pinnulis* glabris, dimidiatis, subrhomboides, breviter petiolatis, contiguis, basi superiore cum rachi parallela, margine superiore et exteriore denticulato; *soris* linearibus, crassis, in parte media inferiore lateris superioris locatis.

Hk. loc. cit. pag. 6.; Hk. et Bk. loc. cit. pag. 122.

Rizoma breve y horizontalmente rastrero, robusto, leñoso, marcado por la base supérstite de los estípites vetustos caídos; *estípites* poco distantes, rígidos, erguidos, negros, inferiormente escamosos, así como las *raques* y *raquillas* ligeramente tomentosas; *frondes* bipinadas, con 3-6 *pinas* de cada lado y la terminal algo mayor; *pinas* alternas, largamente lanceoladas, 10-20^{cc.} largas, 2-4^{cc.} anchas, erecto-patentes, acuminadas en el ápice; *pínulas* lampiñas, brevemente pecioladas, dimidiadas, subrómbicas, con la base superior paralela con la *raquilla*, denticuladas en el margen superior y exterior, el inferior entero; *consis-*