

BOTANICA

CRYPTOGAMAE VASCULARES QUITENSES.

AUCTORE,

ALOISIO SODIRO, S. J.

(Continuatio. vid. pág. 276).

Rizoma erguido, raras veces oblicuo, leñoso, cubierto en el ápice con escamas linear-lanceoladas, acuminadas, negruzcas; *estípites* fasciculados, más ó menos densos, comprimidos, cenicientos ó parduzcos, escasamente escamosos en la base, superiormente alados ó marginados, á veces en toda su extensión; *frondes* herbáceo-membranáceas, oblongo-lanceoladas, más ó menos angostadas en la base y en el ápice; *raques* medianamente firmes, redondeadas en el dorso y recorridas en los lados por una ala herbácea interrumpida entre las pinas y comunmente radicales en el ápice; *pinas* lanceoladas, rectas, ó más comunmente falcadas, obtusas, puntiagudas ó acuminadas en el ápice; la *base* inferior brevemente acunada, la superior truncada, paralela con la raquis y más ó menos largamente auriculada; *pinnas inferiores* conformes y menores, flabeladas y con la base superior ó entrambas auriculado-lobulada; *venas* numerosas, erecto-patentes, indivisas, salvo las de la base superior, que son 1-2 veces bifurcadas; *soros* lineares, rectos, ordinariamente 6-9, á veces más, de cada lado, terminados debajo de la base de los respectivos dientes y contiguos con el nervio medio; *involucros* lineares, cartilagíneos, enteros, persistentes.

Especie generalmente difusa en todos los bosques de la cordillera occidental, desde 400 hasta 3.600 metros.

β. pteropus estípites 6-8^{ct}. largos, gráciles, alados hasta cerca de la base; *frondes* membranáceas; *raques* gráciles, flexibles y anchamente aladas; *pinas* tenuamente membranáceas; *soros* menores que en la forma principal.

Crece en el valle de Pallatanga, cerca del Puente de Chimbo.

Observación: Todos los ejemplares que tenemos de esta especie, tienen las raques y, al menos la parte superior, de los estípites, aladas ó marginadas y la extremidad de las frondes casi todas

radicantes, excepto en la forma β , en la cual es constantemente pinatifida. La afinidad, pues, con la especie *A. alatum* es manifiesta en la forma típica. Las diferencias más sensibles y constantes parecen consistir en la forma de la base de las pinas, casi simétrica en la primera y asimétrica en la segunda, las *venas* son sencillas en ésta y terminadas cada una en un diente de las pinas mientras en la anterior las venas son bifurcadas y los dos ramos terminan juntos en cada diente. La forma β se distingue además por el aspecto decididamente diverso del de la típica y por la debilidad y color más intenso de sus frondes. Nuestros ejemplares de cada forma coinciden perfectamente con la figura de Hooker *loc. cit.* tab. 177, lo que manifiesta su estabilidad. A nuestro parecer debería tenerse por especie propia.

18. *A. harpeodes* Kze; *rhizomate* brevi, oblicuo lignoso, apice squamis linearibus, subulatis, atris dense stipato; *stipitibus* dense fasciculatis, subcylindricis, rigidis, ebeneis, 8-12^{ct.} longis; *frondibus* elongato-lanceolatis, 30-50^{ct.} longis, 5-8^{ct.} latis pinnatis, herbaceis glabris; *rachibus* subcylindricis, ebeneis, nitidis, secus latera linea herbacea signatis; *pinnis* e basi truncata, sursum angustatis, rectis vel falcatis, plerumque plus minusve acutatis vel acuminatis; *basi* inferiore longius breviusve cuneata, superiore truncata, cum rachi parallela; *pinnis* inferioribus remotioribus, conformibus sed diminutis, saepe utrinque auriculatis; *venis* conspicuis, erecto-patentibus, in basi superiore bifurcatis, ceteris simplicibus, singulis in dentibus singulis distributis, ante marginem desinentibus; *soris* linearibus, utrinque 8-12; nervo medio approximatis, longe ante marginem desinentibus; *involucris* angustis, tenuibus, pallescentibus.

A. erectum var. *harpeodes* Hk. *Sp. III.* pag. 126, tab. 178; *A. harpeodes* Kze in *Linnaea* 18 pag. 329.

Rizoma robusto, breve, erguido ó ascendente, densamente cubierto en el ápice por escamas linear-alesnadas, muy negras; *estípites* densamente fasciculados, 8-12; y hasta 20^{ct.} largos, rígidos, lustrosos, á veces pubescentes en la base; *frondes* pinadas, largamente oblongo-lanceoladas, herbáceas, lampiñas, 30-50^{ct.} largas, 5-8^{ct.} anchas; *raques*, como los estípites, negro-ó castaño-lustrosas, cilíndricas, flexibles, recorridas en los lados superiores por dos líneas verdes; *pinas* lanceoladas, por lo común falcadas, puntiagudas, acuminadas ó largamente cuspidadas en el ápice, raras veces simétricas y obtusas; la base inferior más ó menos largamente ácuñada, la superior truncada, paralela con la raquis y más ó menos auriculada; *pinas* inferiores más distantes, por lo común de la misma forma que las superiores, pero

reducidas, más cortas y con entrambas bases simétricas y auriculadas; *venas* sensibles; las de la base superior 1-2 veces bifurcadas, las demás sencillas y distribuidas una por cada diente de la pina y terminadas dentro del margen; *soros* lineares aproximados al nervio medio y terminados hacia la mitad de la parte respectiva de la pina; *involucros* angostos, lineares, muy delgados, blanquecinos.

Crece en los bosques de la región subandina, en las provincias de Quito y Riobamba; ítem en la de Cuenca (Rimbach, F. n.º 15).

Observación: Esta especie es considerada por Hooker y por Baker como variedad de la anterior. Los puntos de contacto que tiene con ella se reducen: en tener las pinas igualmente dentadas, las venas simples é igualmente distribuidas en dichos dientes y en la forma igual de los soros. Se distingue en la naturaleza y tegumento del rizoma, en la forma, consistencia, color de las raques y de los estípites y finalmente, en que las alas de las raques, interrumpidas en la primera al pie de cada pina, son continuas en la segunda. Estas diferencias parecen suficientes, para reconocerla como especie distinta.

19. *A. Pululahuae* Sod. *rhizomate* erecto, lignoso, squamis linearibus, subulatis dense oblecto; *stipitibus* fasciculatis, glabris, semicylindricis, 15-20^{ct.} longis, ut raches, fere usque ad basin anguste alatis; *frondibus* herbaceis, viridibus, ex ovata basi lanceolatis, pinnatis apice pinnatifidis, 50-60^{ct.} longis, 10-12^{ct.} latis; *rachibus* dorso rotundatis, antroorsum sulcatis; *pinnis* utrinque 20-40, horizontaliter patentibus, 4-6^{ct.} longis, ad basin 10-12^{ml.} latis; *basi* inferiore cuneatim exsecta, superiore truncata, auriculatim producta, cum rachi parallela; latere superiore et exteriori incisodentatis; *pinnis* inferioribus parum diminutis; *venis* in basi superiore, bis bifurcatis, ceteris simplicibus, subrectis, singulis in dentes singulos distributis; *soris* linearibus, elongatis, nervo medio approximatis, prope dentium basin desinentibus, in basi superiore plerisque diplaziodeis; *involucro* lineari, tenuiter cartilagineo, albido.

Sod. Recensio & pag. 33.

Rizoma leñoso, erguido, robusto, densamente cubierto en toda su extensión de escamas negruscas, linear-alesnadas; *estípites* fasciculados, erguidos, robustos, así como las raques, redondeados y grises en el dorso, anteriormente complanados y recorridos en los lados hasta corta distancia de la base por un ala herbácea, angosta; *frondes* pinadas, pinatifidas en el ápice, des-

de la base aovada largamente lanceoladas, 50–60^{ct.} largas, 10–12^{ct.} anchas, herbáceas, verdes, lampiñas, inferiormente pálidas; *pinas* lanceoladas, falcadas, gradualmente adelgazadas desde la base hacia el ápice; *base* inferior acunado-cóncava, entera, la superior truncada, auriculada y paralela con la raquis, á veces más ó menos profundamente separada del cuerpo de la pina; *margen superior y exterior* profundamente inciso-dentados; los dos ó tres pares inferiores algo menores, y conformes con los demás; *venas* de la base superior dos veces bifurcadas, las demás sencillas, erguidas, distribuídas por cada diente y terminadas antes del ápice de éstos: *soros* lineares, aproximados al nervio medio y terminados debajo de la base de cada diente, los de la base superior ordinariamente diplazoideos; *involucro* linear, tenuemente cartilágineo, blanquecino.

Crece en los bosques del volcán Pulu'ahua, entre 2.100 y 2.400 metros.

Observación: Especie evidentemente afine al *A lunulatum*, sea por el aspecto, como por la conformación de las pinas, naturaleza y distribución de las venas y forma de los soros. Sin embargo, se diferencia por las escamas del rizoma, forma y proporciones de las frondes y por los soros de la base superior diplazióideos.

20. *A. abscissum* Willd. *rhizomate* brevi, lignoso, erecto, apice squamis linearibus vestito; *stipitibus* fasciculatis, rigidis, cinereis, glabris, 10–15^{ct.} longis; *frondibus* lanceolatis, pinnatis herbáceis, viridibus, glabris, 15–30^{ct.} longis, 5–8^{ct.} latis; *rachibus* gracilibus, apteris, griseis; *pinnis* utrinque 12–20, 2–5^{ct.} longis, obtusis vel acutiusculis, basi inferiore cuneata, superiore recta, cum rachi parallela, latere superiore et exteriori inciso-crenato; *venis* inferioribus furcatis, ceteris simplicibus, erecto-patentibus; *soris* linearibus longiusculis, nec nervum medium nec marginem attingentibus; *involucro* membranaceo integro, nudo.

A. firmum Kze. *Hk. sp. III. pag. 134; A. abscissum* Willd., *Hk. & Bak. Syn. pag. 203.*

Rizoma leñoso, breve, erguido, cubierto en el ápice por escamas negro-parduzcas, lineares, rígidas, pequeñas; *estípites* fasciculados, erguidos, rígidos, cenicientos, lampiños, 10–15^{ct.} largos; *frondes* herbáceas, lanceoladas ú oblongas, 15–30^{ct.} largas, 5–8^{ct.} anchas, pinadas, á veces radicantes en el ápice; *raques* rígidas, gráciles, lampiñas, desnudas ó ligeramente marginadas por la base escorrida de las pinas; *pinas* 12–20 de ambos lados, sésiles ó muy brevemente pediceladas, divaricato-patentes, 2–4^{ct.} largas, 6–8^{ml.} anchas, obtusas ó acuminadas en el ápice; *base* in-

ferior acuñada ó cóncava, la superior truncada, paralela con la raquis, más ó menos distintamente auriculada, el lado superior y el exterior inciso-crenados; pinas inferiores casi iguales á las intermedias, más sensiblemente pecioladas; *venas* erecto-patentes, las superiores indivisas, las inferiores bifurcadas; *soros* dispuestos en dos series regulares, 6-12 de cada lado, igualmente aproximados al nervio medio y al margen; *involucro* membranáceo, entero, persistente.

Crece en toda la América tropical.

21. *A. cultrifolium* L. "*stipitibus* 10-15^{ct} longis, nudis, cinereis, rigidis; *frondibus* 15-30^{ct}. longis, 8-10^{ct}. latis, pinnatis, apice pinnatifidis, herbaceis; *pinnis* utrinque 6-10, 8-10^{ct}. longis, 6-9^{ml}. latis, acutis vel acuminatis, margine late dentatis, deorsum quandoque lobatis; *basi* superiore truncata, cum rachi parallela; inferiore oblique cuneata; *venis* remotis, gracilibus, plerumque unifurcatis; *soris* nervo medio et margini approximatis, saepe diplazioideis."

Hk. Sp. III pag. 110; Hk. & Bk. Syn. pag. 203. Diplazium cultrifolium Fée, Mem. XIª pag. 42.

Estípicas rígidos, desnudos, cenicientos 10-15^{ct} largos; *frondes* deltoídeo-aovadas, herbáceas, pinadas pinatifidas ó lobuladas en el ápice, 15-30^{ct}. largas, 8-10^{ct}. anchas; *pinas* 6-10 de cada lado, 8-10^{ct}. largas, 6-9^{ml}. anchas, puntiagudas ó acuminadas en el ápice, con la base superior truncada, paralela con la raquis; la inferior oblicuamente truncada; *margen* anchamente dentado, á veces lobulado hasta la raquis en el lado superior; *venas* finas, distantes; ordinariamente una sola vez bifurcadas; *soros* á poca distancia entre el nervio medio y el margen, á veces diplazioideos.

Crece, según Hk. & Bak., cerca de Guayaquil.

22. *A. anisophyllum* Kze. *rhizomate* breviter repente, squamis membranaceis, lanceolatis, castaneis, apice obtecto; *stipitibus* fasciculatis, robustis, rigidis, griseo-nitidis, deorsum squamosis, 15-30^{ct}. longis; *frondibus* pinnatis, apice pinnatifidis, dense herbaceis, pallide viridibus, 30-40^{ct}. longis, 10-15^{ct}. latis; *rachi* compressa, cinerea, nuda vel sparse squamulosa, sursum quandoque prolifera; *pinnis* numerosis (utrinque 15-30), petiolatis, lanceolato-falcatis, apice acuminatis, 4-8^{ct}. longis, 1-1 ½^{ct}. latis; *basi* inferiore cuneato-excisa, superiore truncata, fere cum rachi parallela, margine superiore et exteriori duplicato-inciso-dentato, apicem versus profunde inciso;

venis erecto-patentibus, bifurcatis; *soris* oblongo-ellipticis, nervo medio approximatis, a margine remotis, *involutro* membranacio, integro, nudo, persistente.

Hk. Sp. III. pag. 111 Hk. & Bk. Syn pag. 204; Bk. Flor. Bras. vol. I. parte IIª pag. 437.

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas lanceoladas, membranáceas, de color castaño; *stipites* más ó menos aproximados, robustos, rígidos, 15-20^{ct.} largos, de color ceniciento, escamosos en la base, superiormente lampiños ó esparcidos de pocas escamas filamentosas; *frondes* pinadas, oblongo-lanceoladas, 30-40^{ct.} largas, 10-15^{ct.} anchas, densamente herbáceas, lampiñas, pálido-verdes; *raques* delgadas, rígidas, lampiñas ó ligeramente fibrilosas, ápteras superiormente marginadas por la base escorrida de las pinas y con frecuencia prolíferas; *pinas* numerosas, pecioladas, alternas, lanceolado-falcadas, acuminadas ó largamente cuspidadas en el ápice, con la base inferior acuñada, la superior, oblicuamente truncada; el margen superior y el exterior en la mitad inferior de las pinas duplicado-incisodentado; en la mitad superior más profundamente dentado; pinas inferiores iguales ó poco menores que las intermedias; *venas* bifurcadas á poca distancia del nervio medio y terminadas cada una en un diente del margen, las superiores indivisas; *soris* oblongo-elípticos, aproximados al nervio medio, distantes del margen, contraídos ordinariamente á la mitad ó las dos terceras partes de cada pina; *involutro* cartilaginéo, desnudo, entero persistente.

Crece según Hk. fil. y Darwin en el archipiélago de Galápagos.

23. *A. auriculatum* Sw. *rhizomate* brevi, lignoso, cum stipitum basi, squamis lanceolatis, brunneis, rigidis, obtecto; *stipitibus* congestis, erectis, griseis, sursum marginatis, glabris, 8-15^{ct.} longis; *frondibus* pinnatis, apice pinnatifidis, subcoriaceis, glabris, ex ovata basi lanceolatis; *rachibus* compressis, ancipitibus, nudis, *pinnis* utrinque 10-20, pedicellatis, patentibus, 3-6^{ct.} longis 1-2^{ct.} latis, rectis vel falcatis, lanceolatis, apice acutis aut acuminatis, raro obtusis, margine crenatis; basi inferiore cuneato-truncata, superiore in auriculam rotundatam rachi plus minusve incumbentem producta; *nervio medio* longe ante pinnarum apicem resoluta; *venis* immersis, inconspicuis, suberectis, bis-terve bifurcatis; *soris* lineari-bus, nervo medio approximatis, a margine remotis; *involutro* angusto, crasso, integro.

Hk. sp. III. pag. 118 tab. 171; Hk. & Bk. Syn. pag. 203; Bk. Flor. Bras. vol. I. parte 2ª pag. 440.

Rizoma corto, leñoso, oblicuo, cubierto en el ápice (así como las bases de los estípites), de escamas membranáceas, lanceoladas; alesnadas, parduzcas; *estípites* fasciculados, rígidos, 8-15^{ct.} largos, cenicientos, lampiños, superiormente recorridos en cada lado por una línea callosa; *frondes* pinadas, 15-30^{ct.} largas, 5-10^{ct.} anchas, aovado-lanceoladas, membranáceas ó casi coriáceas, lampiñas, pina terminal entera ó lobulada; *raques* comprimidas, ancípites; *pinas* pecioladas, lanceoladas, rectas ó falcadas, puntiagudas ó acuminadas en el ápice, raras veces obtusas, irregularmente crenadas en el margen, con la base inferior oblicuamente truncada, la superior acorazonada y prolongada en aurícula redonda, cruzada con la raquis; *venas* inmersas; poco sensibles, dos ó tres veces bifurcadas, casi erguidas; *soros* lineares, inmersos, aproximados al nervio medio y contraídos á la mitad inferior de las pinas; *involucro* muy angosto, denso, linear, entero, persistente.

Crece en los bosques subandinos y subtropicales de la cordillera occidental en Nanegal, Mindo, Sto. Domingo, etc. En los bosques de Archidona (Jameson).

24. *A. pimpinellifolium* Fée; *rhizomate* filiformi, elongato, flagellifero, gemmas vage protrudente; *stipitibus* fasciculatis, viridibus, glabris undique marginatis, 3-5^{ct.} longis; *frondibus* ovali-lanceolatis, crasse herbaceis, pinnatis, apice irregulariter pinnatifidis glabris; *rachibus* viridibus, compressis, marginatis; *pinnis* utrinque 6-5, petiolatis, divaricatis vel (inferioribus) reflexis, asymmetricis, apice obtusis, margine inciso-crenatis; *basi* inferiore oblique cuneata vel continua, superiore truncata, cum rache parallela, rotundata vel auriculata; *nervo medio* indistincto, sinuoso; *venis* suberectis, unifurcatis vel simplicibus, immersis, inconspicuis; *soris* immersis, linearibus, a nervo medio et a margine aequidistantibus; *involucro* crasso, integro, persistente.

Fée Mem. VII. pag. 52, tab. 25.

Rizoma filiforme, rastrero, flageliforme, remotamente prolífero, con las yemas cubiertas de escamas lineares, membranáceas, cenicientas ó negruzcas; *estípites* fasciculados, gráciles, verdes, ligeramente marginados, 3-5^{ct.} largos; *frondes* en circunscripción ligulado-lanceoladas acuminadas en el ápice, pinadas, deusamente herbáceas, inferiormente pálidas, lampiñas 10-15^{ct.} largas, 3-4^{ct.} anchas; *raques* comprimidas, ancípites, marginadas; *pinas* 6-8 de ambos lados largamente pecioladas, divaricadas ó las inferiores reflejas, asimétricas, obtusas en el ápice, inciso-crenadas en el margen superior y exterior; base inferior más ó menos sensiblemente acuñada, la superior bruscamente truncada y

paralela con la raquis ó prolongada en aurícula oblicua á la misma raquis; *nervio medio* indistinto, inmerso, sinuoso; *venas* simples ó bifurcadas, inmersas, indistintas, terminadas en glándula transparente dentro del margen; *soros* 2-4 de ambos lados, lineares, inmersos, situados á igual distancia del nervio medio y del margen; *involucro* varde, herbáceo, consistente, entero.

Crece en los bosques de la región tropical y subtropical, entre los musgos ó adherido al tronco de los árboles vetustos.

Observación: Difiere del *A. auriculatum* Sw. por la forma particular del rizoma, por el tamaño siempre muy diminuto y por la forma de las pinas. La base superior de éstas imita con frecuencia la de la especie citada; sin embargo, este carácter parece accidental en esta forma y de ninguna manera se pueden desatender por él los demás que dejamos citados.

25. *A. rhizophorum* L. *rhizomate* erecto, lignoso, paleis membranaceis, linearibus, subulatis, nigrescentibus obsito; *stipitibus* fasciculatis, ebeneis, rigidis, 10-25^{ct.} longis; *frondibus* pinnatis, oblongo-lanceolatis, 20-40^{ct.} longis, 5-15^{ct.} latis, utrinque glabris, papyraceis vel subcoriaceis; *rachibus* gracilibus, subcylindricis, castaneo-nitidis, apice ultra pinnas plus minusve producto et radicante; *pinnis* 8-15 jugis, conformibus, divaricato-patentibus, lanceolatis, subfalcatis, apice acutis vel acuminatis, margine exteriori et superiore inciso-dentato, raro integro; basi inferiore cuneata integra, superiore truncata, cum *rachi* parallela, quandoque plus minusve auriculata; *venis* tenuibus simplicibus, suberectis, ante marginem in glandulam claviformem desinentibus; *soris* anguste linearibus, rectis, in utroque latere 10-15; *involucro* angusto, tenui, integro.

Hk. sp. III. pag 122, t. 187, Hk. & Bak. Syn. pag. 204., Id. Fl. Bras. V. I. p. 2^a pag. 434.

β. *rachirrhizon* rhizomate erecto, robusto, lignoso; *stipitibus* robustis, 20-30^{ct.} longis, castaneo-ebeneis, frondibus ovali-lanceolatis, bipinnatis vel bipinnato-pinnatifidis, herbaceis, intense viridibus, 30-40^{ct.} longis, 20-30^{ct.} latis, utrinque glabris; *rachibus* castaneo-ebeneis, ad apicem longe productis, radicanibus; *pinnis* subsessilibus, ex basi deltoidea sursum gradatim angustatis, ad apicem plerumque radicanibus; basi inferiore longius producta; *pinnulis* subintegris, pinnatifidis, vel pinnatifido-pinnatis; segmentis ultimis ovato-cuneatis, extrorsum integris vel inciso dentatis; *soris* majusculis, oblon-

gis vel ellipticis; *involucro* cartilagineo, tenui, ad apicem et basin rotundato.

A. rachirrhizon Raddi: apud Baker, *Flor. Bras. loc. cit.*

Rizoma erguido, más ó menos largo, á veces muy corto, leñoso, cubierto de escamas lineares, alesnadas membranáceas, ceniciento-negruczas; *estípites* fasciculados, rígidos, casi cilíndricos, de color intensamente castaño, lustrosos, de 10–25^{ct.} largos; *frondes* pinadas ó bipinado–pinatifidas, las primeras lanceoladas, 20–40^{ct.} largas, 5–15^{ct.} anchas, subcoriáceas ó papiráceas, de ambos lados lampiñas, inferiormente más pálidas; *raquis*, así como los estípites, lampiñas, lustrosas, casi cilíndricas, flexibles, más ó menos prolongadas en el ápice desprovisto de pinas y radicante; *pinas* linear–lanceoladas, casi falcadas puntiagudas ó acuminadas el ápice, raras veces obtusas, con el lado superior y el exterior inciso–dentados, raras veces casi entero; la *base inferior* angostado–acuñada, la superior truncada y casi paralela con la raquis; *venas* muy delgadas, poco distintas, las de la base superior bifurcadas, las demás enteras, terminadas dentro del margen en glándula claviforme; *soros* numerosos, lineares, rectos, casi equidistantes del nervio medio y del margen; *involucros* angostos, ténues, enteros.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales entre los musgos y adherido al tronco de los árboles vetustos.

β. rachirrhizon: *Rizoma* erguido, leñoso, robusto, cubierto en el ápice por escamas largas, lineares, negruzcas; *estípites* robustos de 20–30^{ct.} largos, ligeramente escamosos en la base, superiormente lampiños, lustrosos; *frondes* aovado–oblongas, bipinadas ó bipinadopinatifidas; *raques* castaño–lustrosas, largamente desnudas en el ápice y así como las raquillas, ordinariamente radicantes ó prolíferas; *pinas* casi contiguas, sésiles, escamosas en la base, deltoideo–lanceoladas; *pinulas* numerosas, pinadas ó pinado–pinatifidas, con los segmentos últimos trasovados, enteros ó lobulados ó inciso–dentados en el borde exterior; *soros* oblongos ó casi elípticos; *involucros* ténues; anchos redondeados en ambas extremidades.

Observación: El Sr. Baker loc. cit. pág. 435, después de descrita esta última forma agrega: *Varietas insignis, habitu ad A. cicutarium prope accedens, sed cum typo formis intermediis gradatim coniuncta.*

Estas formas intermedias se hallan representadas en la tab. 187 del Vol. III de Hk., de las cuales, la que más se aproxima á nuestra forma es la señalada con la letra D.

(Continuará).