

CRYPTOGAMIE VASCULARES QUITENSIS

AUCTORE,

ALFONSO SOBICO, S. J.—Universitatis Professor.



GEN. 35. DRYMOGLOSSUM. PRESL.

Sori lineares, continuos, interrupti; receptaculo intramarginali, costae parallelo inserti; venae reticulatae; frondes dimorphae.

Sores lineares, dispuestos en línea continua ó, á veces, interrumpida sobre un receptáculo linear, situado entre el margen y al nervio medio, ligeramente inmerso; venas reticuladas, con venillas libres en las areolas; frondes estériles diferentes de las fértiles.

1. *D. Wiesbaurii* nov. sp.; rhizomate filiformi, squamis membranaceis, ovatis vel subrotundis, sinuosodentatis, albidis consperso; stipitibus sparsis, in fronde sterili brevibus, limbo decurrente alatis, in fronde fertili 3-5^{ct.} longis; frondibus sterilibus ovali-lanceolatis, 6-9^{ct.} longis, 2-3^{ct.} latis, deorsum cuneato-angustatis, sursum in apicem acutiusculum productis, membranaceis, squamis ovali-acuminatis subtus conspersis, costa parum elevata, nigrescente; venis tenuissimis, immersis, irregulariter reticulatis; areolis inter costam et marginem numerosis, parum conspicuis; fronde fertili anguste lineari,

6-8^{ct.} longa, 3-4^{ml.} lata, in apicem linearem sterilem abrupte contracta; *soris* in receptaculo linear, inter costam et marginem medio, vix elevato digestis, demum totam paginam inferiorem obtegentibus; *sporangiis* subrotundis, annulo 16-18 articulato, *paraphysibus* filiformibus commixtis; *sporis* oblique ovatis vel subrotundis, laevibus.

Rizoma filiforme, muy largo, tomentoso y cubierto de escamas membranáceas, aovadas ó casi redondas, sinuoso-dentadas, blanquecinas; *estípites* distantes, comprimidos, ligeramente escamosos, verdes; en las frondes estériles alados casi hasta la base; *frondes* estériles oval-lanceoladas, 6-9^{ct.} largas, 2-3^{ct.} anchas, acuñadas brevemente en la base, más prolongadas hacia el ápice, densamente membranáceas, pálidamente verdes, esparcidas de escamas muy pequeñas en la página inferior y de otras menores, negruzcas, puntiformes en la superior; *nervio medio* ligeramente prominente de ambos lados, negruzco inferiormente; *frondes* fértiles con pecíolo 3-5^{ct.} largo, alado superiormente; *lámina* angostamente linear, tan larga como la de las estériles, contraida bruscamente en ápice linear, estéril; *soros* lineares, dispuestos sobre un *receptáculo* ligeramente prominente, intermedio y paralelo, así al margen como al nervio medio; *esporangios* con 16-18 articulaciones, mezclados con paráfisis filiformes; *esporas* oblicuamente aovadas ó casi redondas, lisas.

Crece adherido á los árboles al lado del río Chimbo entre 300 y 500 metros.—Es la primera especie de este género encontrada hasta ahora en AMÉRICA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

TRIBUS X. ACROSTICHEAE.

Sporangia paginam inferiorem frondium totam ocupantia, (quandoque etiam superiorem), in soros speciales non distributa.

Esporangios esparcidos sin orden aparente en toda la página inferior de las frondes, (á veces aun en la superior) no distribuidos en soros ni en receptáculos particulares.

helechos de forma, aperiencia, tamaño y estructura muy diferente. *Rizoma* leñoso, raras veces herbáceo, más ó menos rastreiro, á veces trepador, nunca arborescente; *estípites* continuos ó articulados con el rizoma á poca distancia de la base, desnudos ó escamosos, más ó menos largos, á veces casi nulos; *frondes*, por lo común, más ó menos sensiblemente dimorfas, más comunmente enteras, á veces pinadas y aun bi-tripinadas; *venas* libres, indivisas ó bifurcadas ó, de diferente manera, reticuladas.

Hállase distribuido en toda la zona vegetativa desde el nivel del mar hasta el límite de las nieves perpetuas. (4.800 metros s. m.)

GÉNERO (ÚNICO) 36. ACROSTICHUM L.

(CARÁCTERES DE LA TRIBUS).

CLAVE DE LAS ESPECIES DESCRITAS.

SERIE I. *Venas libres.*

§, 1º (ELAPHOGLOSSUM) Schott; *Limbo* muy entero; *venas* libres, (casualmente anastomosadas), casi paralelas y uni-bi-furcadas.

- I.** (*GLABRA*) *Limbo estéril* lampiño ó casi lampiño de ambos lados, no apestañado en el margen. (conf. etiam spec. 15, 41, 42).
- A.** *Rizoma* corto, erguido, cubierto de escamas rígidas, aleñadas, negras; *estípites* gráciles.
- a. *Limbo* fértil mucho menor que el estéril.
- a. *Limbo estéril* mucho más largo que el pecíolo, oblongo, obtuso..... 1. *A. cespitosum.*
 - β. *Limbo estéril* igual ó más corto que el pecíolo, acumulado ó cuspidado; casi acorazonado en la base..... 2. *N. tambillense.*
- b. *Limbo* dos ó cuatro veces más cortos que los estípites, acumulado en la base, acumulado en el ápice.. 3. *A. petiolosum.*
- B.** *Rizoma* oblicuo ó brevemente rastrero, con escamas membranáceas, rojizas ó negras.
- a. *Frondes* linear-lanceoladas, 6-12 ml. anchas, las fértils iguales ó mayores que las estériles, con pecíolo más largo..... 4. *A. leptophyllum.*
- b. *Frondes* fértils menores que las estériles.
- a. *Frondes* estériles 4-7 veces más largas que anchas.
 - 1. *Frondes* cartilagíneo-membranáceas, intensamente verdes..... 5. *A. flaccidum.*
 - 2. *Frondes* más ó menos coriáceas, pálidamente verdes inferiormente..... 6. *A. latifolium.*
 - β. *Frondes* cartilagíneo-membranáceas, 8-12 veces más largas que anchas..... 7. *A. longifolium.*
- C.** *Rizoma* largamente rastrero ó sarmentoso; *frondes* coriáceas ó casi coriáceas.
- a. *Rizoma* cubierto de escamas grandes, aovadas ó lanceoladas.
- a. *Limbo estéril* angostado gradualmente en la base.
 - 1. *Rizoma* rastrero; *limbo estéril* oblongo-lanceolado, acumulado ó espatulado en la base; *limbo* fértil menor, conforme..... 8. *A. conforme.*
 - 2. *Rizoma* trepador; *limbo estéril* oval-lanceolado, contraido gradualmente [desde la tercera parte inferior] en el pecíolo..... 9. *A. Schlimense.*

- β. Limbo estéril* redondeado ó brevemente acuñado en la base.
1. *Limbo estéril* oval-lanceolado..... 10. *A. scandens*.
 2. *Limbo estéril* elíptico ú oblongo-elíptico.. 11. *A. Lingua*.
- b.** *Rizoma* cubierto de escamas muy pequeñas y prontamente caedizas; *limbo estéril* dos ó tres veces más largo que ancho y más largo que el pecíolo..... 12. *A. microlepis*.
- III.** [SETOSA] *Frondes y estípites* con pelos ó escamas setosas, ó angostamente lineares más ó menos densas, á veces sólo en el margen.
- A.** [OLIGOTRICHIA] *Pelos ó escamillas* raros, caducos ó persistentes.
- a.** *Rizoma* muy corto; *estípites* filiformes, más largos que el limbo.
- a. *Limbo estéril* 5-10^{ct.} largo, 2-3^{ct.} ancho; *nervio medio* imberbe..... 13. *A. Lindeni*.
 - †. *Limbo estéril* 10-25^{ct.} largo, 2-3^{ct.} ancho; *nervio medio* por lo común apestañado..... 14. *A. hibridum*.
- b.** *Rizoma* erguido ó brevemente rastrero, escamoso ó desnudo.
- a. *Rizoma* cubierto de escamas pequeñas, lineares, alesnadas, negras.
 1. *Frondes estériles* desnudas ó con escamillas raras inferiormente, caducamente apestañadas; las *fértils* iguales ó menores, con estípites más largos.
 - *. *Estípites* lampiños, lustrosos; los *fértils* más largos y robustos; *limbo fértil* casi conforme ó igual ó poco menor que los estériles..... 15. *A. castaneum*.
 - ** *Estípites* escamosos inferiormente; *limbo estéril* mucho mayor que el *fértil*..... 16. *A. papillosum*.
 2. *Frondes* con escamas lineares en la página inferior ó en entradas; las *fértils* iguales ó poco menores que las *estériles*..... 17. *A. isophyllum*.
 - * *Frondes* apestañadas en el borde y en el nervio medio; las *estériles* angostadas gradualmente en ambas direcciones.
 - † *Pelos* de los estípites, nervio medio y margen tenuis, largos y raros; *limbo fértil* contraido en la base, 4-6 veces menor que los estériles..... 18. *A. Aubertii*.
 - †† *Pelos* de los estípites, nervio medio y margen densos, rígidos, negros; *limbo fértil* conforme con el estéril, pero 3-4 veces menor..... 19. *A. hirtipes*.
 - ‡. *Rizoma* rastrero, desnudo; *estípites* y *nervio medio* como en el nº 16; *frondes* ligeramente apestañadas, redondeadas ó algo agudas en la base y en el ápice.....
 - 20. *A. Bakeri*.
 - γ. *Rizoma* rastrero, robusto, leñoso, cubierto de escamas largas, lineares, blandas, rojizas.

1. Frondes largamente pecioladas; estípites gráciles, estriados, setosos.
- * Limbo estéril más corto que el pecíolo, elíptico-oblongo, cuspido, poco mayor que el fértil. 21. *A. versatile*.
- ** Limbo estéril más largo que el pecíolo, angostado en ambas direcciones, mucho mayor que el fértil. 22. *A. scolopendrifolium*.
2. Frondes sésiles, angostadas gradualmente hasta la base, acuminadas en el ápice; pelos largos y tenuis. 23. *A. apodium*.
- c.** Rizoma delgado, rastrero ó trepador; frondes estériles 5-15 ct. largas.
- a. Rizoma filiforme.
1. Rizoma peloso, flageliforme, remotamente prolífero; estípites fasciculados; limbo estéril linear-oblongo, crenado, casi lampiño. 24. *A. pygmaeum*.
2. Rizoma escamoso; estípites distantes; limbo estéril elíptico-oblongo, truncado en la base, acuminado en el ápice, entero, hirsuto. 25. *A. heteromorphum*.
- β. Rizoma delgado, leñoso, escamoso; estípites distantes; los fériles más largos.
1. Limbo estéril 10-15 ct. largo, 8-12 ml. ancho, herbáceo; el fértil 3-4 veces menor, con estípite 5-6 ct. largo. 26. *A. squarrosum*.
2. Limbo estéril 10-15 ct. largo, 1-2 ct. ancho; el fértil mucho menor y con estípite 8-15 ct. largo. 27. *A. Mettenii*.
- d.** Rizoma sarmentoso, leñoso, anguloso, con escamas linear-alesnadas; frondes conformes, oblongo-liguladas; las fériles poco menores y con pecíolo más largo que las estériles. 28. *A. dendricolum*.
- B.** [POLYTRICHIA] Estípites y frondes densamente cubiertas de escamas setosas ó angostamente lineares.
- a.** Escamas setosas; rizoma erguido ó ascendente; estípites fasciculados.
- a. Limbo estéril más corto ó igual al estípite.
1. Limbo estéril espatulado, 2-5 ct. largo; el fértil más corto y con pecíolo más largo. 29. *A. spathulatum*.
2. Limbo estéril linear-lanceolado, 5-10 ct. largo, igual ó más corto que su estípite; el fértil más corto y con estípite 2-3 veces más largo. 30. *A. Fraseri*.
- β. Limbos estériles más largos que sus estípites.
1. Venas inmersas, indistintas; limbo estéril 15-20 ct. largo, 1½-2 ct. ancho; el fértil menor, largamente peciolado. 31. *A. quitense*.
2. Venas distintas.
- * Limbos fériles mucho más cortos que los estériles, con pecíolo más largo.

- † Limbo fértil elíptico, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ ct. largo, 2 - $2\frac{1}{2}$ ct. ancho, puntiagudo en la base..... 32. *A. Haynaldi*.
- †† Limbo fértil truncado ó acorazonado en la base, lanceolado, acuminado, 5 - 8 ct. largo..... 33. *A. scutigerum*.
- ** Limbo fértil 2-3 veces menor que el estéril, entre ambos oblongo-lanceolados-cuspidados..... 34. *A. villosum*.
- b** Escamas angostamente lineares; frondes carnosas ó coriáceas.
- i. Rizoma erguido ó ascendente; estípites fasciculados.
1. Limbo estéril larga y gradualmente angostado en ambas direcciones; el fértil conforme y algo menor..... 35. *A. albescens*.
2. Limbo estéril oblongo-elíptico, puntiagudo en el ápice acunido en la base; el fértil 2 ó 3 veces menor..... 36. *A. boragineum*.
- β Rizoma horizontal, rastrero, con escamas lineares, empizarradas; estípites más largos que los límbos; limbo fértil algo menor..... 37. *A. Sodiroi*.
- III.** [SQUAMOSA] Estípites y límbos con escamas normales (no setosas. V. nos. 17, 38).
- A.** [OLIGOLEPIDIA] Limbo estéril parcialmente escamoso, no trajeado.
- a. Limbo estéril 2-8 ct. largo; rizoma grácil, sarmentoso.
- a. Limbo estéril 2 - $2\frac{1}{2}$ ct. largo, coriáceo.
1. Limbo estéril casi tan ancho como largo, obtuso, acorazonado..... 38. *A. cardiophyllum*.
2. Limbo estéril doble más largo que ancho, aovado ó rombico..... 39. *A. squamipes*.
- β. Limbo estéril 4-8 ct. largo, 3-4 veces más largo que ancho
1. Limbo estéril linear-oblongo, obtuso, crenado; el fértil menor, espatulado..... 40. *A. Feci*.
2. Limbo estéril oval-lanceolado, acuminado; el fértil menor, conforme..... 41. *A. lloense*.
- b.** Limbo estéril 10-50 ct. largo.
- a. Rizoma rastrero ó ascendente, desnudo ó (como los estípites) escamoso; limbo estéril con escamillas estrelladas, finalmente desnudo, punteado..... 42. *A. viscosum*.
- β. Rizoma sarmentoso, escamoso en el ápice.
1. Limbo estéril oblongo-lanceolado, lampiño, con escamillas orbiculares, caducas en el margen; el fértil casi igual..... 43. *A. ciliatum*.
2. Limbo estéril oval lanceolado, 25-40 ct. largo, inferiormente blanquecino, con escamas persistentes..... 44. *A. Boryanum*.
- γ. Rizoma largamente rastrero, con escamas negras, empizarradas..... 45. *A. furfuraceum*.
- B.** [LACINIATA] Frondes parcialmente escamosas, franjeadas por escamas salientes en el margen. [v. etiam nos. 41, 42 y 43]

- a.** *Rizoma* largamente rastrero; *limbo estéril* 12-15^{ct.} largo, 2½-4^{ct.} ancho, oval-lanceolado, casi coriáceo, lampiño..... 46. *A. marginale*.
- b.** *Rizoma* brevemente rastrero; *limbo estéril* 40-70^{ct.} largo, membranáceo; *venas* muy pronunciadas, con escamillas menudas y blandas..... 47. *A. heliconiaefolium*.
- IV.** [POLYLEPIDIA] *Frondes* (al menos las tiernas) densamente escamosas en uno ó en entrambos lados, á veces, con el tiempo, alampiñadas, coriáceas.
- A.** *Limbo estéril* 1-10^{ct.} largo.
- a.** *Rizoma* filiforme trepador; *limbo estéril* 1-2^{ct.} largo y ancho, escamoso de ambos lados.
- α. *Limbo estéril* aovado ó casi redondo..... 48. *A. ovatum*.
 β. *Limbo estéril* triangular-hastado..... 49. *A. deltoideum*.
- b.** *Rizoma* delgado, rastrero; *limbo estéril* oblongo-lanceolado, 3-5 veces más largo que ancho.
- α. *Limbo estéril* densamente escamoso de ambos lados..... 50. *A. Matthewsii*.
 β. *Limbo estéril* lampiño en la cara inferior. 51. *A. assurgens*.
- B.** *Limbo estéril* 10 y más^{ct.} largo.
- a.** *Rizoma* brevemente rastrero, cubierto de escamas negras, aciculares; *frondes* lineares, 10-40^{ct.} largas, cubiertas en la cara superior de escamas orbiculares, peltadas, hialinas; las fértiles casi iguales á las estériles..... 52. *A. stenophyllum*.
- b.** *Rizoma* ascendente ó rastrero; *estípites estériles* mucho más cortos que los fértiles; *limbos* oblongos, obtusos conformes.
- α. *Rizoma* largamente rastrero, cubierto de escamas lanceoladas, castaño-negras; *limbos estériles* coriáceos, densamente escamosos en la cara inferior, alampiñados en la superior, 2-3 veces más cortos que los estípites..... 53. *A. Yatesii*.
 β. *Rizoma* ascendente, con escamas lineares; *estípites* con escamas aovadas, translúcidas, divaricadas; los *estériles* más largos ó iguales al limbo.
1. *Frondes estériles* 20-40^{ct.} largas, 3-5^{ct.} anchas, obtusas en ambos extremos, con escamas estrelladas en la superficie inferior..... 54. *A. Corderoanum*.
 2. *Frondes estériles* 10-20^{ct.} largas, 2-3^{ct.} anchas, escamosas de ambos lados ó finalmente alampiñadas.
 * *Escamas* de la superficie inferior del limbo estéril, esparcidas, pálidas, caedizas..... 55. *A. Bellermannianum*.
 ** *Escamas* de la superficie inferior del limbo estéril, densamente empizarradas, gris-negruzcas.... 56. *A. muscosum*.
- c.** *Rizoma* rastrero; *estípites* distantes; *frondes* estériles 10-50^{ct.} largas, 2-7^{ct.} anchas (v. form. diminutas nº 51, 57, 62).
- α. *Rizoma* grácil, muy largo, trepador; *limbo estéril* 10-15^{ct.} largo, 2-3^{ct.} ancho, cuspido, estrechado uniformemente hacia la base y el ápice, densamente franjeado.....

- 57. *A. fimbriatum*.
 β. *Rizoma* robusto, leñoso; *estípites* apartados, rígidos; *limbo estéril* comunmente mucho mayor.
 1. *Escamas* de la superficie inferior estrictamente aplicadas al limbo, formando una capa sensiblemente continua, blanquecina.
 * *Limbo estéril* casi coriáceo, oblongo-lanceolado; *venas* inmersas.
 † *Limbo estéril* pungiagudo ó apiculado, no franjeado en el margen; el *fértil* igual ó mayor, conforme.. 58. *A. rupestre*.
 ‡ *Limbo estéril* cuspido, franjeado; el *fértil* mucho más angosto..... 59. *A. cuspidatum*.
 ** *Limbo estéril* cartilagíneo, cuspido, franjeado; *venas* muy sobresalientes..... 60. *A. argyrophyllum*.
 2. *Escamas* de la superficie inferior laxamente dispuestas.
 * *Escamas* de los *estípites*, pequeñas, negruzcas, dirigidas hacia arriba
 † *Escamas* de los *estípites* largas, largamente apestañadas; *limbo estéril* oblongo-lanceolado, angostado en ambas direcciones, cubierto de escamas cobrizas, más densas en la página inferior..... 61. *A. Rimbachii*.
 ‡ *Escamas* de los *estípites* ajustadamente empizarradas; *limbo estéril* angostamente oblongo-elíptico, cuspido..... 62. *A. tricittatum*.
 ** *Escamas* de los *estípites* largas, recorvadas; *limbo estéril* angostado en ambas direcciones..... 63. *A. Sprucei*.
 γ. *Rizoma* rastrero, con escamas linear-alesnadas, rígidas, abultado por filopodios persistentes, aproximados; *frondes* con escamas cobrizas muy densas, apestañadas.
 1. *Frondes* casi coriáceas, linear-lanceoladas, con escamas densamente empizarradas, persistentes en la faz inferior, incoloras y caedizas en la superior..... 64. *A. lepidotum*.
 2. *Frondes* flácidas con escamas esponjadas, laxamente empizarradas, concolores de ambos lados .. 65. *A. squamosum*.
 §. 2º (LOMARIOPSIS Fée) *Frondes* estériles una sola vez pinadas; *venas* libres, indivisas ó bifurcadas.
Rizoma trepador, funiforme; *frondes* lampiñas, membranáceas ó coriáceas; *raquis* rolliza ó alada; *pinas* articuladas con la raquis..... 66. *A. sorbifolium*.
 §. 3º (POLYBOTRYA H. B. K.) *Frondes* (estériles y fértiles) 2-4 pinadas; *venas* de las pínulas y segmentos estériles pinadas, libres; *rizoma* robusto, trepador.
 I. *Frondes* estériles bipinatífidas; *pinas* inferiores, pinadas en la base..... 67. *A. chrysolepis*.
 II. *Frondes* estériles bipinadas ó tripinatífidas. 68. *A. caudatum*.
 III. *Frondes* estériles 3-4-pinatífidas.
 A. *Frondes* estériles tripinadas; *escamas* del rizoma lineares, muy

- largas, rígidas 69. *A. osmundaceum*.
B. *Frondes estériles* 3-pinadas ó 4-pinatífidas; *escamas del rízoma* aovadas, acuminadas 70. *A. Lechlerianum*.
 §. 4º (RHIPIDOPTERIS Schot.) *Frondes estériles* flabeladas; las *fértils* indivisas; *rízoma* filiforme, largamente rastrero; *estípites* distantes.
I. *Limbo estéril* flabelado-acuñado, entero ó 2-3-partido; el *fértil* orbicular 71. *A. flabellatum*.
II. *Limbo estéril* repetidas veces dicótomo.
A. *Divisiones* últimas lineares; *limbo fértil* arrinornado ó lobulado 72. *A. peltatum*.
B. *Divisiones* últimas filiformes; *limbo fértil* bilobulado 73. *A. foeniculaceum*.

SERIE II. *Venas anastomosadas*.

- §. 5º (SOROMANES Fée) *Venas* primarias pinadas; *venillas* confluentes en el ápice con las opuestas de las venas próximas; (*frondes estériles* pinadas, pinatifidas en el ápice; *rízoma* leñoso, funiforme, trepador).
I. *Pinas* membranáceas, lampiñas de ambos lados; las inferiores brevemente pecioladas; las medias y superiores sésiles, rectas, truncadas en la base; *venillas* 4-6-yugas 74. *A. Hackelianum*.
II. *Pinas* casi coriáceas, tómicos-pubescentes en la cara inferior, las inferiores y las medias largamente pecioladas, falcadas; *venillas* 4-5-3-yugas 75. *A. insigne*.
 §. 6º (GYMNOPTERIS Bernh.) *Venas* terminadas dentro del margen; *venillas* anastomosadas con las de las venas colaterales, formando 3-4 series de aréolas, con *venillas* libres inclusas.
I. *Frondes estériles* enteras ó ternadas; las dos *pinas* laterales auriculiformes, mucho menores que la terminal 76. *A. oligarchicum*.
II. *Frondes estériles* pinadas ó bipinatifidas.
A. *Pinas* estériles pinatifidas ó lobuladas; las inferiores estipitadas; las superiores sésiles, escorridas 77. *A. alienum*.
B. *Pinas* estériles muy enteras, todas pecioladas, acuminadas; la terminal mayor 78. *A. nicotianaefolium*.
 §. 7º (CHIRYSODIUM Fée) *Frondes* dimorfas ó conformes; *venas* primarias indistintas, todas reticuladas en aréolas iguales, sin *venillas* libres inclusas.
I. *Frondes* dimorfas.
A. *Limbo estéril* entero, espatulado; el *fértil* pinado; ambos muy escamosos 79. *A. aureo-nitens*.
B. *Limbo estéril* entero ó por lo común trifoliolado, lampiño;

- pina* terminal mucho mayor..... 80. *A. panduraefolium*.
II. *Frondes* pinadas, conformes, coriáceas, muy lampiñas; *pi-*
nas fértils más ó menos contraidas..... 81. *A. aureum*.

SERIE I. *Venas libres*.

§. 1º [ELAPHOGLOSSUM Schott]. *Frondes* enteras; las fér-
 tiles comunmente menores; *venas* libres, indivisas ó bifur-
 cadas.

1. *A. cespitosum* Sod.: *rhizomate* brevissimo, squa-
 mis ebeneo-nigris, subulato-acuminatis, denticulatis, ri-
 gidis obtecto; *stipitibus* fasciculatis gracilibus, ad basin
 setulosis, 2-4^{ct.} longis, antice sulcatis; *limbi fertilis* 4-
 6^{ct.} longis; *lamina sterili* 3-10^{ct.} longa, 1-2^{ct.} lata, u-
 trinque glabra, flaccida, in siccо subcoriacea, ad apicem
 obtusa vel acutiuscula, ad basin subito contracta, ad mar-
 ginem irregulariter undulata, pellucido punctata; *nervo*
medio parum exerto; *venis* immersis, opacis, remotius-
 culis, ascendentibus, simplicibus vel circa medium bifur-
 catis, intra marginem cartilagineum in apicem clavatum,
 incrassatum, opacum desinentibus; *limbo fertili* 1½-2^{ct.}
 longo, 5^{ml.} lato, obtuso, deorsum cuneato.

Sodiro, "Reccnsio", pag. 74.

Rizoma muy corto, cubierto de escamas persistentes, ale-
 nado-acuminadas, muy pequeñas, rígidas, denticuladas, negras;
estípites densamente fasciculados, numerosos, parcamente pelo-
 sos en la base; los de las frondes estériles filiformes, 2-4^{ct.} largos;
 los de las fértiles, más robustos 5-7^{ct.} largos; *limbo estéril* 3-10^{ct.}
 largo, 1-2^{ct.} ancho, obtuso ó puntiagudo en el ápice, contraido
 bruscamente ó acuñado en la base, ondulado en el margen, her-
 báceo y casi carnoso, subcoriáceo cuando seco, esparcido de pun-
 tos pelúcidos, lampiño; *nervio medio* muy poco pronunciado de
 ambos lados, desvanecido antes del ápice; *venas* distantes, erec-
 to-divergentes, enteras ó bifurcadas, opacas, engrosadas en el
 ápice y terminadas dentro del margen; *limbo fértil* 1-2^{ct.} largo,
 5^{ml.} ancho, obtuso en el ápice y acuñado en la base.

Crece en la región tropical en la orilla del río Peripa.

2. *A. tambillense* Hk.; *rhizomate* brevi, crasso,
 squamis linearibus, crispatis, obscure castaneis dense ob-
 tecto; *stipitibus* dense fasciculatis, 5-10^{ct.} longis, graci-
 libus rigidis, nudis; *frondium fertilium* parum longiori-
 bus; *lamina sterili* 5-10^{ct.} longa, 2-3^{ct.} lata, ovali-

elliptica, ad apicem acuminata, ad basin subito contracta, rotundata vel leviter cordata, coriacea, utrinque glabra; *venis* remotis, erecto-patentibus, semel iterumve bifurcatis; *lamina fertili* ter quaterve minore, subconformi, basi acuminata vel cuneata.

Hk. Ic. tab. 656; Id. Sp. V. pag. 207; Hk. & Bk. Syn. pag. 400.

Rizoma muy corto, erguido ó ascendente, robusto, abultado por los restos de los estípites antiguos, entremezclados con escamas castaño-oscuras, lustrosas, lineares, más ó menos encrespadas; *estípites* numerosos, densamente fasciculados, 5-10^{ct.} largos, los *fértiles* algo mayores, gráciles, pajizos, lampiños; *limbo estéril* 5-10^{ct.} largo, 2-3^{ct.} ancho, aovado-elíptico, acumulado ó cuspidado en el ápice, redondeado ó oblicuamente acorazonado en la base, coriáceo, muy lampiño; *venas* distantes, inmersas, erecto-patentes, paralelas, 1-3 veces bifurcadas; *limbo fértil* 3-4 veces menor, de forma análoga á la del estéril, angostado ó acuñado en la base.

Crece cerca de Tumbillo, provincia de Quito, colectado por Jameson.

3. *A. petiolosum* Desv.; *rhizomate* breviter repente, ascendente, squamis linearis-subulatis, elongatis, ebeneis, nitidis dense obtecto; *stipitibus* approximatis, basi articulatis, tenuibus, 15-30^{ct.} longis, pallide stramineis, viscidis, parce squamułosis; *fertilibus* longitudine variis; *limbo sterili* 5-15^{ct.} longo, 2-2½^{ct.} lato, e parte media gradatim utrinque angustato, mox in apicem anguste cuspidatum contracto, basin versus cuneato vel acuto, membranaceo, utrinque viridi, supra et ad marginem squamulis minutis, nigrescentibus consperso, subtus glanduloso-punctato; *venis* immersis, tenuibus, crebris, erecto-patentibus, bifurcatis; *limbo fertili* parum minore, utrinque rotundato, apiculato, subcoriaceo.

Hk. Sp. V. pag. 207; Hk. & Bk. Syn. pag. 400; A. caudatum Hk. Ic. tab. 215.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, cubierto de escamas lineares, rígidas, castaño-ebéneas, lustrosas; *estípites* aproximados, gráciles, articulados en la base sobre un filopodio negruzco, 1-½^{ct.} largo, parca y decíduamente escamosos, verde-pajizos, glanduloso-punteados; *limbo estéril* 5-15^{ct.} largo, 2-2½^{ct.} ancho, elíptico-oblongo, contraido en el ápice en cúspide linear, acuñado ó puntiagudo en la base, membranáceo, verde de ambos lados, esparcido de escamas pequeñas, acorazonadas,

acuminadas, caedizas, especialmente en el nervio medio y en el margen y de puntos glandulosos, muy densos en la cara inferior; *nervio medio* más pronunciado en la cara superior; *venas* finas, aproximadas, paralelas, terminadas en glándula dentro del margen; *limbo fértil* 5-7^{ct.} largo, 2^{ct.} ancho, angostamente elíptico, terminado de ambos lados en punta, coriáceo, escamoso en el borde y en el nervio medio, con pecíolo de longitud variable, ya más corto, ya más largo que el de los estériles.

Crece en la región andina de la cordillera oriental cerca de Papallacta á 3.900 metros y en los declives del cerro "el Altar", provincia del Chimborazo, á la misma altura.

Observación: Las tres especies que preceden, tienen por su aspecto y extrestructura, mayor afinidad con las del grupo II (SETOSA) que con las del presente.

4. *A. leptophyllum* Fée; *rhizomate* gracili, brevi-
ter repente, *squamis* membranaceis, ovatis lanceolatisve,
acuminatis, fuscis onusto; *stipitibus* approximatis, erectis,
rigidis, basi articulatis, stramineis, parce squamosis;
sterilibus 3-15^{ct.} longis; *fertilibus* 5-30^{ct.} longis; *limbo*
bo sterili linear-lanceolato, vel linear-spathulato, deor-
sum plerumque in petiolum longe angustato, sursum in
apicem acutum contracto, *coriaceo*, utrinque glabro vel
subtus saepe squamuoso; *nervo medio* robusto, infra
eximie exerto, rotundato, supra complanato; *venis* im-
mersis, vix conspicuis, integris aut bifurcatis; *limbo fer-*
tili conformi, plerumque *maiore*, margine lato revoluto.

Fée. *Acrost. pag.* 45. *tab. 17. fig. 1;* Hk. *Sp. V.*
pag. 218; Hk. &. Bk. loc. cit.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, poblado de raíces nu-
merosas y cubierto de escamas parduzcas, aovadas ó lanceola-
das, enteras; *estípites* aproximados, articulados en la base, sos-
tenidos por un filopodio negruzco, 1-2^{ct.} largo, erguidos, delga-
dos, rígidos, casi cilíndricos, anteriormente estriados, pajizos,
desnudos; los *estériles* 3-15^{ct.}, los *fértils* 5-30^{ct.} largos; *limbo*
estéril linear-lanceolado ó linear-espatulado, 5-15^{ct.} largo,
5-15^{ml.} ancho, *coriaceo*, desnudo ó con pocas escamas membra-
náceas, prontamente caedizas á lo largo del nervio medio; el
margen revuelto sobre la cara inferior; *nervio medio* inferior-
mente redondo, superiormente complanado, más robusto en las
frondes fértils; *venas* inmersas, apenas sensibles, indivisas ó una
sola vez bifurcadas; *limbo fértil* ordinariamente mayor que el
estéril, contraido gradualmente desde la cuarta parte superior
hacia la base.

*Crece en la región andina y subandina de entradas cordi-
lleras.*

Observación: Reducimos á la presente especie algunos ejemplares que en nuestra *Recensio* pág. 72 hemos referido al *A. simplex* Sw. La gran variabilidad de estas dos especies, muy afines entre sí, hace muy difícil el trazar los límites seguros entre una y otra.

5. *A. flaccidum* Féé; *rhizomate breviter repente*, lignoso, robusto, squamis ferrugineis, linear-subulatis, dense vestito; *stipitibus* fasciculatis vel plus minusve segregatis, cum phyllopedio nigrescente articulatis, subnullis vel 3-10^{ct.} longis, nudis; *limbo sterili* oblongo-lanceolato, utrinque gradatim angustato, 20-50^{ct.} longo, 3-7^{ct.} lato, cartilagineo-membranaceo, utrinque intense viridi, glabro aut squamulis minimis consperso, margine cartilagineo; *nervo medio* supra unisulcato; *venis* tenuibus, 1-2-furcatis, parallelis, e basi ascendente subhorizontaliter patentibus; *limbo fertili* 10-20^{ct.} largo, 2-2½^{ct.} lato, utrinque gradatim, deorsum longius angustato, stipe longiore suffulto.

Féé, *Acrost.* 37, tab. 7; Hk. Sp. V. pag. 504; Hk. & Bk. *Syn.* pag. 401.

Rizoma brevemente rastrero, leñoso, cubierto de escamas linear-alesnadas, apestañadas, terminadas en ápice filiforme; *estípites* 3-10^{ct.} largos, fasciculados, ó más ó menos, segregados, gráciles en proporción de la magnitud del limbo, sostenidos y articulados con un filopodio negruzco, 1-2^{ct.} largo; *limbo estéril* 20-50^{ct.} largo, desde la mitad ó la tercera parte superior angostado gradualmente hacia ambas extremidades, llegando inferiormente, á veces, hasta la articulación de los estípites, de consistencia cartilaginoso-membranáceo, verde de ambos lados, sensiblemente lampiño, esparcido en la cara inferior de escamillas muy pequeñas, negruzcas y de puntos glanduliformes; *nervio medio* poco pronunciado, negruzco y redondeado en la cara inferior, asurcado en la superior; *venas* muy finas, poco distintas, 1-2 veces bifurcadas, casi paralelas, ascendentes en la base y casi horizontalmente patentes en lo demás, terminadas en ápice dilatado, dentro del borde cartilagíneo del limbo; *limbo fértil* 10-20^{ct.} largo, 2-2½^{ct.} ancho, angostado desde la mitad ó la tercera parte superior hacia ambas extremidades, sostenido por un pecíolo de igual ó mayor longitud.

Crec en los bosques de la región tropical y subtropical hasta 800 metros s. m.

6. *A. latifolium* Sw.; *rhizomate lignoso, crasso, obliquo vel breviter repente, squamis linear-lanceolatis, castaneis vel ferrugineis dense obtecto; stipitibus spar-*

sis vel approximatis, nunc brevissimis, nunc 15-30^{ct.} longis, rigidis, hinc sulcatis, stramineis, glabris aut sparse squamosis; *frondibus sterilibus* oblongo-lanceolatis, 15-50^{ct.} longis, circa medium 4-10^{ct.} latis, a medio utroversus gradatim angustatis, deorsum plerumque longius productis, dense chartaceis aut coriaceis, utrinque glabris aut subtus squamis nigrescentibus, laciniatis, secus costam maioribus, conspersis, margine cartilagineo septis; *nervo medio* crasso, dorso rotundato, supra sulcato; *venis* tenuibus 2-3-furcatis, densis, parallelis, patentibus in apicem dilatatum intra marginem desinentibus; *frondibus fertilibus* conformibus, plerumque minoribus.

Hk. Sp. V. pag. 202; *Hk. & Bk. Syn.* pag. 403.

β. subsessile; *limbo sterili* subsessili, vel breviter petiolato, e medio utrinque subsymmetrice et gradatim producto, ad apicem acuminato vel acuto, 15-40^{ct.} longo, 3-8^{ct.} lato; *fertili* plerumque minore, angustiore, longius stipitato.

γ. luridum? Fée; *stipitibus* 5-8^{ct.} longis, robustis, deorsum squamosis, glandulosis, glabris; *limbo sterili* oblongo-lanceolato, 15-30^{ct.} longo, 4-8^{ct.} lato, acuminato, deorsum in petiolum longe angustato; *venis* tenuibus, immersis, bis terve bifurcatis, densis, subhorizontaliter patentibus; *limbo fertili* duplo fere minore, petiolo subaequali suffulto.

A. luridum Fée, *Acrost.* pag. 35. tab. 19.

δ. *alismacfolium*; *stipitibus* 10-20^{ct.} longis, gracilibus, cum nervo medio squamis nigrescentibus, laciniatis conspersis; *limbo sterili* oblongo-lanceolato, 15-30^{ct.} longo, 3-6^{ct.} lato, deorsum longius angustato, rigide chartaceo; *limbo fertili* conformi, subduplo minore, petiolo plerumque longiore suffulto.

A. alismacfolium Fée, *Acrost.* pag. 23. tab. 3.

ε. *Scalpellum*; *stipitibus* 20-30^{ct.} longis, plus minusve squamosis, robustis, striatis, stramineis; *limbo sterili* 30-50^{ct.} longo, 4-8^{ct.} lato, utrinque subaequaliter angustato, coriaceo; *limbo fertili* conformi, minore, petiolo parum longiore suffulto.

A. Scalpellum Mart. apud. Fée, loc. cit. pag. 32. tab. 10^a

Rizoma leñoso, robusto, oblicuo ó brevemente rastrero, cu-

bierto de escamas membranáceas, lanceoladas, prolongadas en ápice filiforme y cirroso, laciñadas en el borde, cobrizas, ferruginosas, negruzcas; estípites esparcidos, ó más ó menos aproximados, articulados en la base, hasta 30^{ct.} largos ó á veces muy cortos ó casi nulos, pajizos, lampiños ó escamosos; limbo estéril 15-50^{ct.} largo, 3-10^{ct.} ancho, oblongo-lanceolado, angostado gradualmente, desde la mitad, en ambas direcciones y más largamente hacia la base, apergaminado ó coriáceo, circunscrito por el margen cartilagíneo, entero, pelúcido, lampiño de ambos lados ó esparcido de escamas negras, finamente laciñadas, mayores á lo largo del nervio medio y puntiformes en lo restante de la página inferior; nervio medio robusto, lampiño, rojizo en la cara inferior, asurcado en la superior; venas finas, inmersas pero distintas, 2-3-furcadas, casi horizontalmente divergentes, paralelas, terminadas en ápice dilatado dentro del margen; limbo fértil de igual forma, por lo común, menor y sustentado por un pecíolo ordinariamente más largo que el del estéril.

Crece con más frecuencia ya terrestre, ya epífito, en la región andina y subandina; pero baja también á la subtropical y tropical ocupando, por consiguiente, la zona comprendida entre 300 y 3.600 metros.

Observación: Especie hermosa, pero muy variable. Los ejemplares que tenemos de ella en nuestro herbario, representan con más ó menos exactitud las formas que algunos autores admiten como especies, y que nosotros citamos como simples variedades, y aun esto no sin vacilación que merezcan considerarse como tales, atenta la gran variabilidad que se observa entre ellos y la discordancia en algunos caracteres con las descripciones y figuras de los autores aludidos. Las registramos, pues, para citar las formas á que pueden referirse, si bien dudamos del valor intrínseco del grupo que representan.

β. subsessile; limbo estéril oblongo-lanceolado, prolongado desde la mitad larga y gradualmente en ambas direcciones, escorrido en la base hasta, ó poco más arriba de la articulación del estípite con el filopodio, 15-40^{ct.} largo, 3-8^{ct.} ancho, rigidamente cartilaginoso; el fértil ordinariamente menor, más angosto y más gradualmente angostado en ambas direcciones, á veces mayor.

Crece en las faldas occidentales del Pichincha y del Chimborazo á 2.800 metros.

γ. luridum; estípites 5-8^{ct.} largos, robustos, con escamas negruzcas, caedizas en la base; limbo estéril oblongo-lanceolado, 15-30^{ct.} largo, 4-8^{ct.} ancho, rigidamente cartilaginoso cuando seco, angostado desde la mitad ó la tercera parte superior hacia ambas extremidades y más largamente en la inferior; limbo fértil de igual forma, pero más angosto y con pecíolo más largo.

Crece en los bosques de la región tropical cerca de Santo Domingo.

δ. *alismaefolium*; *rizoma* más ó menos robusto, rastrero ó ascendente, escamoso ó casi desnudo; *estípites* 10-20^{ct.} largos, relativamente gráciles, estriados, pajizos, esparcidos, así como el nervio medio, de escamas negruzcas, apestañadas, prontamente caducas; *limbo estéril* 15-30^{ct.} largo, 3-6^{ct.} ancho, acuminado en el ápice y angostado más ó menos hacia la base; *limbo fértil* conforme, dos ó más veces más angosto que el estéril.

Crece en el valle de Pallatanga entre 2.000 y 3.000 metros.

ε. *Scalpellum*; *estípites* 20-30^{ct.} largos, robustos, estriados cuando secos, esparcidos de escamas largas, aovado-lancoladas, apestañadas, más ó menos persistentes; *limbo estéril* 30-50^{ct.} largo, 4-8^{ct.} ancho, coriáceo, lampiño de ambos lados, brevemente angostado en ambas direcciones; *limbo fértil* de forma análoga á la del estéril, pero notablemente menor, sostenido por pecíolo más largo.

Crece en los bosques de la región tropical, en la parroquia de Santo Domingo á 400 metros s. m.

7. *A. longifolium* Jacq.; *rhizomate* lignoso, robusto, repente vel ascendente, dense membranaceo-squamoso; *stipitibus approximatis*, basi articulatis, subcylindricis, antrorsum striatis, parce squamosis, demum nudis, *sterilibus* 15-20^{ct.}; *fertilibus* 25-40^{ct.} longis; *limbo sterili* anguste oblongo-lanceolato, 40-60^{ct.} longo, 3-6^{ct.} lato, utrinque gradatim angustato, in apicem linearē sensim producto, integrerrimo, rigide cartilagineo-membranaceo, supra viridi, subtus pallidiore; *nervo medio* dorso rotundato, stramineo; *venis* 2-3-furcatis, tenuibus, vix exertis, parallelis, intra marginem in apicem dilatum, quandoque cum apice venarum proximarum confluentem terminatis; *limbo fertili* angustiore, breviorre, petiolo longiore suffulto, ceterum conformi,

*Hk. Sp. V. pag. 202; Hk. &. Bk. Syn. pag. 403. (sub *A. latifolium*); *Aconiopteris longifolia* Fée. Mem. II. pag. 80).*

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero ó ascendente, cubierto de escamas membranáceas, lanceoladas, acuminadas, de color pálidamente castaño; *estípites* aproximados, articulados sobre un filopodio 1-2^{ct.} largo, persistente; los *estériles* 15-20^{ct.} los *fértils* 25-40^{ct.} largos, casi cilíndricos, estriados anteriormente, de color pajizo ó anaranjado, esparcidos de escamas membranáceas, anchas, acorazonadas, y otras menores puntiformes; *limbo estéril* 40-60^{ct.} largo, 3-6^{ct.} ancho, angostamen-

te oblango-lanceolado, adelgazado gradual y uniformemente hacia ambos extremos y terminado en ápice linear, prolongado, de consistencia tenué pero rígidamente membranacea, lampiño y verde de ambos lados, más pálido en el inferior, esparcido de escamillas puntiformes, poco sensibles á simple vista; *nervio medio* robusto, redondeado en la página inferior, llano ó ligeramente asurcado en la superior; *venas* finas, 2-3-furcadas, paralelas, casi horizontalmente patentes, terminadas dentro del margen (angostamente cartilaginoso), en ápice dilatado y á veces confluente con el de las venas colaterales; *limbo* fértil al menos dos veces más corto y más angosto y sostenido por un pecíolo más largo.

Creece en los bosques de la zona inferior de la región subandina, en Canzacoto, Mindo y Nanegal.

Observación: Algunos autores refunden esta especie con la anterior, con la cual, sin duda, tiene cierta afinidad, y la variabilidad muy grande de aquella, da margen á sospechar que pueda extenderse hasta la presente. Sinembargo, los caracteres expresados y, más que ellos, el aspecto constantemente uniforme de ésta, nos obliga á considerarla como seguramente distinta. Es una de las especies más hermosas de este género.

8. *A. conforme* Sw.; *rhizomate* lignoso, repente, *squamis* membranaceis, fuscis, lanceolatis, acuminatis obtecto; *stipitibus* segregatis vel plus minusve approximatis, rigidis, deorsum squamosis, demum nudis; *sterilibus* 8-12^{ct.}, *fertilibus* 12-15^{ct.} longis; *limbo* sterili 8-15^{ct.} longo, 2-3^{ct.} lato, e quarta parte superiore in apicem acutum vel obtusum producto, deorsum longius angustato, basi cuneata aut leviter rotundata in stipitem decurrente, margine integerrimo, linea angusta, scariosa cincto, glabro, supra viridi, subtus pallidiore; *nervo medio* modice valido, decidue squamuoso: *venis* tenuibus, subimmersis, approximatis, erecto-patentibus, semel iterumve bifurcatis; *limbo* fertili subconformi, angustiore, saepe longiore.

Hk. Sp. V. pag. 198; Hk. &. Bk. Syn. pag. 401.

Rizoma leñoso, rastrero, cubierto de escamas membranáceas, lanceoladas, acuminadas, oscuras; *estípites* esparcidos ó más ó menos aproximados, delgados, rígidos, escamosos inferiormente, á veces pulverulento-pubescentes; los *estériles* 8-12^{ct.}, los *fériles* 12-15^{ct.} largos; *limbo* estéril 8-15^{ct.} largo, 2-3^{ct.} ancho, ligulado-oblongo, obtuso, puntiagudo ó acuminado en el ápice, y desde la cuarta ó tercera parte superior, adelgazado hacia la base, acuñada ó redondeada, angostamente escorrida en el estípite; *consistencia* rígidamente membranácea ó coriácea, lampi-

ña de ambos lados, muy entero en el borde, recorrido por una línea escariosa, angosta; *nervio medio* medianamente robusto, esparcido de escamillas caedizas en la cara inferior; *venas* finas, casi inmersas, ascendentes en la base, erecto-patentes, 1-2 veces bifurcadas, casi paralelas; *limbo* *fértil* parecido al estéril, más ancho, con frecuencia más largo.

Crece en el valle de Pallatanga, entre 1.400-2.000 metros.

9. *A. Schlimense* Féé.; "rhizomate lignoso, robusto, late scandente, squamis ovatis, fuscis obtecto; stipitibus remotis, 10-20^{ct.} longis, erectis, rigidis, parce squamosis; limbo sterili 15-30^{ct.} longo, 3-5^{ct.} lato, apice acuto vel obtuso, e tertia parte inferiore gradatim angustato, margine integro, cartilaginoso, subcoriaceo, utrinque glabro; venis tenuibus, valde approximatis, plerumque semel furcatis; limbo fertili conformi, plerumque parum minore".

Féé Mem. VIII, pag. 68; Hk. & Bk. Syn. pag. 402.

Rizoma largamente difuso, trepador, cubierto de escamas anchas, aovadas, bruno-oscuras; *estípites* esparcidos, distantes, erguidos, rígidos, parcamente esparcidos de escamas caedizas, 10-20^{ct.} largos; *limbo* *estéril* 15-30^{ct.} largo, 3-5^{ct.} ancho, oval-lanceolado, contraido gradualmente, desde la tercera parte inferior, en ambas direcciones, puntiagudo ó obtuso en el ápice, con el margen muy entero y rodeado por una línea cartilaginosa, distinta de lo restante del limbo; *venas* finas, condensadas, paralelas; *limbo* *fértil* casi igual en tamaño ó poco menor que el estéril.

Crece en el Ecuador, colectado por Spruce.

Observación: Especie, según Hooker y Baker, de consistencia análoga al *A. flaccidum*, más el limbo mucho menos angostado en la parte superior y con estípite más largo. No hemos visto ningún ejemplar de él; su descripción la hemos tomado de los autores citados.

10. *A. scandens* Bory.; *rhizomate* late scandente, tenui, squamis ovato-lanceolatis, peltatis, acuminatis, deciduis obtecto, demum nudo; *stipitibus* remotis, 5-20^{ct.} longis, modice robustis, rigidis, angulosis, sparse squamosis, demum nudis, stramineis; *sterilibus* 5-25^{ct.}, *fertilibus* 12-30^{ct.} longis; *limbo* *sterili*, oval-lanceolato, apice acuto vel obtuso, basi rotundata aut cuneata, margine integerrimo, cartilagineo, plus minusve dense coriaceo, supra viridi, subtus pallidiore, subglau-

cescente, 8-25^{ct.} longo, 2-7^{ct.} lato; *nervo medio* robusto, subtus angulato, supra plano; *venis immersis*, parum conspicuis, patentibus, approximatis, parallelis; *limbo fertili* conformi, ter quaterve minore, quandoque subaequali, stipite longiore suffulto.

Apud. Féé, Mem. II. pag. 33; A. Funckii Féé loc. cit. pag. 36 tab. 6^a fig. 1^a.

Rizoma sarmentoso, trepador, grácile, cubierto de escamas linear-lanceoladas, terminadas en ápice filiforme, enteras ó apestañadas, caedizas; *estípites* distantes, articulados en la base sobre un filopodio negruzco; los *estériles* 5-25^{ct.}, los *fertiles* 12-30^{ct.} largos, erguidos, gráciles, rígidos, angulosos, pajizos, esparcidos de escamas prontamente caedizas; *limbo estéril* coriáceo, oval-lanceolado, 8-25^{ct.} largo, 2-7^{ct.} ancho, puntiagudo ó obtuso en el ápice, redondeado ó acuñado en la base, el margen muy entero y recorrido por una línea cartilaginosa, lampiño de ambos lados, pálidamente verde ó algo glaucescente en el inferior; *nervio medio* robusto, casi triangular en el lado inferior, complanado en el superior; *venas* finas, inmersas, ascendentes en la base, patentes, aproximadas, paralelas; *limbo fértil* conforme ó más angosto y comúnmente 3-4 veces menor que el estéril, sostenido por pecíolo más largo.

Crece en la región subandina y andina de 1.500—3.400 metros, en los bosques de los volcanes Corazón y Pichincha.

II. *A. Lingua* Raddi.; *rhizomate* diffuso, late repente vel scandente, *squamis* caducis, ovato-lanceolatis, membranaceis, castaneo-stramineis obtecto; *stipitibus* sparsis, basi cum phyllopodio nigrescente, clavato articulatis, stramineis, sparse squamosis, demum nudis, gracilibus, angulosis, rigidis, 5-20^{ct.} longis; *fertilibus* plerumque longioribus; *limbo sterili* elliptico vel oblongo-elliptico, 10-20^{ct.} longo, 3-5^{ct.} lato, apice obtuso, basi plus minusve acutata, margine integro, cartilagineo, coriacea, glabro, subtus pallidiore punctisque nigris, minimis consperso; *venis* tenuibus, approximatis, densis parallelis; *limbo fertili* conformi, aequali vel minore aut angustiore, petiolo plerumque longiore, suffulto.

Hk. Sp. V. pag. 203 (ex parte) Hk. & Bk. Syn. pag. 402; Bk. Flor Bras. vol I. parte 2^a f^{ig.} 568.

Rizoma largamente rastrero ó trepador, cubierto de escamas membranáceas, parduzcas, aovadas y peltadas en la base, adelgazadas gradualmente hacia arriba, caedizas; *estípites* esparcidos, más ó menos distantes, articulados con un filopodio negruz-

co, 1-3^{ct.} largo, escamosos hacia la base, prontamente alampiñados, gráciles, rígidos, angulosos, 5-20^{ct.} largos; *limbo estéril* elíptico ú oblongo-elíptico, obtuso en el ápice, puntiagudo ó acuñado en la base, entero y cartilaginoso en el margen, coriáceo, lampiño, esparcido de puntos negros, pequeños, verde en la página superior, pálido en la inferior; *nervio medio* robusto, desvanecido antes del ápice, inferiormente anguloso, superiormente acanalado; *venas* finas, inmersas, ascendentes en la base, paralelamente patentes; *limbo fértil* igual ó menor que el estéril, sostenido por pecíolo más largo.

Crece en la cordillera oriental cerca de Papallacta y en el Corazón en el límite superior de la vegetación arbórea.

12. *A. microlepis* nov. sp.; *rhizomate* tenui, longe repente, squamis parvis, ovatis, nigrescentibus consperso, demum subnudo, ramoso; *stipitibus* sparsis, remotis, 2-5^{ct.} longis, herbaceis, squamulosis; *limbo sterili* ovali-lanceolato, 3-10^{ct.} longo, 2-4^{ct.} lato, ad apicem obtuso vel acuto, ad basin cuneato, in stipitem plus minusve producto; *costa subtus* parum exerta, angulata, supra complanata, ante limbi apicem, in venas evanescente; *venis* immersis, tenuibus, vix conspicuis, e basi ascendentے patentibus, semel aut iterum bifurcatis; *limbo fertili* 3-4^{ct.} longo, 10-12^{ml.} lato, petiolo duplo longiore suffulto.

Rizoma delgado, ~~largamente~~ ^{DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES INTEGRAL} ~~rastrero~~, adherido al tronco de los árboles, esparcido de escamas pequeñas, aovadas ó triangulares, negras en el ápice; *estípites* esparcidos, distantes, 3-5^{ct.} largos, negruzcos en la base, en lo demás verdes con manchas negruzcas, marginados en la mitad superior, esparcidos de escamas pequeñas, enteras, caducas; *limbo estéril* 3-10^{ct.} largo, 2-4^{ct.} ancho, oval-lanceolado ó romboidal, más ó menos prolongado desde la tercera ó cuarta parte inferior hacia el ápice puntiagudo ú obtuso, acuñado en la base, y escorrido hasta ultra la mitad del estípite, densamente membranáceo ó casi coriáceo, esparcido, especialmente en la página inferior, de puntos ó manchas verde-negruzcas; *nervio medio* poco pronunciado en la página inferior, complanado en la superior; *venas* inmersas, poco distintas, erecto-patentes, 1-2 veces bifurcadas; *limbo fértil* 3-4^{ct.} largo, 10-12^{ml.} ancho, sostenido por un estípite el doble más largo.

Crece en los bosques de la región subtropical y tropical, adherido á los troncos de los árboles vetustos.

13. *A. Lindenii* Bory.; *rhizomate* brevi, erecto vel ascendente, squamis linear-setaceis rigidulis, nigris dense

stipato; *stipitibus* fasciculatis, filiformibus, 5-20^{ct.} longis, pilosiusculis, denique glabris; *limbo sterili* ovato vel ovato-elliptico, 2-8^{ct.} longo, 1-3^{ct.} lato, apice obtuso vel apiculato, basi rotundata vel truncata; *consistentia* herbaceo-membranacea, superficie utraque sparse squamu-losa, denique glabra, viridi, margine parce setuloso-cilia-to; *nervo medio* utrinque parum exerto, imberbi; *venis* erecto-patentibus, remotis, semel unifurcatis aut indivi-sis, intra marginem in glandulam terminatis; *limbo fertili* minore, subconformi, stipite graciliore et plerumque bre-viore, suffulto.

Bory apud Féé loc. cit. pag. 48 tab. 18 fig. 3; A. blepharodes Féé ibid. tab. 24 fig. 3; Hk. Sp. V. pag. 223; Hk. & Bk. Syn. pag. 404.

Rizoma muy corto, erguido ó ascendente, poblado de rai-cillas numerosas, filiformes, abultado por los restos de los estí-pites antiguos y poi escamas muy densas, setáceo-lineares, rígi-das, negras; *estípites* fasciculados, gráciles, filiformes, herbáceos, esparcidos de escamillas analogas á las del rizoma, pero menores, caedizas, 5-20^{ct.} largos; *limbo estéril* 2-8^{ct.} largo, 1-3^{ct.} ancho, herbáceo-membranáceo, verde, esparcido de ambos lados de es-camillas setosas, prontamente caducas, más densas y persisten-tes en el margen, aovado ó aovado-elíptico, obtuso, apiculado ó acuminado en el ápice, redondeado ó truncado en la base; *ner-vio medio* poco pronunciado de ambos lados, desvanecido antes del ápice, imberbe; *venas* distantes, erecto-patentes, una sola vez bifurcadas ó indivisas, terminadas dentro del margen en glán-du-la gruesa, puntiforme; *limbo fértil* ordinariamente mucho menor 2-3^{ct.} largo, 1-1½^{ct.} ancho, sostenido por un pecíolo más grá-cil y ordinariamente menor que el de los estériles.

Crece en la región arbórea superior de la cordillera occidental sobre 3.000 metros adherido á las rocas y troncos de los árboles.

14. *A. hybridum* Bory; *rhizomate* erecto vel as-cendente, squamis lineari-setaceis, nigris vel castaneis, dense obtecto; *stipitibus* fasciculatis 15-30^{ct.} longis, gra-cilibus, rigidulis, stramineis, squamis setaceis, divaricatis plus minusve dense obtectis; *limbo sterili* 10-25^{ct.} longo, 2½-3^{ct.} lato, membranaceo, utrinque pilis setaceis nigre-scentibus, secus costas et marginem densioribus, squarro-sis consperso, ad apicem acuminato, ad basin rotundato vel acuto, costa subtus exerta; *venis* tenuibus, subhor-i-zontaliter patentibus, semel aut iterum bifurcatis; *limbo fertili* angustiore, minore, longius stipitato.

Bory, apud. Fée. loc. cit. pag. 40 tab. 9. fig. 4; Hk. & Grev. Ic. Fil. tab. 21; Hk. Sp. V. pag. 210; Hk. & Bk. Syn. pag. 403.

β. vulcani Bory; *squamis rhizomatis*, anguste setaceis, rigidis, nigris; *stipitibus* gracilibus; *limbo sterili* elliptico-lanceolato, acuminato, 8-12^{ct.} longo; *venis laxioribus*, glandula magna terminatis.

A. hybridum *β. vulcani* Leperv. in Fée. loc. cit. pag. 41. tab. 9. fig. 3.

Rizoma breve, erguido ó ascendente, leñoso, cubierto de escamas lineares, setáceas, rígidas, negras ó membranáceas y encrespadas, rojizas; *estípites* fasciculados, endebles, 15-30^{ct.} largos, pajizos, cubiertos de escamas setosas, largas, esparrancadas, negruzcas, caedizas; *limbo estéril* herbáceo-membranáceo, verde de ambos lados, esparcidos inferiormente de escamas setosas, negruzcas, caedizas, densas y esparrancadas en el nervio medio y en el margen, 10-25^{ct.} largo, 2½-5^{ct.} ancho, oblongo elíptico, acuminado ó cuspidado en el ápice, redondeado en la base: *nervio medio* débil, sobresaliente en la cara inferior, barbado; *venas* tenues, inmersas, ascendentes en la base, patentes, una ó dos veces bifurcadas, terminadas en glándula puntiforme en el margen; *limbo fértil* algo menor que el estéril, 6-12^{ct.} largo, 1½-3^{ct.} ancho, con estípite igual ó poco mayor que el del estéril.

β. vulcani; *escamas del rizoma* angostamente setáceas, rígidas, negras; *estípites* casi filiformes; *limbo estéril* elíptico, angostado y acuminado en el ápice; *venas* ascendentes, más distantes que en la forma común, terminadas en glándula mayor dentro del margen.

Crece, la forma primaria en los bosques de la región tropical á 800 metros; la secundaria en las faldas occidentales del Pichincha á 3.200-3.600 metros.

15. *A. castaneum* Bk.; *rhizomate* lignoso, breviter repente vel ascendente, apicem versus *squamis linearibus*, membranaceis, castaneo-fuscis obtecto; *stipitibus* approximatis, rigidis, castaneo-nitidis, basin versus *squamis minutis conspersis*; *sterilibus* 10-20^{ct.} longis; *fertilibus* 20-50^{ct.} longis, crassioribusque; *limbo sterili* 15-30^{ct.} longo, 3-8^{ct.} lato, chartaceo vel subcoriaceo, utrinque nudo vel squamulis, minutis, setaceis consperso, secus marginem parce et decidue ciliato, ovali-vel oblongo-lanceolato, apice acuto vel obtuso, ad basin plus minusve longe cuneato vel acutato; *costa* subtus exerta, angulata

straminea; *venis* 1^{ml.} ab invicem remotis, erecto-patentibus in glandulam magnam intra marginem undulatum, crenulatum desinentibus; *limbo fertili* conformi, subaequali aut parum minore, angustiore, stipite longe maiore suffulto..

Bak. Journ. of Botany. ncv. ser. vol. VI. pag. 166.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, leñoso, cubierto en el ápice de escamas lineares, membranáceas, encrespadas, castaño-sojizas, inferiormente desnudo; *estípites* aproximados, erguidos, rígidos, esparcidos inferiormente de escamas setáceas, pequeñas, caducas, de color castaño ó castaño-negruzco, lustrosos; los *estériles* 10-20^{ct.}; los *fértiles* 20-50^{ct.} largos; *limbo estéril* 15-30^{ct.} largo, 3-8^{ct.} ancho, oval-ú oblongo-lanceolado, acuñado en la base, puntiagudo ó obtuso en el ápice, cartáceo ó casi coriáceo cuando seco, lampiño ó esparcido de escamas pequeñas, caedizas en la página inferior y en el margen; *nervio medio* robusto, sobresaliente en la página inferior; *venas* ascendentes-divergentes, distantes 1^{ml.} y más una de otra, terminadas en glándula globulosa dentro del margen que, á su vez, es ondulado y ligeramente apestañado; *limbo fértil* tan largo ó poco más corto, pero más angosto que el *estéril*, larga gradualmente prolongado hacia la base y sostenido por estípite más robusto y 4 ó 5 veces más largo que el de los *estériles*.

Crece en los bosques de la pendiente occidental de "el Corazón" entre 2.000 y 3.400 metros.

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

16. *A. papillosum* Bk; *rhizomate* breviter repente aut ascendente, lignoso, robusto, squamis linearis-subulatis, brevibus, rigidis dense imbricato; *stipitibus* approximatis, 20-50^{ct.} longis, rigidis, striatis, squamulosis, stramineis aut sordide griseis; *limbo sterili* 30-60^{ct.} longo, 8-12^{ct.} lato, ex basi ovata et plus minusve cuneatim deorsum producta, apicem versus longe angustato, acuminato, membranaceo vel (in sicco) subcoriaceo, glabro, supra et secus marginem squamulis minutis, mox deciduis consperso, utrinque pallide viridi; *costa* utrinque exerta, modice valida; *venis* ex basi ascendente patentibus, semel aut iterum bifurcatis, intra marginem undulatum, crispatum in glandulam crassam terminatis; *limbo fertili* minore, subconformi, stipite longiore suffulto, margini sterili lato circumsepto; *sporangiis* laxis, suborbicularibus, annulo fere completo; *sporis* subrotundis, episporio laevi.

Bk., loc. cit.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, á veces, prolongado y erguido, cubierto, en la parte superior, de escamas lineares, pequeñas, rígidas, negras, densamente empizarradas; *estípites* aproximados, 20-50^{ct.} largos, relativamente gráciles, erguidos, rígidos, estriados, esparcidos de escamas pequeñas, caedizas, de color pajizo ó gris-oscuro; *limbo estéril* 30-60^{ct.} largo, 8-12^{ct.} ancho, aovado en la base y más ó menos largamente prolongado en el estípite, angostado gradualmente hacia el ápice, ondulado y encrespado en el margen, de consistencia membranácea, flácida al estado vivo, apergaminada cuando seco, lampiño de ambos lados ó esparcido de escamillas pequeñas, prontamente caedizas, especialmente en el nervio y el margen; *nervio medio* medianamente robusto, redondeado en la página inferior, comiplanado en la superior; *venas* distantes, ascendentes en la base, superiormente erect o-patentes, 1-2 veces bifurcadas, terminadas en gláudulas gruesas dentro del margen; *limbo fértil* menor, de forma parecida á la del estéril, más estrecho y más largamente prolongado en la base, rodeado por un margen estéril de 2-3^{ml.}; *esporangios* laxamente dispuestos, casi orbiculares, con anillo casi completo; *esporas* redondas, lisas.

Crece en los bosques de la cordillera occidental del Pichincha, Corazón, Chimborazo etc. entre 1.800 y 3.200 metros.

17. *A. isophyllum* nov. sp.; *rhizomate* erecto vel ascendente, lignoso, sursum squamis linear-setaceis, rigidis, denticulatis, nigris imbricato; *stipitibus* approximatis erectis, rigidis; *sterilibus* 5-15^{ct.} longis; *fertilibus* subduplo longioribus, utrisque minute squamosis; *limbo sterili* 15-30^{ct.} longo, 3-5^{ct.} lato, utrinque angustato, deorsum gradatim in stipitem decurrente, subcoriaceo, utrinque et ad marginem squamulis setaceo-linearibus, nigrescentibus, minutis, deciduis consperso; *costa* subtus elevata, robusta, in sicco striata; *venis* erecto-patentibus, semel aut iterum bifurcatis; *limbo fertili* sterilem subaequante, conformi, petiolo plerumque (nunc duplo) longiore, squamis inter sporangia commixtis; *sporangiis* densis, annulo subdimidiato; *sporis* oblique obovatis, dense et minutissime muriculatis.

Rizoma brevemente rastrero ó ascendente, leñoso, robusto, densamente empizarrado hacia el ápice por escamas linear-alesnadas, denticuladas, rígidas, castaño-negras; *estípites* aproximados, erguidos, rígidos, estriado-asurcados, cubiertos de escamas análogas á las del rizoma, pero más pequeñas, persistentes; los *estériles* 5-15^{ct.} largos; los *fértiles* 2 y hasta 3 veces más largos; *limbo estéril* 15-30^{ct.} largo, 3-5^{ct.} ancho, angostado desde la mitad en ambas direcciones y más bruscamente hacia la base, sub-

coriáceo, esparcido de ambos lados de escamas setosas, negruzcas, más densas á lo largo del nervio medio y del margen; *nervio medio* robusto, sobresaliente y asurcado en la página inferior; *venas* erecto-divergentes, aproximadas, 1-2 veces bifurcadas, terminadas en glándula gruesa, puntiforme dentro del margen; *limbo* *fértil* conforme, algo menor que el estéril, con estípite algo mayor, y hasta dos veces más largo que el del estéril; *esporangios* densos, obovados, casi demediados; *esporas* muy finamente muciculadas.

Crece en los bosques de la región arbórea superior de los volcanes Corazón y Pasocha.

Continuará.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL