

CRYPTOGAMIE VASCULARES QUITENSES

AUCTORE, ALOISIO SODIRO, S. J.—Universitatis Professore.

(Continuatio. Vid. pag. 44).

13. *C. puberula* Sod.; *fronde* tripinnatifida; *rachi* basin versus leviter muriculata, straminea, subtus rachillisque pulverulenta, supra tenuiter tomentoso-hispida; *pinnis* remotis, patentibus, flaccidis, breviter stipitatis, lanceolatis, 30-35^{ct.} longis, 8-10^{ct.} latis, inferioribus minoribus, reflexis; *rachillis* debilibus, subpendulis; *pinnulis* subsessilibus, lanceolatis, e basi latiore sursum gradatim in apicem dentatum angustatis, profunde pinnatifidis, utrinque leviter puberulis, in costis hispidulis, 1-5^{ct.} longis, 1-1½^{ct.} latis; *segmentis* lineariligulatis, obtusis, remote dentatis; *venis* utrinque 4-6, plerisque indivisis et soriferis; *soris* 3-6-iugis, costulae adpressis; *involucro* completo, vesciculoso, hyalino, irregulariter fatiscente, persistente; *receptaculo* convexo, longe piloso; *sporangiis* cuneatis, annulo completo; *sporis* punctulatis, subtrilobis.

Sod. "Recensio" pag. 16.

Tronco 1-2 metr. alto, delgado, coronado por pocas frondes en el ápice; estípites 25-30^{ct.} largos, ligeramente muricados, pajizos, así como las raques y raquillas, pulverulento-tomentosos; frondes 1½ metr. largas, herbáceo-papiráceas, oblongas; pinas distantes, brevemente pecioladas, lanceoladas; raquillas endeblemente pubescentes en el dorso y así como el nervio medio de las pínulas, hispidas en el lado superior; las inferiores menores, recorvadas; pínulas sésiles ó casi sésiles, lanceoladas, angos-

tadas gradualmente hacia el ápice puntiagudo, dentado, divididas hasta 1^{ml.} del nervio medio en segmentos lineares, ligulados, obtusos, remotamente dentados; *venas* 4-6 pares, sólo las inferiores bifurcadas; *soros* 4-6 pares, relativamente gruesos, arrimados al nervio medio; *involucro* completo, ancho, tenuemente cartilagíneo, lampiño, dividido en 3-4 partes irregulares, persistentes; *receptáculo* elevado, enanchado y largamente peloso en el ápice; *esporangios* acuñados, con anillo completo, formado de células numerosas, comprimidas; *esporas* trígonas, casi trilobas, punteadas.

Crece en la orilla del río Peripa cerca de San Miguel de los Colorados á 400 metros.

14. *C. squamipes* Karst.; *stipitibus* 80-100^{ct.} longis, aculeatis, stramineis, ad basin squamis linear-lanceolatis, longe subulatis, albo-marginatis densissime obtectis et tomento pulverulento, una cum rachibus rachillisque obtectis; *frondibus* 2-2½ metr. longis, 1,30-1,40^{ct.} latis, ovali-lanceolatis, tripinnatifidis, dense papyraceis; *rachibus* muricatis, stramineis, secus latera deorsum squamosis; *pinnis* breviter stipitatis, lanceolatis, basi breviter contractis, 70-80^{ct.} longis, 20-25^{ct.} latis; *pinnulis* sessilibus, lanceolatis, acuminatis, dense papyraceis, supra in costis venisque hispidalis, subtus squamulosis, profunde pinnatifidis, apice in cuspidem serratam productis; *venis* exertis, utrinque 10-12, omnibus, summis exceptis, semel aut iterum bifurcatis; *soris* nervo medio approximatis; *involucro* glabro, tenui, fragili in lacinias irregulares dehiscente.

Karst. Flor. Columb. tab. 99. pag. 199.

Estípites largos 80-100^{ct.}, cubiertos en la base de escamas linear-lanceoladas, largamente alesnadas, 4^{ct.} y más largas, de color castaño en el centro, blanquecinas en el margen, prontamente caedizas en el lado inferior, persistentes en el superior, armados hacia la base de agujones, 1^{ct.} y más largos, y muricados superiormente, así como la mitad inferior de las raquetas; *frondes* tripinatifidas, aovado-lanceoladas, 200-2,50^{ct.} largas, 1,30-1,40^{ct.} anchas; *raquetas*, así como las raquillas y el nervio medio de las pínulas, setoso-hispida en la parte superior, pulverulento-tomentosas y finalmente lampiñas en la inferior; *pinas* brevemente pecioladas, las de la mitad superior sésiles, lanceoladas, acuminadas, 70-80^{ct.} largas, 20-25^{ct.} anchas, las inferiores menores, reflejadas; *pínulas* sésiles, lanceoladas, prolongadas en cús-pide larga y aserrada, de consistencia densamente papirácea, hispidas en el nervio medio y venas de la parte superior y espar-

cidas de escamillas vesiculosas y setosas en la inferior, en lo demás lampiñas, divididas hasta cerca del nervio medio en segmentos linear-ligulados, falcados, ligeramente crenado-dentados en el borde exterior; *venas* 10-12 de cada lado, prominentes, una ó (las del lado exterior) dos veces bifurcadas á poca distancia del nervio medio, en la bifurcación soríferas; *involucro* tenue, muy fragil, dividido por la dehiscencia en partes muy irregulares.

Crece en los bosques subtropicales y subandinos de la cordillera occidental cerca de Canzacoto, Nicbli, Nanegal, etc.

15. *C. Dyeri* nov. spec.; *caudice* 1-2 metr. alto, 6-8 ct. crasso; *stipitibus* 25-30 ct. longis, deorsum squamosis, parce muricatis; *frondibus* 1½-2 metr. longis, 80-100 ct. latis, ovali-lanceolatis, tripinnatifidis; *rachibus rachillisque* supra arachneoso-tomentosis, squamulisque linearibus conspersis; *pinnis* sessilibus, 40-50 ct. longis, 10-15 ct. latis; *pinnulis* sessilibus, approximatis, cum rachi articulatis, erecto-patentibus, lanceolatis profunde pinnatifidis, apice in cuspidem linearem, crenatam productis, supra ad costas et venas sparse hispidis, subtus squamis polymorphis, albidis, laceris obtectis; *venis* utrinque 6-8, plerisque indivisis; *soris* numerosis, costae adpresis; *involucro* incompleto, vesiculoso, irregulariter dehiscente; *receptaculo* stipitato, elevato, ad apicem setoso-hispido,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Tronco 1-2 metr. alto, grácil; *estípites* 25-30 ct. largos, escamosos y muricados en la base; *frondes* aovado-lanceoladas, tripinatifidas, endebles y con el ápice y las pinas péndulas cuando tiernas, 1½-2 metr. largas; *raques* y *raquillas* esparcidas en el lado superior de escamas linear-filamentosas, mezcladas con tomento largo, algodonoso, ceniciente, pulverulento-escamosas en el lado superior; *pinas* articuladas con las raques, sésiles ó casi sésiles, horizontalmente patentes, lanceoladas ó lanceolado-oblongas, algo contraídas en la base, 40-50 ct. largas, 10-15 ct. anchas; *pinnulas* sésiles, patentes, aproximadas, casi coriáceas, lanceoladas, divididas casi hasta la raquis en segmentos linear-lancealados, oblicuos, obtusos, con el margen revuelto casi entero y prolongadas en el ápice en cúspide larga y crenada, superiormente lampiñas, esparcidas de pelos breves, setosos en el nervio medio y las venas, inferiormente cubiertas de escamas polimorfas, las unas anchas, papiráceas, blancas, muy caedizas, las otras menores irregularmente desgarradas en el borde, otras, finalmente aovadas, acuminadas, cóncavas en la base; *venas* 6-8 de cada lado, todas indivisas ó las inferiores del lado exterior bifurcadas; *invo-*

lucro incompleto, (siempre?) cartilaginoso, vesiculoso, irregularmente dehiscente; receptáculo brevemente estipitado, claviforme, setuloso-hispido.

Crece en los bosques al pie del Chimborazo, cerca de Saltuco de 300-600 metros.

Observación: En nuestra "Recensio" habíamos citado esta forma bajo el nombre de *C. boconensis* Karst. con la cual tiene, sin duda, mucha afinidad por la estatura, proporción de las frondes, escamas numerosas de la página inferior de las pinas etc. Difiere, sin embargo, por el indumento de las raques, articulación de las pinas, forma de las escamas ya mencionadas, por las venas, todas ó casi todas, indivisas etc.

16. *C. Azuayensis* nov. sp.; *caudice, stipitibus rachibusque ignotis; pinis superioribus (quae prostant) 35-40^{ct.} longis, 10-15^{ct.} latis, papyraceis, oblongo-lanceolatis; rachillis rigidis, utrinque striatis, costisque subtus parce pubescens, supra hispido-tomentosis; pinnulis cum rachi articulatis, patentibus, breviter petiolatis, lanceolatis, glabris, subtus squamis paucis, vesiculosis, caducis, conspersis, sere usque ad costam in segmenta latiuscula, acuta, subintegra divisis, apice dentato acuminatis; venis distinctis, utrinque 8-10, prope basin bifurcatis; soris costulae approximatis; involucro cartilagineo, subregulariter circumscisso; receptáculo parvo, piloso.*

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Tronco, estípites y raques desconocidos; pinas superiores (que sólo tenemos á la vista) 35-40^{ct.} largas, 10-15^{ct.} anchas, oblongo-lanceoladas, algo contraídas hacia la base y bruscamente en el ápice; raquillas rígidas, estriadas de ambos lados, casi cilíndricas, parcialmente pubescentes en el lado inferior, y (así como el nervio medio de las pínulas) hispido-tomentosas en el superior; pínulas brevemente pecioladas, patentes, 6-8^{ct.} largas, 10-12^{ml.} anchas, lanceoladas, acuminadas en el ápice dentado, y divididas hasta poca distancia del nervio medio en segmentos oblicuos, aovados, obtusos, casi enteros, esparcidas inferiormente de escamillas vejigosas, caducas; venas 8-10 de cada lado, inmersas pero distintas, bifurcadas desde muy de cerca de la base; soros medianos, aproximados al nervio medio; involucro entero, hyalino, cartilaginoso, irregularmente dehiscente en el ápice y circunciso en la mitad; receptáculo breve, pequeño, setuloso.

Crece en la cordillera oriental de la provincia de Azuay á 3.000 metros.—Rimbach. (F. n° 23).

Observación: Proponemos como dudosa esta especie por

la imperfección de los ejemplares. Se aproxima á la *C. incana* Karst. en las proporciones de sus partes, consistencia é indumento y por la articulación de las pínulas, más se distingue por el involucro y el receptáculo; tiene también alguna semejanza con nuestra *C. fulva*. Por la misma imperfección, omitimos una especie de este mismo género, y otra de *Hemitelia*, al parecer, diferentes de las que tenemos descritas.

17. *C. fulva* Sod.; *candice arboreo*, 5-6 metr. alto, 12-14^{ct.} (diametro) crasso, frondibus numerosis corona-to; *stipitibus* 50^{ct.} longis, dense spinuloso-muricatis, squamis lanceolato-subulatis, papyraceis, fulvis et tomento furfuraceo obtectis; *frondibus* subovato-ellipticis, 2-2½ metr. longis, tripinnatifidis; *rachibus* muricatis, rachillisque subtus furfuraceis, supra tenuiter tomentoso-hispidis; *pinnis* breviter stipitatis, erecto-patentibus, lanceolatis, 60-70^{ct.} longis, 20-25^{ct.} latis, inferioribus minoribus, reflexis; *pinnulis sessilibus*, horizontaliter patentibus, a medio deorsum reflexis, lanceolatis, ad apicem breviter cuspidatis, fere usque ad costam in segmenta linear-ligulata, falcata, margine remote dentata divisis, supra, costa hispida excepta, glabris, subtus squamis perulatis, crebris et pilis setulosis conspersis; *venis* utrinque 10-12, subtus prominulis, semel aut iterum bifurcatis; *sori* numerosis; *involucro* completo, fragili, irregulariter dehiscente.

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Sod. "Recensio" etc. pag. 13.

β. minor; *stipitum* aculeis crebioribus, validioribus; *frondibus* minoribus, squamis subtus densioribus obtectis; *involucro* fere regulariter dehiscente.

Tronco arbóreo, robusto, 5-6 metr. alto y 12-14^{ct.} en diámetro grueso, coronado en el ápice por frondes patentes, muy numerosas; *estípites* 50^{ct.} y más largos, robustos, rígidos, cubiertos de escamas lanceoladas, largamente alesnadas, de color castaño-rojizo, lustrosas que se extienden hasta la raques en las axilas de las pinas, y armados, así como la mitad inferior de las raques, de agujones muy numerosos, breves, robustos; *frondes* casi avado-elípticas, 2-2½ metr. largas, 1,40^{ct.} anchas, tripinatífidas, papiráceas ó casi coriáceas; *raques* y *raquillas* cubiertas en el dorso de tomento furfuráceo, rojizo y ferrujinoso, tomentoso-hispidas en la página superior; *pinas* brevemente estipitadas, casi patentes, lanceoladas, algo contraídas hacia la base, 60-70^{ct.} largas, 20-25^{ct.} anchas; las inferiores menores y recorvadas hacia

atrás; *pínulas* sésiles, horizontalmente patentes, las inferiores recorvadas, lanceoladas, prolongadas en el ápice en cúspide aserrada y divididas casi hasta el nervio medio en segmentos linear-ligulados, falcados, revueltos y aserrados en el margen, casi lamiñas en la cara superior, salvo el nervio medio ferruginoso-híspido, esparcidas en la inferior de escamas vesiculosas, rojizas y de pelos setulosos en los nervios y las venas; *venas* 10-12 de cada lado, las superiores enteras, las demás bifurcadas ó, especialmente las del lado exterior, dos veces bifurcadas; *soros* numerosos, con involucro completo, rojizo, cartilagíneo, frágil, irregularmente dehiscente; *receptáculo* pequeño, setuloso-híspido.

β. Estípites y raques armados de agujones más numerosos y robustos; *frondes* menores; *raques* y *raquillas* tufuráceo-tomentosas, no pubescentes; *página* inferior de las *pínulas* copiosamente escamosa; *involucro* dividido en partes casi regulares.

*Crecer en los bosques al pie del Chimborazo, cerca de Chilla-*nes, Tamboloma etc. y en los del Atacazo cerca de Canzacoto.

Gen. 5. HEMITELIA R. Br.

Involucrum inferum, subdimidiatum, cupuliforme, vel squamiforme, explanatum, integrum vel lobatum.

Involucro ínfero, demediado, cupuliforme, con el tiempo explanado ó en forma de escama QUITO, entero ó lobulado.

Helechos con tronco corto ó arborescente; *estípites*, por lo común, muricados ó espinosos, inferiormente escamosos; *frondes* uniformes, pinadas, bi-tripinatifidas; *venas* en los segmentos pinadas, todas libres ó, las inferiores, anastomosadas, simples ó bifurcadas; *soros* aproximados más ó menos ya al nervio medio ya al margen; *involucro* membranáceo; *receptáculo* elevado, desnudo ó híspido.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

§. 1º (EUHEMITELIA). *Venas* inferiores anastomosadas; *frondes* pinadas.

I. *Pinas* subsésiles, divididas apenas hasta la cuarta parte; *soros* 8-12 en cada segmento..... I. *H. subincisa*.

II. *Pinas* pinatifidas, sésiles.

A. *Segmentos* ligulados, obtusos..... 2. *H. grandifolia*.

B. *Segmentos* falcados, acuminados, enteros ó sinuoso-lobulados..... 3. *H. horrida*.

§. 2º (AMPHICOSMIA). *Venas* todas libres; *frondes* tripinatifidas.

I. *Venas* 5-7 de cada lado, comunmente indivisas.....

4. *H. obscura*.

- II.** *Venas* 8-12 de cada lado, casi todas bifurcadas.
- A.** *Raques y raquillas* inermes.
- a.** *Raques y raquillas* de color castaño lustroso; *pínas* y *pínulas* articuladas con las raques. 5. *H. firma*.
- b.** *Raques y raquillas* pálidamente pajizas; *pínas* y *pínulas* no articuladas con las raques. 6. *H. subcacia*.
- B.** *Raques* muricadas, pajizas; *pínas* y *pínulas* no articuladas.
- a.** *Pínulas* papiráceas, inferiormente escamosas; *segmentos* puntiagudos, dentados. 7. *H. cystolepis*.
- b.** *Pínulas* coriáceas, lampiñas; *segmentos* crenados. 8. *H. crenata*.

§. 1º (EUIHEMITELIA). *Venas* inferiores anastomosadas: *frondes* pinadas.

1 *H. subincisa* Kze.; “*caudice* (epigaeo) subnullo; *stipitibus* 40-60^{ct.} longis, erectis, robustis, inermibus, glabris aut leviter furfuraceis; *fronde* oblongo-deltoidea, pinnata, 1-1,25^{ct.} longa, 40-50^{ct.} lata, papyracea, utrinque glabra; *pinnis* subsessilibus, patentibus, oppositis vel alternis, 15-25^{ct.} longis, 2-4^{ct.} latis, secus marginem obtuse lobatis, in apicem serrulatum productis; *lacinias* denticulatis, leviter falcatis; *venis* pinnatim fasciculatis; *venulis* simplicibus, utrinque 4-8; *infirmis* anastomosantibus; *soris* mediis inter costam et marginem; *involutro* parvo membranaceo, nudo, integro vel lobulato, unilateraliter cupuliformi; *receptaculo* cylindrico, nudo”.


(Ex Baker Flor. Bras. vol. I. part. 2. pag. 311).
Hk. & Bk. Syn. pag. 27.

Tronco epígeo casi nulo, erguido; estípites 40-60^{ct.} largos, erguidos, robustos, inermes, de color castaño-pajizo, lampiños ó ligeramente furfuráceos; fronde oblongo-deltoidea, simplemente pinada, 1,25^{ct.} larga, 40-50^{ct.} ancha, papiráceo-herbácea, lampiña, intensamente verde en la página superior, pálida en la inferior; pínas casi sésiles, opuestas ó alternas, 10-12 de cada lado, patentes, 15-25^{ct.} largas, 2-4^{ct.} anchas, truncadas en la base, divididas apenas hasta la cuarta parte en lóbulos obtusos, denticulados, ligeramente falcados y prolongadas en el ápice en cúspide aserrada; venas fasciculadas, con 4-8 venillas enteras de cada lado, las inferiores anastomosadas, todas soríferas; soros intermedios entre el nervio medio y el margen; involucro pequeño, membranáceo, negruzco, desnudo, cupuliforme, entero ó lobulado; receptáculo cilíndrico, desnudo.

Crecé en el Ecuador, colectada por Spruce.

2. *H. grandifolia* Spreng.; *caudice* brevi, erecto, crasso, squamoso; *stipitibus* 1-1½ metr. longis, digitum crassis, erectis, rigidis, squamis membranaceis, pallide ferrugineis et tomento pulverulento obtectis; *lamina* stipitem subaequante, 30-40^{ct.} lata, deltoideo-oblonga, bipinnatifida; *rachi* ferrugineo-tomentosa; *pinnis* oppositis, sessilibus, remotis, erecto-patentibus, 25-30^{ct.} longis, 3-5^{ct.} latis, papiraceis, supra saturate-viridibus, glabris, subitus pallidioribus, ex basi truncata, in inferioribus contracta, lanceolatis, fere usque ad medium pinnatim-lobatis, in apicem serratum gradatim contractis; *lobis* ascendentibus, obtusis, denticulatis; *venis* laciniarum utrinque 10-13, exertis, prope basin bifurcatis; *venula* infima cuiusque laciniae cum infima alterius connata; *superioribus* post bifurcationem iterum vicissim confluentibus, omnibus, summis exceptis, fertilibus; *soris* minutis, prope medium venulae cuiusque insertis; *involucro* membranaceo, bi-tripartito.

Hk. Spec. I. pag. 30; *Hk. & Bk. Syn.* pag. 28
Cyathea grandifolia Willd.



Tronco muy corto, erguido, robusto, carnoso escamoso y cubierto, así como los estípites, en presfoliación, de una capa mucilaginosa muy abundante; *estípites* 1-1½ metr. largos del grosor de un dedo y más, breve y remotamente muricados y cubiertos de escamas tenuemente membranáceas, lanceoladas, pubescentes, rojizas y de tomento tenue y blando; limbo deltoideo-oblongo, 1-2 metr. largo, bipinnatifido; *raquis* rígida, robusta, semicilíndrica, pubescente tomentosa; *pinas* sésiles, opuestas, distantes, erecto-patentes, oblongo-lanceoladas, papiráceas, intensamente verdes y lampiñas en la página superior, pálidas y brevemente pubescentes en la inferior, 25-30^{ct.} largas, 3-5^{ct.} anchas, divididas casi hasta la mitad en lóbulos ascendentes, obtusos y denticulados en el ápice; *venas* 10-13 de cada lado de los segmentos, finas, prominentes, una ó dos veces bifurcadas; la inferior de cada segmento anastomosada con la del segmento próximo y los ramos de las siguientes confluentes entre sí; *soros* colocados hacia la mitad de cada venilla; *involucro* firme, 2-ó 3-partido, persistente.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales de la región occidental, hasta 1.600 metros.

3. *H. horrida* Br.; *caudice* arborescente; *stipitibus* aculeatis, squamosis, squamis caducis, ovatis, acuminatis, centro castaneis, margine albido, serrulato; *frondibus*

amplis, bipinnatifidis, oblongo-lanceolatis, acuminatis; segmentis pinnulisve approximatis, lanceolatis, acuminatis, integris vel infimis lobatis vel subpinnatifidis; lobis brevibus, obtusis; venis pinnatim fasciculatis, utrinque 15-20, bi-trifurcatis, supremis indivisis; infima cuiusque segmenti cum proxima segmenti collateralis coniuncta; soris in venuis singulis versus apicem sitis, in series irregulares dispositis.

Hk. Sp. I. pag. 30. tab. 15; Id. Fil. exot. tab. 69. H. Imrayana Hk. Sp. pag. 33. et. Ic. Plant. tab. 669; Hk. & Bk. Syn. pag. 28.

Tronco arborescente, 2-3 metr. alto (Mett.) muy grueso; estípites erguidos, robustos, espinosos, cubiertos de escamas aovadas, acuminadas de color castaño en el centro, blanquecinas y dentadas, en el margen y cubiertos al principio de tomento aracneoso, finalmente desnudos; frondes muy grandes, 2-3 metr. largas, bitripinatifidas; pinas sésiles, oblongo-lanceoladas, profundamente pinatifidas ó inferiormente pinadas, con los lóbulos ó pínulas 8-10^{ct.} largos, oblongo-lanceolados, falcados, acuminados, enteros ó ligulado-pinatifidos; venas pinadas, 2-3 veces bifurcadas, las superiores indivisas; la inferior de cada segmento reunida con la correspondiente del segmento colateral; soros colocados hacia la extremidad de cada venilla, formando en cada segmento dos series irregulares continuas hasta cerca del ápice; involucro demasiado, irregularmente dentado en el borde.

Crece en el Ecuador, colectada por Jameson.

§. 2º (AMPHICOSMIA). Venas todas libres; frondes tripinatifidas.

4. *H. obscura* Mett.; caudice erecto, 1-2 metr. alto, 4-6^{ct.} diametro crasso, squamis linear-lanceolatis, adpressis, atris imbricato; stipitibus 70-80^{ct.} longis, sparse aculeatis, squamis castaneis, deciduis et tomento pulverulento obtectis; frondibus 1½-2 metr. longis, 60-70^{ct.} latis, ovali-lanceolatis, tripinnatifidis; pinnis petiolatis, 30-45^{ct.} longis, 6-7^{ct.} latis, e basi truncata vel breviter contracta, fere usque ad apicem aequa latis, ad apicem abrupte acuminatis; pinnulis sessilibus, lanceolatis, subpatentibus, acutis, in segmenta contigua; ligulata, obtusa, crenato-dentata divisus; venis utrinque 4-6, indivisis, prope medium, summis exceptis, soriferis; soris minutis, 2-4; involucro tenui, membranaceo, irregulariter fibriliato.

*Mett. apud. Karst. Flor. Columb. vol. II. pag. 183.
tab. 197.*

Tronco 1-2 metr. alto, 4-6^{ct.} en diámetro grueso, cubierto de escamas cartilaginosas, negras en el centro y blanquecinas en el borde, 3^{ct.} largas, empizarradas y persistentes; *estípites* numerosos, erguidos, 80^{ct.} y más largos, armados de agujones robustos, esparcidos y cubiertos de escamas lanceoladas, falcadas, de color castaño-negruzcas y de tomento pulverulento, ferrugíneo, extendido también á las raques y raquillas; *frondes* aovado-lanceoladas, 1½-2 metr. largas, 60-70^{ct.} anchas, tripinatífidas; *raques* rígidas, pajizas, más ó menos muricadas; *pinas* alternas, sésiles, las inferiores brevemente estipitadas, erecto-patentes, 30-45^{ct.} largas, 6-7^{ct.} anchas, truncadas ó, las inferiores, angostadas en la base, casi igualmente anchas desde la base hasta la parte superior bruscamente contraida en ápice acuminado; *pínulas* membranáceas, hirsutas en la página inferior, sésiles, aproximadas, casi contiguas, 4-5^{ct.} largas, 1-1½^{ct.} anchas, puntiagudas, divididas hasta cerca del nervio medio en segmentos contiguos, ligulados, obtusos, crenado-dentados; *venas* 4-6 de cada lado, por lo común, todas indivisas, libres; *soros* pequeños, 2-4 de cada lado, situados hacia la mitad de las venas; *involucro* membranáceo, pequeño, irregularmente lacinulado.

Crecé en la región subtropical en la orilla del río Pilatón, desde 800-1.600 metros.

5. *firma* Bk.; "fronde amplia, tripinnatifida; rachibus castaneis, squamis aculeisque destitutis, rachillisque supra hispidis, subtus tenuiter pulv. tomentosis, demum glabris, nitidis; pinnis stipitatis, patentibus, lanceolatis, 50-70^{ct.} longis, 12-15^{ct.} latis, coriaceis glabris; pinnulis sessilibus, lanceolatis, ad apicem acuminati, basi truncatis profunde pinnatifidis; segmentis lanceolatis, acutis, ascendentibus, margine serrulatis; venis utrinque 8-10, plerisque prope costam bifurcatis; soris minutis, costae adpressis, utrinque 6-8; involucro minuto".

Bk. in Journ. of. Botany. 1877, 161.

Tronco 2-3 metr. alto, grácil; *frondes* 2-2½ metr. y más largas, 100-1.30^{ct.} anchas; *raques* inermes, sin escamas, y así como las raquillas tenuemente cubiertas de tomento pulverulento, prontamente caedizo, finalmente lampiñas, lustrosas de color castaño-negro; *pinas* estipitadas, patentes, articuladas, así como las *pínulas*, con las *raques*, lanceoladas, acuminadas, 50-70^{ct.} largas, 12-15^{ct.} anchas; *pínulas* coriáceas, lampiñas, blanquecinas inferiormente, sésiles, lanceoladas, largamente prolongadas.

gadas en cúspide linear, aserrada, y profundamente divididas en segmentos linear-lanceolados, ascendentes, puntiagudos, dentados de ambos lados; *venas* 8-10 de cada lado, bifurcadas á poca distancia de la base; *soros* pequeños, arrimados al nervio medio, 6-8 de cada lado; *involucro* pequeño, membranáceo, rígido, al principio cupuliforme, finalmente explanado.

Crece en la orilla del río Peripa, entre 300-450 metros.

6. *H. subcaesia* nov. sp.; *caudice* 3-4 metr. alto, 14^{ct.} crasso; *stipitibus* aculeis crebris, brevibus armatis, stramineis, deorsum squamis lanceolatis, subulato-cuspidatis obtectis; *frondibus* ovali-lanceolatis, 2-2½ metr. longis, 1,20-1,40^{ct.} latis, tripinnatifidis; *rachibus* basin versus sparse muricatis, ceterum inermibus, rachilisque dorso glabris, stramineis, supra adpresso strigillosis; *pinnis* alternis, subsessilibus, patentibus lanceolatis, inferioribus minoribus; *pinnulis* sessilibus, lanceolatis, apice acuminatis, serratis, profunde pinnatifidis, supra, costa hispida excepta, glabris, intense viridibus, subtus nudis vel ad costam venasque pilosis, glaucescentibus; *laciinis* late linearibus, subfalcatis, ad apicem oblique acutis, secus marginem leviter revolutum denticulatis; *venis* utrinque 8-10, plerisque prope basin furcatis et soriferis; *soris* mediocribus, virescentibus; *involucro* cupuliformi, tenui, fragili, cum sporangiis, basi excepta, deciduo.

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Tronco arbóreo, 3-4 metr. alto, 14^{ct.} en diámetro grueso; *estípites* 40-50^{ct.} largos, patentes, pajizos oscuros, cubiertos la tercera parte inferior de escamas lanceoladas, alesnadas, blanquecinas en el margen y armados de agujones breves y numerosos; *fronde* 2-2½ metr. larga, 1,20-1,40^{ct.} anchas, hacia la tercera parte inferior, algo angostadas hacia la base, tripinnatifidas; *raquis* muricada inferiormente, en lo demás inerme y con las raquillas lampiño-pajizas en el dorso, setuloso-hispida, con pelos ajustados á la superficie en el lado superior; *pinas* casi sésiles, patentes, lanceoladas, iguales ó brevemente contraídas en la base, 60-70^{ct.} largas, 20-24^{ct.} anchas, las inferiores algo menores; *pinnulas* sésiles, lanceoladas, acuminadas y aserradas en el ápice, profundamente pinatifidas, lampiñas é intensamente verdes en la página superior, blanquecinas y lampiñas ó setuloso-pelosas y con escamillas caedizas en el nervio medio y venas de la inferior; *segmentos* anchamente lineares, casi falcados, oblicuamente puntiagudos, con el margen algo revuelto y denticulado; *venas* 8-10 de cada lado, las más bifurcadas y fértiles á poca distancia de la base; *soros* medianos, verduzcos; *involucro* cupuliforme,

muy fino y quebradizo, la parte superior decidua con los esporangios.

Crece esporádicamente en los bosques subandinos de la cordillera occidental hasta 2.800 metros.

7. *H. cystolepis* Bk.; *stipitibus* 50-60^{ct.} longis, a-culeatis, *squamis* linear-subulatis, cartilagineis, pallide castaneis dense obtectis, et fuligine grisea, una cum rachibus, conspersis, denique nudis, stramineis; *frondibus* ovali-vel oblongo-lanceolatis, 2-3 metr. longis, 1,20-1,40^{ct.} latis, dense papyraceis, tripinnatifidis; *rachibus* supra tomentoso-hispidis, secus latera et ad basin pinnarum *squamis* deciduis conspersis, dorso muricatis; *pinnis* breviter petiolatis vel subsessilibus, patentibus, lanceolatis, 60-70^{ct.} longis, 12-14^{ct.} latis; *inferioribus* paulatim reductis; *pinnulis* sessilibus, ex basi truncata latiore, sursum gradatim angustatis, in cuspidem linearrem, serrulatam productis, profunde pinnatifidis, subtus *squamis* polymorphis, plerisque vesciculosis obtectis; *lacinias* linearibus, contiguis, falcatis, margine serrulatis; *venas* utrinque 6-10, plerisque parum a basi bifurcatis, in bifurcatione soriferis; *soris* maiusculis, rufoescentibus; *involucro* tenui, fragili, irregulariter dehiscente, fugacissimo; *receptaculo* subgloboso, hirsuto.

Bk. A Summary of the new Ferns. etc. pag. 6;
Cyathea cystolepis Sodiro; Recensio 15.

Tronco elevado 5-6 metr. alto; estípites robustos, 50-60^{ct.} largos, con agujones largos, delgados inferiormente, siempre más cortos en la parte superior y en las raquetas, cubiertos en la mitad inferior de escamas linear-alesnadas, castaño-pajizas, hasta 5^{ct.} largas y, así como las raquetas, de tomento pulverulento muy fino, caedizo, finalmente desnudos, pajizos; frondes oval-oblongas, tripinnatifidas, de consistencia densamente herbácea, casi coriáceas cuando secas; raquetas tomentoso-hispidas del lado superior y espaciadas, especialmente en la axila de las pinas, de escamillas caedizas; pinas brevemente pecioladas, endebles, péndulas cuando tiernas, lanceoladas, 40-70^{ct.} largas, 12-14^{ct.} anchas; las inferiores menores, angostadas hacia la base; pínulas sésiles, patentes, lanceoladas, angostadas uniformemente desde la base y terminadas en cúspide linear-aserrada; superiormente en el nervio medio, así como la página superior de las raquillas, ferruginoso-hispidas, inferiormente cubiertas de escamas polimorfas, algunas vesiculosas, otras planas, aovadas, fibriloso-simbriadas; segmentos lineares, falcados, obtusos, revueltos y denticulados en el margen; venas 6-10 de cada lado, las más bifurcadas á poca distancia de la base, casi todas fértiles; soros relativamente grandes, rojizos; in-

volucro muy tenué, frágil, irregularmente dehiscente, fugaz; receptáculo elevado, casi globuloso, hirsuto.

Crece en los bosques subandinos y subtropicales en el Corazón y en el Atacazo.

8. *H. crenata* Sod.; caudice arboreo, 3-4 metr. alto, *stipitibus* 35-50^{ct.} longis, robustis, dorso aculeis brevibus, conicis armatis, squamis lanceolato-subulatis, castaneo-nigris, rachibusque tomento pulverulento-fulliginoso conspersis; *lamina* 3 metr. longa, 1,30-1,60^{ct.} lata, intense viridis, glabra, tripinnatifida vel ad basin tripinata, deltoideo-oblonga; *rachibus* *rachillisque* dorso muricatis, scabris; *pinnis* breviter stipitatis, patentibus; inferioribus lanceolato-oblongis, basi contractis, subreflexis, ceteris e basi truncata lanceolatis, acuminatis, 70-80^{ct.} longis, 20-24^{ct.} latis; *pinnulis* subsessilibus, coriaceis, glabris; *costa* supra breviter hispidis, subtus costulisque furfuraceo-lepidotis, squamisque minutis, deciduis conspersis, e basi truncata, sursum in cuspidem elongatam, linearem serratam productis, in *pinnis* inferioribus pinnatis, in superioribus usque ad costam anguste alatam, in segmenta linear-ligulata, falcata, obtusa, ad marginem revolutum crenata divisus; *venis* utrinque 12-15, semel aut bis bifurcatis, omnibus fertilibus; *soris* crassis, rubentibus, costae et sibi invicem arcte adpressis; *involutero* tenuissimo, cum sporangiis membratin caduco; *receptaculo* clavato, brevissime pubescente.

Sod. Recensio pag. 18; Bk. loc. cit.

Tronco arbóreo, 3-4 metr. alto, 12-15^{ct.} en diámetro grueso; *estípites* 35-50^{ct.} largos, 2-3^{ct.} gruesos en la base, armados de agujones numerosos, breves, cónicos, cubiertos en la mitad inferior de escamas lanceolado-alesnadas, truncadas ó ligeramente acorazonadas en la base, densamente cartilaginosas, negras, y de tomento furfuráceo detergible, blanquecino, compuesto de escamillas muy pequeñas que se extienden á las raqués y raquillas; *fronde* oval-ó deltoideo-lanceolada, 3 metr. larga, 1½ metr. y más ancha, coriácea, casi lampiña, tripinada en la base, superiormente tripinnatifida; *raqués* y *raquillas* en el dorso muricado-ásperas, pulverulentas, finalmente lampiñas, pajizas; *pinas* casi sésiles, patentes ó las inferiores reflejas, lanceoladas, angostadas gradualmente hacia el ápice; las inferiores algo contraídas en la base; *pínulas* sésiles ó casi sésiles, patentes, casi contiguas, truncadas en la base, adelgazadas hacia el ápice y terminadas en cúspera larga, linear, inferiormente crenadas y remotamente aserra-

das en el ápice, divididas hasta la raquis, ligeramente alada ó desnuda en las pinas inferiores, en segmentos linear-ligulados, falcados, obtusos, revueltos y más ó menos crenados en el margen, lampiñas en la página superior, salvo el nervio medio brevemente setuloso-híspido y con escamillas caedizas en la inferior; *venas* 12-15 de cada lado, todas bifurcadas y soríferas; *soros* grandes, rojizos, ajustados al nervio medio y entre sí; *involucro* muy tenue en forma de una tela de barniz, que va desprendiéndose á pedazos con los esporangios; *receptáculo* breve apenas estipitado, globoso en el ápice y ligeramente pubescente.

Crece en los declives del monte el Corazón cerca de Miligalli, á 1.800 metros.

Observación: Especie hermosa y muy distinta de las demás. Sinembargo, las condiciones del involucro, dan motivo de sospechar que no pertenezca á este género. Si á pesar de su tenuidad, por la cual se parece más bien á un estrato mucilaginoso, que á una verdadera membrana, se le considera como involucro completo, para lo cual, además de su estructura, milita la circunstancia de mostrarse apiculado en el ápice, se la debería reunir al género *Cyathica*.

Gen. 6. ALSOPHILA R. Br.

Involucrum nullum.

Soros desprovistos de involucro.

Helechos comunmente arboreos ó arborescentes, muy parecidos en la estatura, aspecto y demás caracteres á los de los dos géneros anteriores, de los cuales se distinguen en general por los soros destituídos de involucro. Tocante á la distribución geográfica en el Ecuador, ocupan una zona más ancha que los dos anteriores, pues se extiende desde el nivel del mar, hasta 3.400 metros.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

- I. *Frondes* 1-2-pinadas.
- A. *Pinas* enteras ó crenado-dentadas, lampiñas. I. *A. blechnoides*.
 - B. *Pinas* pinatífidas, (nº 3 pinadas en la base).
 - a. *Pinas* pubescentes; *venas* 10-12 pares 2. *A. pubescens*.
 - b. *Pinas* lampiñas; *venas* 14-15 pares 3. *A. paucifolia*.
- II. *Frondes* tripinatífidas (vid. nº 13 var.); *estípites* espinosos ó muricados.
 - A. *Frondes* herbáceas, lampiñas; *venas* 8-9 pares, casi todas indivisas y fértiles 4. *A. compta*.

- B.** *Frondes* coriáceas ó subcoriáceas; *venas* bifurcadas (vid. n° 12).
- a. *Frondes* lampiñas de ambos lados.
 - a. *Estípites* brevemente muricados, con escamas negras; *pínulas* 12-15^{ct.} largas, 2½-3^{ct.} anchas. 5. *A. menalopus*.
 - b. *Estípites* con aguijones robustos y escamas ferruginosas; *pínulas* 5-7^{ct.} largas. 6. *A. Sprucei*.
 - b. *Frondes* superiormente (salvo las raques y los nervios) lampiñas, inferiormente lanuginoso-pubescentes; *pínulas* sésiles; *estípites y raques* con aguijones degados y largos.
 - a. *Pinas* deltoideo-lanceoladas; *pínulas* 6-8^{ct.} largas, 1-1½^{ct.} anchas; *soros* pequeños, cenicientos. 7. *A. plagiopteris*.
 - b. *Pinas* oblongo-lanceoladas, glaucescentes; *pínulas* 12-15^{ct.} largas, 2-2½^{ct.} anchas; *soros* grandes, anaranjados. 8. *A. Bakeri*.
 - c. *Frondes* subcoriáceas, pubescentes ó vellosas.
 - a. *Pínulas* pecioladas; *segmentos* enteros, oblongos, obtusos. 9. *A. chimborazensis*.
 - b. *Pínulas* sésiles; *segmentos* lineares, crenado-aserrados. 10. *A. coningata*.
 - D. *Frondes* membranáceas, velludas; *pinas* y *pínulas* sésiles.
 - a. *Raques y raquillas* recorridas en los lados por un ala membranácea; *venas* 6-9; *soros* 4-5 de cada lado. 11. *A. Sodiroi*.
 - b. *Raques y raquillas* no aladas.
 - a. *Raques* con escamas lineares, largas, persistentes; *segmentos* denticulados hacia el ápice. 12. *A. pallescens*.
 - b. *Raques* sin ó con escamas muy caedizas; *segmentos* inciso-dentados ó pinatífidos. 13. *A. armata*.
 - III. *Frondes* 4-pinatífidas, coriáceas; *estípites* inermes, densamente lanudos en la base. 14. *A. pruinata*.

I. *A. blechnoides* Bk.; *caudice* depresso; *stipitibus* 35-50^{ct.} longis, nudis, inermibus, nitidis; *frondibus* pinnatis, 1-1,30^{ct.} longis, 30-40^{ct.} latis, coriaceis, utrinque glabris, nitidis; *rachibus* semiteretibus, castaneis, glabris, nitidis, supra planis vel unisulcatis; *pinnis* 6-12-iugis, alternis vel inferioribus oppositis, breviter stipitatis, erecto-patentibus, oblongo-ligulatis, integerrimis, vel apicem versus serratis et in cuspidem linearem, late crenatam abrupte productis, utrinque glabris, intense viridibus, nitidis; *costa* robusta, exerta, castaneo-nitida; *venis* exertis, patentibus, prope basin bifurcatis vel indivisis; *soris* numerosis, in series 1-3 irregulares secus costam utrinque distributis; *receptaculo* pilis longis, ferrugineis, lanuginosis crinito.

Hk. Sp. Fil. I. pag. 35; Hk. & Bk. Syn. pag. 32. Polypodium Parkeri. Hk. & Grev. Ic. Fil. tab. 232.

Tronco breve, deprimido; estípites 35-50^{ct.} largos, erguidos, lampiños, lustrosos, de color castaño-pajizo, cubiertos en la base de escamas filiformes, lanuginosas; frondes oblongo-deltoídeas, 100-1,30^{ct.} largas, 30-40^{ct.} anchas, simplemente pinadas, coriáceas, lustrosas, intensamente verdes en la página superior, pálidas y con brillo metálico en la inferior; pinas 6-12 de cada lado, brevemente estipitadas, alternas ó, las inferiores, opuestas, oblongo-liguladas, puntiagudas ó redondeas en la base, enteras ó remotamente aserradas ó onduladas en el margen, obtusadas en el ápice y prolongadas bruscamente en cúspide linear, afestonada inferiormente; raquis rígida, lampiña, castaño-pajiza, semi-cilíndrica, asurcada interiormente; nervio medio muy prominente en la página inferior, lampiño, castaño-pajizo, lustroso; venas numerosas, prominentes, patentes, aproximadas, paralelas, indivisibles ó bifurcadas desde la base, confluentes en el margen cartilagínico; soros muy numerosos, grandes, dispuestos en 1-3 series irregulares de cada lado del nervio medio y dentro de la mitad interior de las pinas; receptáculo cubierto de pelos lanuginosos, muy densos y largos.

2. *A. pubescens* Bk.; "caudice 2-3 metr. alto, gracili, flexuoso, cicatricibus ovalibus signato; stipitibus 20-35^{ct.} longis, inermibus, obscure stramineis; frondibus oblongis, bipinnatifidis, 100-1,30^{ct.} longis, utrinque leviter pilosis; rachibus supra pilis griseis, patentibus obtectis; pinnis ligulatis, breviter stipitatis, mediis 15-20^{ct.} longis, 3-5^{ct.} latis, usque ad costam anguste alatam in segmenta contigua, integra, obtusa divisis; venis 10-12-iugatis, indistinctis, prope basin furcatis; soris prope costam in bifurcatione sitis".

Bk. Syn., editio II. pag. 32.

Tronco 2-3 metr. alto, delgado, flexuoso, marcado por cicatrices ovales; estípites 20-35^{ct.} largos, oscuro-pajizos, inermes; frondes oblongas, bipinnatifidas, 100-1,30^{ct.} largas, finamente pelosas de ambos lados, no escamosas; raques esparcidas de pelos patentes en la parte superior, sin escamas; pinas liguladas, las centrales 10-15^{ct.} largas, 2½-3^{ct.} anchas, divididas hasta la raquis angostamente alada en segmentos aproximados, enteros, obtusos, 4-5^{ml.} anchos, las inferiores menores, reflejas; consistencia moderadamente firme; venas 10-12 de cada lado, indistintas, profundamente bifurcadas; soros colocados en la bifurcación, aproximados al nervio medio.

No sabemos que estas dos especies hayan sido encontradas todavía en el Ecuador; las citamos sin embargo por ser muy probable que las haya, por hallarse en las regiones vecinas.

3. *A. paucifolia* Bk.; "caudice ad metrum alto, 2-3^{ct.} crasso; stipite 15^{ct.} longo, nigro, ad basin squamis lanceolatis, nigris, margine obscuris obsito; frondibus 60-100^{ct.} longis, coriaceis, oblongis, bipinnatis; rachi nigra, dorso nuda; pinnis sessilibus, centralibus 15-20^{ct.} longis, 2½-3^{ct.} latis, deorsum usque ad rachin divisis; inferioribus diminutis; segmentis ligulatis, falcatis, subacutis, basi adnatis, denticulatis, pagina utraque viridi, nervo supra excepto, glabra; venis utrinque 14-15, distinctis, profunde furcatis; soris paucis, costularibus".

Ex. Bk. Syn. edit., 2^a, pag. 456.

Tronco alto cerca de metro, grueso una pulgada, casi flexuoso; estípites 15^{ct.} largos, negros, cubiertos en la base de escamas lanceoladas, negras, más pálidas en el margen; frondes 60-100^{ct.} largas, oblongas, bipinadas, casi coriáceas, verdes de ambos lados y lampiñas, salvo los nervios en la parte superior; raquis negra, inferiormente desnuda; pinas sésiles, las centrales 15-18^{ct.} largas, 2½-3^{ct.} anchas, divididas hasta la raquis en segmentos ligulados, falcados, denticulados, adherentes en la base; pinas inferiores reducidas; venas 14-15 de cada lado, distintas, profundamente bifurcadas; soros en corto número aproximados al nervio medio.

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Crece en el Ecuador colectado por Spruce; ignórase el lugar determinado.

4. *A. compta* Mart.; stipitibus rachibusque castaneis, crebre et dense muricatis, tomentoque pulverulento conspersis, demum glabris; lamina oblonga, 3-pinnatifida, viridi, herbacea; pinnis breviter petiolatis, basi parum contractis, apice gradatim angustatis; mediis 50-60^{ct.} longis, patentibus; inferioribus diminutis, reflexis; rachillis supra sulcatis, hispidulis, subtus tomentellis; pinnulis sessilibus, lanceolatis, acuminatis, 8-10^{ct.} longis, 2^{ct.} latis, usque ad costam anguste alatam pinnatifidis, segmentis subfalcatis, obtusis, sursum angulato-dentatis; venis utrinque 7-9. in segmentis fertilibus plerisque indivisis et prope medium soriferis; in sterilibus plerumque bifurcatis.

Mart.; Cryptog. Brasil. tab. 44. in Hk. & Bk. Syn. pag. 33.

Estípites robustos, armados, así como la mitad de inferior de las raques, de agujones cortos, muy numerosos y punzantes, cubiertos de escamas breves, lineares, negruzcas, caedizas, y de tomento surfuráceo-pulverulento; *frondes* oblongo-lanceoladas, herbáceas, salvo las raques y los nervios, lampiñas, tripinatifidas; *raques* y *raquillas* pulverulento-tomentosas en el dorso, finalmente lampiñas, superiormente, con los nervios medios de las pinas, fuliginoso-hispida; *pinas* brevemente pecioladas patentes, lanceoladas, acuminadas, algo angostadas en la base, las medias 50-60^{ct.} largas, 15-20^{ct.} anchas, las inferiores menores y recorvadas; *pinnulas* sésiles ó subsésiles, patentes, aproximadas, lanceoladas, 8-10^{ct.} largas, 1½-2^{ct.} anchas, profundamente pinatífidas; las de las pinas inferiores, obtusas, las demás prolongadas en cúspide aserrado-dentada; *segmentos* contiguos, lineares, obtusos; someramente denticulados ó enteros; *venas* 7-9 pares, las de los segmentos fértiles casi todas indivisas y soríferas; las de los estériles con frecuencia bifurcadas; *soros* intermedios entre el nervio y el margen; *receptáculo* hemisférico, setuloso.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales desde 400 hasta 1.200 metros, bastante difusa aunque rara.

5. *A. menalopus* Bak.; *caudice* 2-5 metr. alto, 12-15^{cl.} crasso, superne squamis linearibus, rigidis, nigris cum parte inferiore stipitum, adpresso imbricato; *stipibus* 70-80^{ct.} longis, robustis, deorsum dense squamosis, punctato-muricatis, intense castaneis, exiccatione ebeneis; *limbo* 2½-3 metr. longo, 1,60-180^{ct.} lato, coriaceo, utrinque glabro; *rachibus* rachillisque inermibus, intense castaneis, pulverulento-tomentellis, demum nudis, nitidis, supra hispidulis; *pinnis* pinnulisque breviter petiolatis (cum rachi articulatis) late lanceolatis, 70-90^{ct.} longis; *pinnulis* 12-15^{ct.} longis, 2½-3^{ct.} latis, patentibus, lanceolatis, apice serrato abrupte acuminatis, basi subaequali cum rachi parallela, usque ad costam anguste alatam pinnatifidis; *segmentis* 3-5^{ml.} latis, subfalcatis, obtusis, subintegris; *venis* utrinque 9-11, ascendentibus, summis exceptis, parum supra basin bifurcatis, in bifurcatione plerisque soriferis; *receptaculo* parvo, apice crinito.

Bk. in Hk. & Bk. Syn, pag. 37.

Tronco 2-5 metr. alto, 12-15^{cl.} grueso; cubierto en el ápice, así como la mitad inferior de los estípites, de escamas linear-alesnadas, rígidas, negras, 3-4^{ct.} largas, densamente empizarradas; *estípites* robustos, 70-80^{ct.} largos, brevemente muricados la mitad inferior y cubiertos (además de las escamas ya dichas) por

otras breves surfuráceas, que pasan á la forma de tomento pulverulento en la parte superior en el dorso de las raques y raquillas, finalmente desnudos, intensamente castaños y, después desecos, negros, lustrosos; *limbo* patente, $2\frac{1}{2}$ -3 metr. largo 1,60 - 1,80 ct. ancho, casi coriáceo, intensamente verde, pálido en la página inferior; *raques*, *raquillas* y nervio medio de las pínulas fuliginoso-hispidas en la página superior; *pinas* brevemente pecioladas, 70-90 ct. largas, 20-30 ct. anchas, lanceoladas, acuminadas, algo contraídas en la base, y, así como las pínulas, articuladas con las raques; *pínulas* brevemente pecioladas, patentes, aproximadas, lanceoladas, truncadas en la base, pinatífidas hasta corta distancia del nervio medio, bruscamente acuminadas, inferiormente pulverulento-pubescentes; *segmentos* ligulados, casi falcados, obtusos, casi enteros, 3-5 ml. anchos; *venas* 9-11 pares en cada segmento, ascendentes, bifurcadas á poca distancia de la base, casi todas fértiles.

Crece en el límite superior de la región arbórea en el monte el Corazón á 3.300 metros; colectada también por Spruce en el monte Chimborazo.

6. *A. Sprucei* Bk.; "caudice nul'o, ad rhizoma subglobosum contracto (Spruce); stipitibus metrum et ultra longis, robustis, ad basin aculeatis, squamis, dimorphis, aliis elongatis, densis, setiformibus, aliis latis, lanceolatis; fronde subcoriacea, glabra, metrum et ultra longa: rachibus et costis subtus glabris; pinnis 30-35 ct. longis; pinnulis 5-7 ct. longis, 10-12 ml. latis, oblongo-acuminatis, fere usque ad costam pinnatifidis; segmentis oblongis, falcatis, acutis, integris, margine leviter revoluto; soris numerosis, spatium totum inter nervum et marginem obtentibus".

Ex Baker in Hk. & Bk. Syn. pag. 37.

Tronco reducido á un rizoma subgloso; estípites metro y más largos, armados en la base de agujones robustos y cubiertos de dos clases de escamas, las unas setosas, densas, largas, muy delgadas, las otras, anchas, lanceoladas; fronde casi coriácea, lampiña, metro y más larga; raques y raquillas inferiormente lampiñas; pinas 30-35 ct. largas; pínulas 5-7 ct. largas, 10-12 ml. anchas, oblongo-acuminadas, profundamente pinatífidas; segmentos oblongos, falcados, enteros, ligeramente revueltos en el margen; soros copiosos cubriendo toda la página inferior de los segmentos.

Crece en el monte Chimborazo á 2.500 pies, colectada por Spruce.

7. *A. plagiopteris* Presl.; caudice metrali, (in spe-

cimine unico observato) 10-12^{ct.} diametro crasso; *stipitibus* 50-60^{ct.} longis, rigidis rachibusque longe aculeatis; basin versus squamis cartilagineis linear-lanceolatis, longe productis, albidis, mox caducis vestitis, demum nudis, cum rachibus rachillisque stramineis; *fronde* ovata, sub-deltoides, 1½ metr. longa, 50^{ct.} lata, coriacea, supra, praeter raches costasque hispidulas, glabra, subtus in pinnularum dorso lanuginoso-pubescente; *pinnis* alternis, remotis, petiolatis, deltoideo-lanceolatis, e basi latiore cum rachi parallela, sursum gradatim angustatis, 20-25^{ct.} longis, 12-14^{ct.} latis; *rachillis* muricatis, tomentellis; *pinnulis* sessilibus, lanceolatis, acuminatis, profunde pinnatifidis, vel basin versus pinnatis; *laciniiis* linearibus, subfalcatis, acutis, margine revoluto, subintegro; *venis* utrinque 7-9, immersis; *soris* minutis, cinereo-flavidis, costae approximatis, utrinque 6-9, in tomento gossypino nidulantibus.

Hk. Sp. I. pag. 41. *Hk. & Bk. Syn.* pag. 34. *Bk. Flor. Bras. v. I. part. 2^a.* pag. 330.

Tronco como un metro alto, 10-12^{ct.} en diámetro; *estípites* 50-60^{ct.} largos, medianamente robustos, rígidos, armados de agujones largos, rectos, muy densos en la parte inferior, más raros en la superior y en las raíces y cubiertos al principio de escamas linear-lanceoladas, cartilaginosas, blanquecinas, finalmente lampiños, pajizos; *fronde* ovoidado-deltoides, metro y medio larga, 50^{ct.} ancha, tripinatisida ó casi tripinada; *raíces* erizadas, pulverulento-tomentosas en el dorso, hispidas en la parte superior, finalmente lampiñas, castaño-pajizas; *pinas* distantes, alternas, patentes, pecioladas, deltoideo-lanceoladas, más anchas en la base paralela con la raquis y angostadas larga y gradualmente hacia el ápice; *raquillas* rígidas, muricadas; *pinulas* sésiles, aproximadas, patentes, 7-10^{ct.} largas, 1-1½^{ct.} anchas, lanceoladas, prolongadas gradualmente en cúspide linear, remotamente dentada, coriáceas, lampiñas, salvo el nervio medio en la página superior, algodonoso-pubescentes en la inferior, profundamente pinatifidas ó casi pinadas hacia la base; *segmentos* lineares, falcados, puntiagudos, con el margen revuelto casi entero; *venas* 7-9 de cada lado, inmersas, bifurcadas y soríferas á poca distancia del nervio medio; *soros* pequeños, gris-amarillentos, envueltos en los pelos lanuginosos de la página inferior.

Crece en la orilla del río Guayllabamba, cerca de Quisaya, 1.900 metros.

Observación: En nuestra "Recensio" habíamos citado con duda esta forma bajo el nombre de *A. ferox* Presl.; más por el

conjunto de sus caracteres, debe separarse de esta especie. Se acerca á la *A. villosa* Desv.; pero difiere por los estípites densa y largamente erizados y por la página superior lampiña etc.

8. *A. Bakeri* nov. spec.; *caudice* 3-4 metr. alto, 15^{ct.} crasso; *stipitibus* erecto-patentibus, robustis, aculeatis, stramineis (parte superiore quae sola prostat) glabra; *fronde* deltoideo-lanceolata 2½-3 metr. longa, 1,20-1,40^{ct.} lata, 3-pinnatifida, coriacea; *rachi* acute muricata, intense straminea, subtus glabra, supra hispidula, mature nudata; *pinnis* lanceolatis, e basi parum contracta usque ad quartam partem superiorem aequa latis, mox in apicem acutum abrupte contractis, 60-70^{ct.} longis, 20-24^{ct.} latis; *rachillis* dorso glabris, muriculatis, supra parce fulvo-hispidis; inferioribus subaepue longis, longius stipitatis; *pinnulis* sessilibus, patentibus, subcontiguis, 10-12^{ct.} longis, 2-2½^{ct.} latis, lanceolatis, gradatim in apicem linearem serrulatum productis, usque ad costam anguste alatam pinnatifidis, coriaceis, supra pallide viridibus, praeter costam sparse setuloso-hirtellam, glabris, nitidis, subtus undique longe et molliter pubescentibus, glaucescentibus; *lacinias* linearibus, falcatis, apice obliquo acuto, margine revoluto, serrulato; *venis* immersis, parum conspicuis, utrinque 10-12, plerisque prope costam surcatis, in bifurcatione soriferis; *soris* maiusculis, subcroceis.

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Tronco robusto, 3-4 metr. alto, 15^{ct.} diámetro grueso; estípites metro y más largos, robustos, rígidos, en la mitad superior (que sólo tenemos á la vista) desprovistos de escamas, y, así como las raques, lampiños, pajizos y armados de agujones largos, rectos; fronde deltoídeo-lanceolada, 3-pinnatifida, 2½-3^{ct.} larga, 1,20-1,40^{ct.} ancha; raques robustas, superiormente, con las raquillas parcamente setuloso-hispidas, finalmente desnudas; pinas distantes, patentes, 60-70^{ct.} largas, 20-24^{ct.} anchas, truncadas en la base e igualmente anchas hasta la cuarta parte superior y de allí contraida brevemente en el ápice; las inferiores largamente pecioladas, las superiores sésiles; pínulas sésiles, lanceoladas, angostadas gradualmente en el ápice linear, denticulado, profundamente pinatifidas, de consistencia papirácea, casi coriácea, lampiñas y pálidamente verdes en la página superior, larga y blandamente tomentoso-pubescentes en la inferior; segmentos lineares, falcados, oblicuamente puntiagudos en el ápice, con el margen revuelto y denticulado; venas inmersas, poco distintas, 10-12 de cada lado, profundamente bifurcadas; soros aproximados al nervio medio, grandes, anaranjados.

Crece en el valle de Pallatanga cerca de Sardinas, á 1.040 metros.

Dedicamos esta especie al eminente Botánico *J. G. Baker*, cuyas obras nos han servido de guía en la redacción del presente trabajo.

9. *A. chimborensis* Bak.; “*caudice 3-4 metr. alto, 10^{ct.} crasso, aculeato; stipitibus robustis, 0,85-1,10^{ct.} longis, furturaceo-pubescentibus, sordide brunneis, spinis valde acutis et robustis armatis paleisque elongatis, obscuris, nitidis conspersis; fronde 2½-3 metr. longa, ovato-lanceolata, subcoriacea; rachi digitum crassa, rachillisque aculeatis, furturaceo-pubescentibus; pinnis 50-60^{ct.} longis, 15-30^{ct.} latis; pinnulis remotiusculis, distinete petiolatis, patentibus, 2-3^{ct.} latis, e basi lata oblongis, acuminatis, fere usque ad costam pinnatifidis; laciniis oblongis, obtusis, subfalcatis, integris, margine leviter revoluto; venis conspicuis, prope costam bifurcatis; soris in bifurcatione et secus costam dispositis*”.

Bak. in Hk. & Bk. Syn. pag. 37.

Tronco 3-4metr. alto, del diámetro, de 10^{ct.}, espinoso; estípites muy robustos, 80-100^{ct.} y más largos, furfuráceo-pubescentes, bruno-oscuros, armados de agujones muy punzantes y robustos y cubiertos de escamas largas, negruzcas, lustrosas; fronde 2½-3 metr. larga, aovado-lanceolada, subcoriácea; raquis un dedo y más gruesa, espinosa, así como las raquillas, y furfuráceo-pubescente; pinas 50-60^{ct.} largas, 25-30^{ct.} anchas; pínulas medianamente distantes, distintamente pecioladas, patentés, 2½-3^{ct.} anchas, dilatadas en la base, oblongas acuminadas, pinatifidas hasta cerca de la raquilla; segmentos oblongos, obtusos, casi falcados, enteros, con el margen ligeramente revuelto; venas distintas, bifurcadas cerca de la base; soros situados en la bifurcación y arrimados al nervio medio.

Crece en los bosques del monte Chimborezo de 3.000-4.000 pies, colectada por Spruce.

10. *A. coniugata* Bk.; “*caudice ad 10-11 metr. alto, diametro 28^{ct.} crasso, aculeato, epaleato; stipitibus 80^{ct.} et ultra longis, 2½-2^{ct.} crassis, spinis brevibus, robustis, non adeo acutis, armatis; fronde 2½ metr. Longa, ovato-lanceolata, coriacea; rachibus, rachillis costisque ferruginoso-pubescentibus et pilosis; pinnis 2-3-iugis, supremis exceptis, omnibus exacte oppositis, 60-80^{ct.} longis; pinnulis alternis, prorsus sessilibus, 10-*

12^{ct.} longis, 10-15^{ml.} latis, fere usque ad costam pinnatifidis; segmentis linearibus, e basi ampliata acutis, crenato-serratis; margine leviter revoluto; soris parvis, costae approximatis, in dente quoque solitariis".

Bak. loc. cit.

Tronco (según Spruce) 10-11 metr. alto, 28^{ct.} diámetro grueso, espinoso, sin escamas; *estípites* 80-100^{ct.} largos, 2½-3^{ct.}, grueso, (con escamas oblicuamente aovadas negras, con margen angosto, blanco, caedizas), armados de espinas cortas, cónicas, muy robustas, y [así como las raques] pajizos y esparcidos de pelos patentes, sentados sobre un tubérculo punctiforme persistente; *fronde* oval-ú oblongo-lanceolada, 2½-3 metr. larga, coriácea tripinatífida; *raques* y *raquillas* y página inferior de las pínulas rubiginoso-pelosas, finalmente las raques lampiñas; *pinas* todas, (salvo las supremas) opuestas, sésiles, ó lanceoladas 60-80^{ct.} largas, 25-30^{ct.} anchas, angostadas gradualmente hacia el ápice, las inferiores menores y recorvadas hacia atrás; *pínulas* sésiles, alternas ó con frecuencia opuestas, lanceoladas, prolongadas gradualmente en cúspide aserrada, esparcidas, al principio á lo largo del nervio medio de la página inferior de escamas blancas, vesiculosas, mezcladas con otras planas, todas prontamente caedizas, divididas hasta cerca del nervio medio, en segmentos lineares, algo enanchados en la base, falcados, puntiagudos, crenado-dentados y algo revueltos en el margen; *venas* 9-12 pares, una-tres veces bifurcadas, soros medianos, uno en la base de cada diente.

ÁREA HISTÓRICA

Colectada por Spruce en el Chimborazo, crece además en los bosques de toda la cordillera occidental y en los de la oriental entre Cuyújua y Baeza.

Especie muy afine á la siguiente, de la cual se distingue principalmente por la oposición de las pinas, la consistencia casi coriácea y la superficie superior de las pínulas desnuda, las escamas casi coriáceas y los pelos más gruesos que cubren la página inferior de los mismos. Nuestros ejemplares presentan algunos caracteres que no se mencionan en la descripción del Sr. Baker, sin embargo no dudamos que se refieren á la misma especie.

II. A. *Sodiroi* Bak.; *caudice* arboreo, 2-3 metr. alto; *stipitibus* gracilibus, 60-70^{ct.} longis, aculeis remotis, robustis armatis, cum rachibus ala angusta, membranacea marginatis et tomentoso-pubescentibus, antice strigilosis; *lamina* herbaceo-membranacea, 1,80-2 metr. longa, 69-80^{ct.} lata, tripinnatifida; *rachi* rachillisque dorso pubescentibus; *pinnis* suboppositis, sessilibus, patulis, 30-40^{ct.} longis, flaccidis, apice pendulis, infimis minoribus

reflexis; *pinnulis* sessilibus, ala secus raches decurrente connexis, ligulatis apice obtusis aut acuminatis, supra, praeter costam hispidam, glabris, subtus ad costam parce squamułosis, ad venas pilosis; usque ad costam anguste alatam in segmenta linear-ligulata, apicem versus dentata divisus; *venis* utrinque 6-7, in segmentis sterilibus bifurcatis, in fertilibus plerisque indivisis; *soris* parvis, costae approximatis, utrinque 4-5; *receptaculo* minuto, hispido.

Baker, "A. Summary of. the. new. Ferns. &." pag.
9. *A. alata* Sodiro, "Recensio" pag. 19.

Tronco arbóreo, grácil, $2\frac{1}{2}$ -3 metr. alto; estípites 60-70^{ct.} largos, delgados, pubescente-ó tomentoso híspidos, con pelos cortos, arrimados y dirigidos hacia atrás, sin esamas ó muy caedizas, recorridos en los lados, así como las raques, por un ala membranácea y provistos de agujones distantes, largos y robustos; frondes herbáceo-menbranáceas, oblongas, 1,80-2 metr. largas, 70-80^{ct.} anchas, tripinatífidas; raques y raquillas pubescentes en el dorso y tomentoso híspidas en el lado superior; pinas sésiles, casi opuestas, patentes, lanceoladas, largamente acuminadas en el ápice, 30-40^{ct.} largas, endebles y péndulas, en el ápice; las inferiores menores, reflejas; pinulas sésiles, unidas con el ala de las raquillas, herbáceas, superiormente, salvo el nervio medio híspido, lampiñas, inferiormente esparcidas de escamas grandes, papiráceas, prontamente caedizas, y de otras cerdosas en los nervios, 5-7^{ct.} largas, 1-1½^{ct.} auchas, obtusas en el ápice y divididas casi hasta la raquilla en segmentos linear-ligulados, obtusos y denticulados; venas 6-7 de cada lado, bifurcadas hacia la mitad de los segmentos, las de los fértiles con frecuencia indivisas; soros 4-5 pares, pequeños, compuestos de pocos esporangios, caedizos; receptáculo pequeño, híspido

Cree en los bosques del volcán Cotacachi y de los Colorados 300-1.900 metros.

12. *A. pallescens* Sod.; stipitibus circiter 70^{ct.} longis, $2\frac{1}{2}$ ^{ct.} crassis, muricatis, squamis cartilagineis, lanceolatis, in cuspidem filiformem, tortilem longe productis et tomento furfuraceo vestitis; lamina 2-2½ metr. longa, 80-100^{ct.} lata, tenuiter membranacea, (supra viridi et adpresso, subtus pallida, molliter densiusque pubescente, tripinnatifida; rachi rachillisque supra retrorsum setuloso-hispida, squamisque albidis, anguste linearibus persistentibus conspersa, subtus pilis, setosis patentibus hirta et parce muricata, setarumque basibus persistentibus scabra; pinnis sessilibus aut subsessilibus,

patentibus, 45-50^{ct.} longis, 18-20^{ct.} latis, basi modice contractis, squamisque cartilagineis, albis, latis, stipatis, apice acuminatis; *pinnulis* sessilibus, basi truncata saepe rachi adhaerentibus, lanceolatis apice acuminatis, profunde pinnatifidis; *laciinis* late linearibus, obtusis, leviter serrulatis, secus costam squamulosis; *venis* utrinque 10-12, tenuibus, plerisque furcatis; *soris* mediocribus, utrinque 5-8, costae magis quam margini approximatis, primum pallide virentibus, demum sordide flavidis; *receptaculo* parvo, convexo, setuloso-hispido.

Sodiro, "Recensio" pag. 20., Bk. loc. cit. pag. 9.

Tronco 2-3 metr. alto; *estípites* 60-70^{ct.} largos, 2-2½^{ct.} gruesos, esparcidos, así como las raques, de pelos setosos, patentes, agujones gráciles y escamas lineares, angostas, persistentes; *fronde* membranácea, 3-pinatífida, 2-2½ metr. larga, 80-90^{ct.} ancha, raques, raquillas y nervio medio de las pinas cubiertos en la página superior de pelos ferruginosos, setosos dirigidos hacia atrás y de pelos setosos, patentes en el dorso; *pinas* sésiles ó casi sésiles, patentes, lanceoladas, algo contraídas en la base y rodeadas de escamas blancas, papiráceas, aovadas ó lanceoladas, largamente cuspidadas; *pinulas* sésiles, lanceoladas, profundamente pinatífidas, brevemente acuminadas, cubiertas de ambos lados de pelos rojizos, aplicados á la superficie; *segmentos* anchamente lineares, falcados, obtusos, con el margen angosto, revuelto, finamente aserrado; *venas* finas, 10-12 de cada lado, las más bifurcadas; *soros* medianos, 5-8 de cada lado, más aproximados al nervio que al margen, al principio pálidamente verduzcos, finalmente amarillo-rojizos; *receptáculo* pequeño, convejo, setuloso-hispido.

Crece en los bosques de Nanegal: rara.

Continuará.