

NUEVA EPOCA

Serie XIV

Octubre de 1898

Núm. 96

AVALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO

DE LA


FLORA ECUATORIANA

POR EL R. P. J. SODIRO S. J.

PIPERACEAS ECUATORIANAS

G. 2. PEPPEROMIA. R. & P.

(Continuación: v. supr. p. 1.102)



32. *P. Grisari c. DC.* *foliis longiuscule petiolatis, cordato-ovatis, apice breviter acuminatis, supra glabris, subtus ad nervos nervulosque dense puberulis, 9-nerviis; petiolis glabris; amentis terminalibus axillaribusque, filiformibus, densifloris, cum pedunculis longiusculis, glabris, folia subaequantibus; bractea orbiculari, ovario turbinato, apice rotundato, sub-oblique stigmatifero; stigma-te glabro papillosulo.*

c. DC. *Piper. Sodir. loc. cit. p. 516.*

Planta prostrada y arraigante en la base; tallos erguidos, lampíños apenas 2 mm. gruesos cuando secos; hojas alternas petioladas; petiolos casi 5 cm. largos, lampíños; limbos 5-6 cm. largos y anchos, acorazonado-aovados, brevemente acuminados en el ápice, membranáceos, casi perdeidos y obscuramente pelá-

cido-punteados, 9-nervios, lampiños en el haz, pubérulos inferiormente en los nervios y en las venas; *amentos* terminales y axilares, solitarios, densifloros, con los pedúnculos [\pm 2 cm. largos, lampiños]. casi iguales á los limbos; *bráctea* orbicular; *ovario* turbinado, obtuso en el ápice, \pm oblicuamente estigmatífero; *estigma* lampiño, papiloso [Ex. C. DC. loc. cit.]

Crece en el Ecuador ó en el Perú, colectada por GRISAR.

32.* *P. involucrata* Sp. nov. *caule* è basi radicante ascendente, crasso, carnoso, cum ramis, petiolis pedunculisque fusce tomentello; *foliis* alternis, petiolatis; *petiolis* supra obiter 1-sulcatis; *limbis* rhombeo-ovatis, basi apice que obtusis, margine undulatis; \pm rugosis, supra opace viridibus glabris, subtus albo-nitentibus, punctisque nigris magnis conspersis, in nervis, venisque pilosis, tripli-nerviis; *pedunculis* opositifoliis petiolum subæquantibus, apicem limbum ovalem cordatum gerentibus; *pedicellis* basi limbi insertis 4-6 umbellatis, asynchronis, spathellis totidem cartilagineis lanceolatis stipatis; *amentis* (fructiferis) 8-10 cm. longis, 3 mm. crassis, sursum attenuatis sublaxifloris; *rachi* glabra, purpurea; *bracteis* orbicularibus, centro peltatis, rubro-punctatis; *ovario* semiimmerso subsphaerico, in stylum brevem contracto; *stigmate* terminali puberulo.

Tallo robusto, ascendente ó erguido, inferiormente radicante, carnoso y, así como los ramos, pecíolos y pedúnculos, finamente tomentoso; *hojas* alternas pecioladas; *pecíolos* 3-5 cm. largos, ancha y someramente 1-suicados en el lado interior; *limbos* rómbico-aovalados, obtusos en la base y algo menos en el ápice, undulados y encrespados en el margen, rugosos y lampiños en el haz, intensamente verdes, pálidos y brillosos esparcidos de puntos grandes negros y pubescentes en los nervios en el envés, 3-pli-nervios; *nervio* central con 1-2 laterales algo más gruesos en la $\frac{1}{3}$ parte inferior; *pedúnculos* opositifolios \pm á los pecíolos, con un limbo sesil, ovalado, acorazonado en la base; *pedicelos* 4-6 umbelados en el ápice del pedúnculo, desarrollados sucesivamente, acompañados por espárrillas cartilagíneas lanceoladas, negro-punteadas; *amentos* (fructíferos) 8-10 cm. largos 3 mm.-gruesos, adelgazados hacia el ápice, sublaxifloros; *raquis* purpúrea, esparcida de puntos glanduliformes; *brácteas* orbiculares, peltadas en el centro brevemente estipitadas, verduzcas, purpurascientes en el margen y esparcidas de puntos rojos; *ovario* se-

miimmerso, esferoidal, prolongado en el ápice en el estilo breve con estigma terminal, brevemente pubescente, (D. S. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales del m. *Pichincha* hacia *Gualea*.

Especie de aspecto análogo á la *P. crispa* y á la *P. phyllostachya*. De la 1^a se distingue por el número y posición de los amentos, de la 2^a en parte por el número de los mismos y por la nervación de las hojas, etc.

33. *P. melanostigma* Miq. *foliis breviter petiolatis, oblongo-vel subrhombo-lanceolatis, utrinque glabris et nigro-punctulatis, membranaceo-rigidis, haud nervulosis, obscure quintuplinervis, lateralibus nervis fere a basi solutis; amentis axillaribus terminalibusque, folia multoties superantibus, sublaxifloris, filiformibus; pedunculo glabro petiolum aequante vel superante, bractea obovata, nigro-punctulata, centro peltata subsessili; ovario subimpresso, apice acutiusculo; bacca ovato-acuta, rostellata.*

Miq. Syst. Pip. p. 90; C. DC. Prodr. loc. cit. p. 408.

Tallo endeble, ramoso sarmentoso, rastreiro; *ramos* espaciados radicantes, aparentemente lampiños, bajo el lente, así como los pecíolos, muy finamente pubérulos; *pecíolos* breves [3-5 mm. largos]; *limbos* 2½-4 cm. largos, 1½ cm. anchos, lanceolados, brevemente angostados hacia la base, larga y gradualmente hacia el ápice acumulado y puntiagudo, membranáceos, lampiños de ambos lados, [los tiernos muy finamente pubérulos hacia el ápice,] pelúcido-punteados; *nervio central* escurrido hasta el ápice con dos nervios laterales, erecto-ascendentes de cada lado, el uno á poca distancia de la base, el otro cerca de la mitad, todos poco aparentes y terminados dentro del margen; *amentos* axilares y terminales filiformes, al principio densífolios y poco más largos que las hojas, finalmente hasta 20 cm. largos, péndulos y laxifloros; *pedúnculo* ± tan largo como el pecíolo; *bráctea* suborbicular-elíptica ó trasovada, peltada en el centro, subsésil glandulosa; *baya* ovoidea brevemente apicalada y muriculada.

Crece en los bosques subandinos occidentales del m. *Pichincha* en el valle de *Lloa*. No tenemos de esta especie sino muestras muy incompletas; la descripción se la completó sobre las de DC. y de Miguel.

33.* *P. bicolor* sp. nov, stolonifera, *caule* basi ascendente, radicante, erecto petiolisque crispe breviterque

tomentoso; *foliis* alternis petiolatis; *petiolo* dorso convexo supra sulcato; *limbis* inferioribus obovatis, superioribus rhomboideis, utrinque acuminatis, dense membranaceis, glabris, margine ciliolatis pellucido-punctatis supra obscure viridibus, subtus purpurascentibus, 3-plinerviis; *nervo medio* ad $\frac{1}{3}$ inferiorem nervos II utrinque 3 emitente, duobus supremis ad apicem usque ductis; *pedunculis* axillaribus et terminalibus; *amentis* (in specimine nondum evoluto) brevibus gracilibus; *bracteis* orbiculatis, centro glandulosis, margine cartilagineo cinctis. (reliqua ignota.)

Planta largamente estolonífera; *tallo* ascendente radicante en la base, erguido, ramoso, con entrenudos 2½-4 cm. largos, 4-5 mm. gruesos, verde-purpurascentes, rollizos los superiores recorridos por 2 líneas longitudinales salientes originadas de los lados escurridos de los pecíolos, así como los pecíolos y los ramos, cubierto de pelos blandos, breves, encrespados, muy densos; *hojas* alternas, pecioladas; *pecíolos* 3-5 cm. largos, cilíndricos en el dorso, interiormente acanalados; *limbos* inferiores ± anchamente trasovados, los superiores romboidales, angostados uniformemente desde la mitad en ambas direcciones, algo acuminados en el ápice, densamente membranáceos, lisos, salvo el margen tenueamente apestañado en la mitad superior, lampiños de ambos lados, densa y finamente pelúcido punteados, de color intensamente verde en la página superior, purpurascentes en la inferior, tripli-nervios; *nervio medio* dividido casi hasta la mitad en 3 II de cada lado, los dos superiores extendidos hasta el ápice del limbo; *pedúnculos* axilares y terminales (todavía muy tiernos) más cortos que los pecíolos; *amentos* (no aún florecidos) 1½-2 cm. largos, 2 mm. gruesos, densifloros; *brácteas* orbiculares, peltadas en el centro, densamente glanduloso punteado, con puntos rojizos y rodeados de margen tenuemente cartilagíneo. (Lo demás desconocido.)

Crece en los bosques tropicales de *Guatema*.

Colocamos con duda esta especie en este lugar á motivo de la inflorescencia todavía rudimentaria.

33.** *P. euphidigera* sp. nov. *caule* e basi radicante ascendente glabro; *foliis* alternis, breviter petiolatis glabris; *limbis* rhombeo-lanceolatis, basi acutis apice longe angustatis, membranaceis, primum subtus pilis punctiformibus conspersis, demum glaberrimis, margine apicem

versus brevissime ciliatis, minutissime pellucido-punctatis, subtus punctis nigrescentibus tenuissime conspersis; quintuplinerviis; nervis II utrinque duobus erecto patentibus vix exertis; pedunculis axillaribus terminalibusque, petiolos parum superantibus; amentis cylindricis tenuibus, folia aequantibus v. superantibus annulatim densifloris; bractea orbiculata centro peltata; ovario semiimmerso, apice protracto, oblique stigmatifero.

Tallo rastrero en la base ascendente, medianamente robusto, lampiño ó finamente pubescente y finalmente alampiñado; hojas alternas pecioladas; petiolos 4-8 mm. largos, marginados lampiños, 8-12 cm. largos, 3-4 cm. anchos; limbos rómbeo-oblongos ó rómbeo-lanceolados, cuspídos en el ápice, ± pungiaguados en la base, ± inequiláteros, jugoso-membranáceos, papiráceos cuando secos, brevemente pubérulos cuando tiernos en la página inferior, finalmente (salvo el margen brevemente apestañado en la mitad superior) muy lampiños, pelúcido-punteados y esparcidos de puntos pulverulentos negruzcos en la página inferior; nervio medio extendido hasta el ápice del limbo, prominente inferiormente, con 2 nervios II de cada lado, libres á poca distancia de la base, y otros más finos superiormente, todos inmersos y resueltos en retículo fino; pedunculos axilares y terminales poco más largos que los petiolos; amentos tenues cilíndricos, densifloros, iguales o más largos que las hojas; bráctea orbicular peltada, brevemente estipitada; ovario brevemente inmerso rómbeo-aovado asimétrico, angostado en el ápice con el estigma apical adelantero y oblicuo. [N. S. m. v.]

Crece en el valle de Nanegal (1.901)

34. *P. nigro-punctata* Miq. *foliis petiolatis, elliptico-lanceolatis, apice suboblique acuminatis, acumine acuto, basi subinaequali acutiusculis, utrinque glabris, crebre nigro-punctulatis, membranaceis, pellucidis, haud nervulosis, quintuplinervis; centrati nervo paullo supra basin nervos suboppositos utrinque 2 mittente nervuloque juxta marginem currente, petiolo glabro nigro-punctulato; amentis axillaribus solitariis, filiformibus, subdensifloris, maturis folia triplo-quadruplo-superantibus, pedunculo petiolum fere aequante, nigro-punctulato; rhachi nigro-punctulata; bractea rotundata, nigro-punctulata, centro-peltata; ovario semiimmerso, ovato apice acuto, nigro-punctulato; stigmate apicali, carnosulo puberulo.*

Miq. Syst. Piper. p. 188; et c. DC. Prodr. loc. cit.
p. 409.

Tallo radicante en la base ascendente, erguido 20-30 cm. alto, como todo lo demás de la planta, lampiño y densamente esparcido de glándulas puntiformes negras; *hojas* alternas pecioladas; *pecíolos* 5-10 mm. largos; *limbos* densamente membranáceos, 3-5 cm. largos, 2-3 cm. anchos, aovado-elípticos, puntiagudos en la base y escurridos en el pecíolo, brevemente acuminados y puntiagudos en el ápice, densamente negro-punteados en ambas páginas, 5-plinervios; *nervio central* escurrido en el ápice, los dos laterales inferiores hasta cerca de la mitad, los dos superiores desvanecidos poco debajo del ápice, retículo apenas perceptible; *amentos* axilares y terminales, filiformes, erguidos ó péndulos, mucho más largos que las hojas, subdensifloros, lampiños; *raquis* y *brácteas* negro-punteadas, *bráctea* suborbicular, peltada; *ovario* semiimmerso, aovado puntiagudo y glanduloso; *estigma* apical suboblicuo, pubérulo.

Crece con la especie anterior.

34.* *P. peduncularis* sp. nov. *caule* e *basi prostrata* erecto, 5-angulato, sub glabro; *foliis alternis*, *petiolatis*, rhombo-ellipticis apice breviter acuminato, obtuso, deorsum longius cuneatim-angustatis, glabris, apicem versus ciliolatis, pellucido-punctatis, tenuiter 7-plinerviis et reticulato-venosis, nervuloque tenui apicem versus marginem ambiente; *pedunculis* axillaribus terminalibus que erectis, rigidis glabris, folia subaequantibus vel superantibus; *amentis* cylindricis, tenuibus, erectis, rigidis, pedunculós plerūmque superantibus; *bractea* discoidea, centro peltata; *bacca* immersa, globuloso-conica verruculosa, in stigma apicale producta.

Planta estolonífera rastrera; *tallo* finalmente erguido, pentágono casi lampiño, 3-4 dm. alto; *hojas* alternas, pecioladas; *pectíolos* 3-5 mm. largos, marginados; *limbos* rómbeo-elípticos, 3-4 cm. largos, 1½-2½ cm. largos, acuñados en la base, obtusos en el ápice, densamente membranáceos, lampiños, apestañados en la mitad superior, esparcidos de puntos grandes glánduliformes pelúcidos, tenuemente 7-plinervios y reticulado-venulosos; *nervios* inmersos en la página superior, el central terminado en el ápice, los laterales desvanecidos en el retículo dentro del margen y con un nervillo periférico en la mitad superior; *pedúnculos* axilares solitarios ó axilares y terminales, ténues erguidos, rígidos, lampiños, 2½-4 cm. largos; *amentos* cilíndricos, ténues, rígidos,

densifloros, 3-7 cm. largos; *bráctea* discoídea, peltada en el centro; *baya* inmersa globuliforme-conica, muriculada, terminada en el estigma apical, algo oblicuo (D. s. muestras vivas)

Afine á la *P. angularis* C. DC. de la cual se distingue por el tallo estolonífero, pentágono esparcido de pelos breves adpresos, por la forma de los limbos, por los pedúnculos tan largos ó más largos que las hojas, por los amentos axilares y terminales etc.

Crece en las pendientes occidentales del *Pichincha* á 1.300-1.500 m.

35. *P. dendrophila* Schlecht. *foliis petiolatis elliptico-oblongo-ovatis vel obovato-subrhomboides, basi cuneato-attenuatis, apice paullo protractis, obtusiusculis, utrinque glabris, membranaceo-subpellucidis, quintupli-septupli-nerviis, parce reticulato-nervulosis; nervis omnibus fere e basi solutis, nervulo interrupto juxta marginem currente; amentis axillaribus terminalibusve, longe pedunculatis, filiformibus densifloris, folia multoties superantibus; bractea rotundata, apice acuta, centro peltata; ovario subimmerso; stigmate minuto; bacca ovato-acuta, semiimmersa, apice breviter mucronulata.*

Schlecht, in Linn. v. 5 p. 74 C. DC. Prodr. loc. cit. p. 409.

Tallo prostrado, estolonífero y radicante en la base, finalmente ascendente ó erguido, 20-30 cm. alto; *hojas* alternas, pecioladas; *pecíolos* 5-10 mm. largos, lampiños, marginados; *limbos* 3-5 cm. largos, 2-2½ cm. anchos, elíptico-rómbicos ó elíptico-lanceolados, puntiagudos, ligeramente escurridos en el pecíolo y angostados gradualmente desde la mitad hacia el ápice ligeramente obtuso, membranáceos, lampiños ó finamente pubescentes en el margen superior y apestañados hacia el ápice cuando tiernos, 5-7-plinervios, finamente reticulados y pelúcido-punteados; *amentos* terminales ó axilares, delgados, erguidos, 7-10 cm. largos, sostenidos por pedúnculos 1½-3 cm. largos, ± densifloros; *bráctea* suborbicular, membranácea, peltada, glandulosa; *ovario* impreso; *baya* semisaliente, muriculada, brevemente cónico-mucronada en el ápice.

Crece en los bosques subandinos del *M. Corazón*, en *Canzacoto* á 2.000 metros.

36. *P. syringaeifolia*. C. DC. *foliis longe petiolatis ovatis, basi rotundato-subcordatis, apice breviter acuminatis,*

utrinque glabris, 11-plinerviis; *nervo centrali* fere ad $\frac{1}{4}$ longitudinis suaे nervos utrinque 2 oppositos mittente; *amentis* in apice ramuli aphylli geminatis, (in specimine adhuc juvenili) brevissime pedunculatis, filiformibus et densifloris; *bractea* rotundato-elliptica, centro pedicellata; *ovario* emerso, apice oblique complanato et acuminato, sub apice stigma minutum gerente.

c. DC. *Piper. Sodir. loc. cit. p. 515.*

Tallo ascendente ó prostrado, radicante, lampiño; *hojas* alternas, pecioladas; *peciolos* 6-9-cm. largos, membranáceos, marginados, algo enanchados en la base, casi lampiños; *limbos* sub-orbicular-aovados, ligeramente acorazonados ó redondeados en la base, 5-10 cm. largos, 4-7 cm. anchos, densamente membranáceos, opacos, oscuramente pelúcido-punteados cuando tiernos, lampiños de ambos lados, fina y densamente pubescentes en el margen, verde-blanquecinos en el envés, 9-11-plinervios; *nervios* algo prominentes en la cara inferior; *amentos* geminados en el ápice de un ramito terminal, el uno opositifolio el otro en la axila de una hoja escamiforme, linear, 8 cm. largos, 1 mm. gruesos (siendo todavía tiernos) *densifloros*; *pedúnculo* 15, pedicelos apenes, 5 mm. largos; *flores* dispuestas anularmente al rededor de la raquis; *bráctea* aovado-orbicular, peltada, sésil, bajo el lente, glandulosa; *ovario* algo salido, acuminado y oblicuamente *complanado*.

Crece en los bosques subtropicales de Sto. Domingo y de Gualca.

ÁREA HISTÓRICA

37. *P. inconspecta* C. DC. *foliis* longe petiolatis ovatis, basi haud profunde cordatis, apice sat longe acuminatis, utrinque glabris, 7-plinerviis; *nervo centrali* fere ex $\frac{1}{3}$ longitudinis suaे nervum utrinque unum adscendentem lateralibusque venas multas mittentibus; *amentis* oppositifoliis, pedunculatis, foliorum límbos superantibus, *densifloris* filiformibus; *bractea* orbiculari; *ovario* emerso obovato, infra apicem inconspectu stigmatifero.

c. DC. *Piperac. Sodir. loc. cit. p. 515.*

Tallo herbáceo erguido, radicante inferiormente, 2-3 dm. alto, superiormente ramoso; *hojas* alternas pecioladas, tiernamente herbáceas, lampiñas; *peciolos* 3-7 cm. largos; *limbos* aovados acorazonados ó, los superiores, obtusos en la base, largamente acuminados en el ápice, lampiños de ambos lados ó con pelos,

raros y fibrosos en el haz y en los nervios del envés, 4-8 cm. largos, 3-6 cm. anchos tenuemente membranáceos, secos casi pelúcidos y muy finamente pelúcido-punteados, con los nervios principales alados hacia la base, 7-plinervios y venuloso-reticulados; *amentos opositifolios*, más largos que las hojas correspondientes, (hasta 15 cm. largos), secos 1½ mm. gruesos, erguidos, densifloros, sostenidos por pedúnculos algo más cortos que los pecíolos; *bráctea* orbicular, negra con la desecación; *ovario* salido, trasulado; *estigma* infra-apical, poco sensible.

Crece en los bosques occidentales del *M. Corazón*, 2.400 metros y en la cordillera del *Pichincha*, camino de *Gualca*, entre *Alaspungo* y *Pacay*.

38. *P. pteroneura* c. DC. *foliis* modice petiolatis, rotundato-ovatis, basi leviter retusis, apice subacuminatis obtusisque, utrinque glabris, 7-pli-nerviis; *petiolo* margine et nervo centrali subtus membranaceo-alatis; *amentis* terminalibus densifloris, breviter pedunculatis, foliorum limbos subaequantibus; *pedunculo* quam petiolus multo breviore; *bráctea* orbiculari, centro subsessili, filamentis sat longis, antheris ellipticis; *ovario* emerso, basi attenuato, superne oblique complanato et sub apice obtuso stigmatifero; *stigmate* papilloso.

c. DC. loc. cit.

Planta blandamente herbácea en todas sus partes pelúcida y lampiña, 20-25 cm. alta, tallo radicante inferiormente y (así como los ramos) cuadri-alado, erguido y ramoso á poca distancia (8-10 cm.) de la base; ramos patentes, reiteradamente dicótomas; hojas alternas, brevemente pecioladas; pecíolos de las hojas inferiores 1½ cm. largos, anchamente alados, los de las superiores nulos; limbos suborbicular, aovados, ligeramente acorazonados en la base, subdeltaoides y obtusos en el ápice, tenuemente membranáceos y casi pelúcido cuando secos, lampiños de ambos lados, 4-6 cm. largos, 3½-5½ cm. anchos, 7-9-plinervios (con 3-4 nervios laterales de cada lado, libres desde la base, y 1 de cada lado hacia la ¾ parte del central) finamente reticulados; nervios principales membranáceo-alados hacia la base en la página inferior; amentos terminales densifloros, 5-6 cm. largos, 1½-2 mm. gruesos, sostenidos por pedúnculos 6-8 mm. largos; bráctea orbicular, peltada en el centro, sésil; ovario prominente, adelgazado en la base, aovado, obtuso en el ápice; estigma infra-apical oblicuo, papiloso.

Crece en los lugares húmedos en la orilla del R. Pilatón cerca de la hacienda S. Nicolás, 800-900 metros.

39. *P. angularis* c. DC. *foliis alternis petiolatis, elliptico-lanceolatis, apice breviter acuminatis, obtusiusculis, basi subattenuatis, infimis e basi cuneata obovatis vel rotundis, utrinque glabris, membranaceis, subopacis non reticulato-nervulosis; 5-nerviis, centrali nervo ad apicem usque, lateralibus tenuibus supra medium ductis, exterioribus subtilissimis; petiolo glabro; amentis axillaribus, solitariis, filiformibus, densifloris; pedunculo glabro petiolum multum superante; bractea rotundata, centro peltata; ovario impresso; stigmate minuto.*

c. DC. *Prodr. XVI*, 1 p. 415.

Tallo erguido, 20 cm. alto, radicante en la base, trígono, lamiño; hojas alternas, pecioladas; peciolo lamiño; limbos elíptico-lanceolados, brevemente acuminados en el ápice, algo angostados y los inferiores acuñados en la base, trasovados ó casi redondos, todos membranáceos, lamiños de ambos lados, casi opacos, 4½ cm. largos, 2½ cm. anchos, no reticulados, 5-nervios; nervio central terminado en el ápice, los secundarios sobre la mitad, los exteriores muy finos; amentos axilares, solitarios, filiformes densifloros, sostenidos por pedúnculos 2½ cm. largos; bráctea suborbicular, peltada en el centro; ovario impresso; estigma pequeño.

Crece en el M. Pichincha, colectada por JAMESON.

39.* *P. peduncularis* Asplenioidea *caule e basi prostrata erecto, angulato, glabro; foliis alternis, petiolatis, rhombo-lanceolatis apice obtusiusculis, deorsum longius cuneatim-angustatis, glabris, apicem versus ciliolatis, pellucido-punctatis, tenuiter 7-plinerviis et reticulato venosis, nervuloque tenui apicem versus marginem ambiente; pedunculis axillaribus terminalibusque, erectis simplicibus vel bifurcatis rigidis, glabris, folia subæquantibus vel superantibus; amentis cylindricis, tenuibus, erectis, rigidis, pedunculos plerumque superantibus; bractea discoidea, centro peltata; baccaimmersa, globuloso-conica verruculosa, in stigma apicale producta.*

Planta estolonífera rastrera, tallo finalmente erguido, anguloso, lamiño, 3-4 dm. alto; hojas alternas, pecioladas; peciolas

3-5 mm. largos, marginados; *limbos* rómbeo-lanceolados, 3-4 cm. largos, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ cm. anchos, acuñados en la base, obtusos en el ápice, densamente membranáceos, lampiños, apestañados en la mitad superior, esparcidos de puntos grandes glanduliformes pelúcidos, tenuemente 7-plinervios y reticulado-venulosos; *nervios* inmersos en la página superior, el central terminado en el ápice, los 2 laterales interiores desvanecidos en el retículo dentro del margen también cerca del ápice y con un nervillo periférico en la mitad superior; *pedúnculos* axilares, solitarios ó axilares y terminales, simples ó bifurcados, tenues, erguidos, rígidos, lampiños, $2\frac{1}{2}$ -4 cm. largos; *amentos* cilíndricos, ténues, rígidos, densifloros, 3-7 cm. largos; *bráctea* discoídea, peltada en el centro; *baya* inmersa, globuliforme-cónica, muriculada, terminada en el estigma apical, algo oblicuo.

Afín á la *P. angularis* C. DC. de la cual se distingue por los *limbos* 5-7-plinervios, los pedicellos axilares y terminales, simples ó bifurcados etc.

Crece en las pendientes occidentales del *Pichincha* 1.300-1.500 metros-Rara.

40. *P. nemorosa* C. DC. *foliis petiolatis*, ovato-ellipticis subinaequilateris, apice acuminatis, acumine acuto obtusiusculove, basi acutiusculis, aequaliter in petiolum decurrentibus, utrinque glabris, membranaceis, subpellucidis, pellucido-punctatis, sparse nigro-punctulatis, reticulato-nervulosis, 5-nerviis, nervuloque juxta marginem currente; *amentis* axillaribus solitariis, folia fere duplo superantibus; *bractea* rotundata, centro peltata, subsessili; *bacca* semiimmersa ovato-acuta.

c. DC. *Prodr. loc. cit.*

Tallo erguido, tetrágono, lampiño; *pecíolos* 5-10 mm. largos, membranáceo-marginados lampiños; *limbos* 4- $6\frac{1}{2}$ cm. largos, $3\frac{1}{2}$ -4 cm. anchos, aovado-elípticos, ± inequiláteros, angostados y escurridos en el pecíolo, acuminados en el ápice, con la punta aguda ó obtusa, membranáceos, lampiños de ambos lados, casi pelúcidos y pelúcido-punteados, esparcidos de glándulas puntiformes negras, reticulado-venosos, 5-nervios y con un nervillo marginal; *amentos* solitarios, axilares en las hojas superiores, filiformes, 8-10 cm. largos; *bráctea* suborbicular subsésil, peltada en el centro; *baya* semiimmersa aovada-puntiaguda.

Crece en los bosques subtropicales de la parroquia de *Santo Domingo*.

41. *P. Guadalupensis* c. DC. *foliis* breviter petiolatis, inferioribus cuneato-obovatis, superioribus obovato-ellipticis, apice obtusiusculis subattenuatis, basi subcuneato-acutis, utrinque glabris, rigidulis, subpellucidis, pellucido-punctulatis, sparse reticulato-nervulosis et 3-nerviis vel raro 7-nerviis; *centrali* nervo ad apicem usque ducto, lateralibus alte ductis, exterioribus saepe obsoletis, nervulo juxta marginem currente; *petiolo* glabro; *amentis* terminalibus, filiformibus, densifloris, folia superantibus; *rhachi* puberula; *bractea* rotundata, centro peltata subsessili; *ovario* impresso ovato, stigmate minuto; *bacca* globosa immersa, apice submucronulata.

C. DC. *Prodr. loc. cit.* p. 416.

Tallo casi tetrágono, *hojas* alternas, brevemente pecioladas; *peciolos* 3 mm. largos, lampiños; *limbos* inferiores acuñado-trasovados, los superiores elíptico-trasovados, algo adelgazados y obtusos en el ápice, ligeramente acuñados y puntiagudos en la base, 3 cm. largos, 2½ cm. anchos, firmes lampiños de ambos lados, casi pelúcidos y pelúcido-punteados, reticulado-venulosos, 5-nervios, raras veces 7-nervios; *nervio central* prolongado hasta el ápice, los laterales terminados algo más abajo, los exteriores obsoletos; *amentos* terminales, filiformes, densifloros, más largos que las hojas; *raquis* pubérula; *bractea* orbicular, peltada en el centro; *ovario* inmerso aovado, con estigma pequeño; *baya* globulosa, inmersa, algo picuda en el ápice.

Crece en el Ecuador, (lugar incierto) colectada por FRASER.

42. *P. Dauleana* C. DC. *foliis* brevissime petiolatis, lanceolatis, basi acutis, apice acute acuminatis, adultis utrinque glabris, 3-nerviis; *amentis* axillaribus terminalibusque, folia circiter duplo superantibus.

C. DC. *Piper. Andr. loc. cit.* p. 706.

Tallo erguido, pubérulo cuando tierno, adulto lampiño; *hojas* alternas, muy brevemente pecioladas; *limbos* lanceolados puntiagudos en la base, acuminados en el ápice, 3 cm. largos, casi coriáceos cuando secos, opacos, adultos lampiños de ambos lados, 3-nervios; *amentos* axilares y terminales, filiformes, densifloros, casi dos veces más largos que las hojas, sostenidos por pedúnculos 2 mm. largos; *raquis* lampiña; *bractea* orbicular; *ovario* brevemente puntiagudo en el ápice y oblicuamente estigmático.

Crece en la orilla del *R. Daule*, colectada por E. ANDRÉ.

43. *P. alata* R. & P. *foliis* breviter petiolatis, oblongo-ellipticis, apice acuminatis, basi acutiusculis, in petiolum decurrentibus, membranaceis, pellucido-punctulatis, utrinque glabris, apice ciliolatis, reticulato-nervulosis et 3-5-nerviis; *centrali nervo* validiore, nervis 3 centralibus interdum paullo supra basin solutis, nervulo tenui juxta marginem currente, petiolo glabro; *amentis* axillaribus terminalibusve, solitariis elongatis, breviter pedunculatis, densifloris maturis folia multoties superantibus; *bractea* subrotunda, centro peltata; *ovario* immerso; demum semiimmerso, stigmate punctiformi.

R. & P. Flor. Peruv. tom. I. p. 31, tab. 48 f. b; c. DC. Prodr. loc. cit. p. 418.

Tallo radicante en la base, erguido, tetrágono lampiño, 3-4 mm. grueso, dicotómicamente ramoso; *hojas* alternas; *pecíolos* 3-7 mm. largos, marginados, lampiños; *limbos* oblongo-lanceolados, acuñados, en la base y escurridos en los pecíolos, acumulados, obtusos ó ligeramente escotados en el ápice 4-6 cm. largos, 1½-2 cm. anchos, membranáceos, lampiños de ambos lados, casi pelúcidos cuando secos y pelúcido-punteados, 3-5 nervios (ó 3-5-7-plinervios) y finamente reticulado-venulosos; *nervio central* terminado en el ápice, los 2 laterales inferiores poco debajo del ápice, los 2 siguientes sobre la mitad; á estos se añaden á veces dos inferiores muy tenues y cortos y un nervio marginal poco perceptible; *amentos* terminales y axilares, filiformes, densifloros, amarillentos, 6-10 cm. largos, en pedúnculos 1-1½ cm. largos; *bráctea* muy pequeña orbicular ó elíptica peltada en el centro, subsésil; *ovario* inmerso; *estigma* punctiforme.

Crece en los bosques tropicales de *Puente de Chimbo*, prov. del *Guayas* 350 m.

44. *P. trunciseda*. c. DC. *foliis* modice petiolatis, ellipticis, basi acutis, apice obtusis, emarginulatisque, utrinque glabris, 5-nerviis; *nervis* externis saepe inconspicuis nervuloque marginali ex apice decurrente; *amentis* axillaribus terminalibusque, maturis sublaxifloris; *bractea* orbiculari; *ovario* impresso, obovato, sub apice stigma minutum gerente; *bacca* subimmersa glabra, ova-ta, apice oblique rostellata.

c. DC. *Piper. Sodir. loc. cit. p. 513.*

Tallo rastrero en los troncos vetustos, lampiño, cuando seco, coriáceo anguloso, superiormente dicotómicamente ramoso; *hojas* alternas; *pecíolos* 5-10 mm. largos, marginados, lampiños; *limbos* carnosos, casi coriáceos, cuando secos, lampiños, finamente pubérulos en el margen, pálidos inferiormente, pelúcido-punteados, 5-nervios y reticulado-venosos, los inferiores suborbiculares, 1½-2 cm. en diámetro, los superiores algo mayores, aovados en la mitad inferior y algo escorridos en el pecíolo, rómbicos en la superior, escotados en la punta; *nervio central* extendido hasta el ápice, los *medios* hasta sobre la mitad y desvanecido antes del margen, los *exteriores* cortos y poco sensibles; *amentos* axilares y terminales, erguidos, 6-7 cm. largos, 1½-2 mm. gruesos; *pedúnculos*, 1½ cm. largos; *bráctea* orbicular; *ovario* impreso aovado, oblicuamente estigmatozo en el ápice; *baya* aovada, apiculada, lampiña, muriculada.

Crece en los bosques subandinos del m. Atacatzo y del Corazón 1.800-2.000 m.

45. *P. pellucida* Kth. *foliis petiolatis, deltoideo-cordatis, apice acuminatis, obtusiusculis, glabris, pellucidis et pellucido-punctatis, membranaceis, 7-nerviis; centrali nervo ad apicem ducto, lateralibus 2 alte supra medium, 2 ad medium ductis, exterioribus brevioribus; petiolo basi amplexicauli; amentis opositifoliis, laxifloris, glabris; pedunculo glabro; bractea rotundata, centro peltata, brevissime pedicellata; ovario emerso; stigmate carnosulo, puberulo; baccā ovata, rostellata.*

Kunth in H. & B. nov., gen. pl. v. I., p. 64 et c. DC. Prodr. XVI, I. p. 402, Miq. Syst., p. 79.

Planta tenuemente herbácea, lampiña y pelúcida en todas sus partes; *tallo* inferiormente radicante alado, dicotómicamente ramoso desde la base; *ramos* erecto-patentes; *hojas* alternas, petioladas; *pecíolos* 1-2 cm. largos, endebles; *limbos* suborbiculares aovados, redondeados y levemente acorazonados en la base, triangular-puntiagudos en el ápice, 1½-2½ cm. largos, 2-3 cm. anchos, tenuemente membranáceos, lampiños, pelúcidos y pelúcido-punteados, verdes superiormente, blanquecinos en el envés, reticulado-venosos, 5-6 7-nervios, con los dos inferiores muy tenues, los demás confluentes en el nervillo marginal; *amentos* terminales y axilares, filiformes, laxifloros, 2-3 veces más largos que los *limbos*; *pedúnculos* 8-10 mm. largos, lampiños; *bráctea* orbicular, peltata en el centro; *ovario* salido; *baya* aovada glandulosa, con piquito recorvado en el ápice.

Crece en lugares húmedos á las orillas de los ríos y arroyos de la región tropical y subtropical de las prov. de Quito, parroquia de Sto. Domingo y del Guayas cerca de Bodegas, Balsapamba, Naranjito, etc., colectada también por SPRUCE, JAMESON y ORTONEDA.

46. *P. subpeltata* C. DC. *foliis longissime petiolatis, rotundo-cordatis, basi subpeltatis, apice acutiusculis, membranaceis, pellucidis, utrinque glabris, 5-nerviis et crebre reticulato-nervulosis, nervulo juxta marginem currente; petiolo glabro; amentis axillaribus longe pedunculatis, sublaxifloris; pedunculo glabro; bractea rotunda-ta, centro peltata, ovario emerso, stigmate minuto.*

C. DC. *Prodr. loc. cit. p. 411.*

Planta rastrera ó trepadora, lampiña; *tallo* filiforme; *hojas* alternas, pecioladas; *pecíolos* 4-8 cm. largos, lampiños; *limbos* orbicular-acorazonados, casi peltados en la base, algo puntiagudos en el ápice, 2 cm. largos, 2-3 cm. anchos, membranáceos, lampiños de ambos lados, pelúcidos, 5-nervios, densamente reticulado-venosos y con un nervio marginal; *amentos* axilares, laxifloros, sostenidos por pedúnculos 3-3½ cm. largos; *bráctea* orbicular, peltada en el centro; *ovario* prominente con estigma apical pequeño. (*Ex. C. De loc. cit.*)

Crece en la pendiente occidental del Pichincha, colectada por JAMESON.

47. *P. Jamesoniana* C. DC. *foliis longe petiolatis, rotundato-cordatis reniformibusve, basi cordatis, glabris, membranaceo-pellucidis, 5-7-nerviis reticulato-nervulosis; amentis axillaribus longe pedunculatis, subdensifloris; pedunculo membranaceo glabro; bractea subsessili, rotunda, centro peltata; ovario obtuso, stigmate minuto.*

b microphylla, foliis multo minoribus; bacca mucronulata (in specime nostro) sessili.

C. DC. *Prodr. loc. cit. p. 412.*

Tenuemente herbácea y lampiña en todas sus partes; *tallos* filiformes, sarmentosos y rastreros; *hojas* alternas; *pecíolos* 2-8 cm. largos, cilíndricos, enanchados en la base; *limbos* suborbiculares ó suborbicular-reniformes, 2-3 cm. largos, 2½-3½ cm. anchos, profundamente acorazonados en la base; obtusos en el ápice, carnosos, cartilagíneo-membranáceos cuando secos, lampiños de ambos lados, verdes y á veces purpurascente-marmoleados

en el haz, pálidamente blanquecinos en el envés, pelúcidos, oscuramente pelúcido-punteados, 7-nervios y densamente reticulado-venosos, con nervio periférico aproximado al margen; *amentos* axilares, filiformes, laxifloros, 8-10 cm. largos; *pedúnculos* mitad más cortos; *raquis* carnosa, lampiña glanduloso-punteada; *bráctea* orbicular, peltada en el centro y brevemente pedicelada, glandulosa; *ovario* ligeramente inmerso, obtuso, con estigma apical algo excéntrico, pubérulo; *baya* aovada, mucronada, alveolada cuando seca.

b. microphylla C. DC. *pecíolos* 1½-3 cm. largos; *limbos* menores (1-2 cm. en diámetro,) más exactamente orbiculares; *amentos* más largos (8-10 cm.); *baya* aovada, mucronada, alveolada.

Crece en lugares sombríos, en los matorrales y entre los musgos de la antiplanicie y en la región subandina del Pichincha, Atacatzo, etc.

48. *P. foliosa* Kunth., *foliis petiolatis, plerumque subbinatis vel subverticillatis, confertis, ovatis ellipticisve, apice obtusiusculis, basi rotundatis, utrinque glabris, carnosis in sicco membranaceis, subpellucidis, obsolete nervulosis, 3 nerviis vel obsolete 5-nerviis nervuloque tenui apice juxta marginem currente; petiolo glabro; amentis axillaribus terminalibus densifloris, folia superantibus, filiformibus; bractea rotundata, centro peltata brevissime pedicellata; ovario emerso.*

Kunth in Nov. gen. I. 63 et c. DC. loc. cit. p. 418.

Planta suculenta, erguida 2-3 dm. alta, lampiña, tallo estolonífero y radicante inferiormente, carnoso, anguloso, erguido, densamente ramoso en la mitad superior; ramos breves, [4-7 cm. largos] robustos, erecto-patentes; *hojas* irregularmente alternas ó subverticiladas 3-nas ó 4-nas muy densas; *pecíolos* 5-10 mm. largos, convexos en el dorso superiormente plano-cóncauos, lampiños; *limbos* aovado-elípticos, redondeados en la base, obtusos en el ápice, vivos 1-2½ cm. largos, 5-13 mm. anchos, densamente carnosos, muy lampiños, pelúcidos-glandulosos, callosos y casi roidos en el margen, 3-nervios; *nervio* central desvanecido antes del ápice y los laterales hacia la mitad del limbo; *retículo* obsoleto; *nervio* marginal apenas sensible; *amentos* opositi-

(Continuará).