



# Anales de la Universidad Central del Ecuador

CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO  
FLORA ECUATORIANA

POR EL R. P. J. SODIRO SJ.  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## PIPERACEAE ENDLICHER

(Continuación: v. supr. p. 700)

44. *P. pseudomarginatum* c. DC.; *soliis longe petiolatis, rotundato-ovatis, basi aequali profunde cordatis, apice sat longe acuminatis, 11-nerviis, supra ad nervos breviter hirtellis, margine ciliolatis, subtus glabris; petiolo glabro, ultra medium (sed non usque ad limbum) vaginante, alis persistentibus; pedunculo quam petiolus pluries breviore; amento (submaturo) quam limbus paulo breviore, funiformi; bracteae pelta parva, triangulari,*

margine hirsuta, pedicello angusto viloso; *bacca*, subte-trágona, parva glabra.

c. DC. *Piperac. Sodir. loc. cit. p. 492.*

*Arbusto* 3-4 m. alto; *ramos* largos, gráciles, remotamente nudosos, verde-oscuro, secos negruzcos, lampiños, *pecíolos* 4-6 cm. largos, alados las  $\frac{2}{3}$  inferiores, lampiños, algo pubescentes en la parte superior; *límbos* aovado-redondos, igual y profundamente acorazonados en la base, acuminados en el ápice, 10-15 cm. largos y anchos, membranáceos, pelúcido-punteados, lampiños en el parenquima, brevemente hirtos en los nervios de ambas páginas y en el margen; *nervios* II 11, ligeramente prominentes en la página inferior; los 2 superiores procedentes sensiblemente del primario y convergentes en el ápice del limbo, los 4 inferiores de cada lado emergentes de la base; *pedúnculos* 1-2 cm. largos, lampiños; *amentos* cilíndricos, rectos, tenuis, tan largos ó poco más que los límbos, 2 mm. gruesos; *bráctea* peltada, triangular ó subdiscoidea, hirsuta en el margen, el pedí culo angosto, pelierizado; *baya* pequeña (apenas 1 mm. larga) truncada en el ápice, obpiramidal-trígona ó subtetrágona, lampiña; *anteras* muy cortas, dídimas, blanquizcas.

Crece en la región tropical en la provincia del Guayas pasim, (colectada también por el SR. ORTONEDA) y cerca de San Miguel de los Colorados.

45. *P. asymmetricum* DC. *frutex* 3-4-metralis; *ramis* gracilibus, angulosis, glabris; *foliis* breviter petiolatis, membranaceis aut demum subcoriaceis, opacis, ellipticis, plus minusve asymmetricis, apice acuminatis, basi obtusis vel attenuatis; *nervo* I fere ad apicem usque pinnato; *petiolo* brevi nudo; *pedunculo* quam petiolus fere duplo breviore, tenui, stricto; *amento* cylindrico, apice obtuso vel mucronato, quam limbus duplo brevio re; *bractea* peltata, trigona, fere glabra, pedicello anguloso; *bacca* obovato-tetragona, tenuiter, pubescente.

c. DC. *in Dur. et Pitt. Primit. et Piperac. Sodir. loc. cit. p. 491.*

*Arbolillo* 3-4 m. alto; *ramos* (relativamente) gráciles, nudosos, angulosos, así como los pecíolos, limbo y pedúnculos, lampiños; *pecíolos* 1-2 cm. largos, desnudos; *límbos* rígidamente membranáceos y con la edad coriáceos, opacos, muy finamente pelúcido-punteados, clípticos, más ó menos asimétricos, 15-20 cm. largos, 4-10 cm. anchos, acuminados en el ápice, obtusos ó puntiagudos en la base, peninervios casi en toda su extensión;

*pedúnculo* 8-14 mm. largo, delgado, rígido; *amento*, cilíndrico recto, erguido, obtuso ó mucronado en el ápice, 5-9 cm. largo, 4-5 mm. grueso; *bráctea* peltada, trígona, casi lampina; *pedícelo* anguloso; *baya* trasovado-tetrágona, algo pubescente.

Crece en la región tropical y subtropical de la parroquia de *Santo Domingo*, cerca de *San Florencio*, *Boloña*, *Naranjal*, item cerca de *Nicbly* y en el valle de *Pallatanga*.

46. *P. alpinum frutex* 2-3 m.; *foliis* breviter petiolatis, ovatis vel elliptico-ovatis, apice attenuato-acuminatis, acumine obtuso, plus minusve inaequilateris, basi breviter inaequali rotundatis, utrinque glabris membranaceis, pellucido-punctulatis; *nervo* I ad  $\frac{1}{4}$  suae longitudinis nervos II utrinque 3-4, subitus prominulos subadscendentibus, infimos e basi solutos mittente; *petiolo* glabro, juniore ciliolato, mox glabrato; *pedunculo* glabro, petiolum superante; *amento* patente, crasso, recto folium superante; *bracteae* apice peltatae pelta suborbiculari vel triangulari, flavo-hirto-ciliata; *stigmatibus* lanceolatis.

c. DC. *Prodr. loc. cit.* p. 328; *Artanthe alpina* Miq. in *Hook. Lond. journ.* v. 4 p. 451.

Arbusto; ramos lampiños; *pecíolos* 5-10 mm. largos, al principio apestañados, pronto alampiñados; *limbos* aovados ó clíptico-aovados, ± inaequilateros, 5-7 cm. largos, 3-3  $\frac{1}{2}$  cm. anchos, attenuado-acuminados en el ápice, con la punta obtusa, ligeramente desiguales, y redondeados en la base, membranáceos lampiños de ambos lados, pelúcido-punteados; *nervio* I dividido hasta  $\frac{1}{4}$  parte de su longitud en 3-4 II de ambos lados, inferiormente prominentes; *pedúnculos*, lampiños, más largos que los pecíolos; *amento* patente, 3-6 cm. largo, recto; *bráctea* peltada, suborbicular ó triangular en el ápice, amarillento-apestañado; *estigmas* lanceolados.

Colectada en el monte *Pichincha* sobre 3.000 m. por el Coronel FR. HALL.

47. *P. Cascajalananum* c. DC.; *frutex* 3-4 m.; *ramis* *ramulisque* glabris; *foliis* modice petiolatis, oblongo-ellipticis, basi aequali acutis, apice acute acuminatis, utrinque glabris; *nervo* I fere e tota longitudine nervos utrinque 8-9, patulo-adscendentibus v. subrectos mittente; *petiolo* basi vaginante; *pedunculo* petiolum aequante, glabro; *amento* quam folium breviore; *bractea* apice

triangulari truncata, secus marginem villosula; *bacca* puberula.

C. DC. in *Journ. Morot.* et in *Bullet. de l'Herb.* Boiss. V. p. 701.

*Arbusto* 3-4 m. alto, con ramos y ramitos lampiños; *pectolo* 1 cm. largo, envainador en la base; *limbos* oblongo-ó aovado-elípticos, iguales y puntiagudos en la base, acuminados en el ápice, lampiños de ambos lados; 15  $\frac{1}{2}$ -20 cm. largos,  $\pm$  6  $\frac{1}{2}$ -10 cm. anchos, casi opacos, pelúcido-punteados, pálido-verdosos, peninervios en casi toda su extensión; *nervios* laterales 8-9 de cada lado, patente-ascendentes ó casi erguidos; *pedúnculos* casi iguales á los pecíolos; *amentos* más cortos que las hojas,  $\pm$  5 mm. gruesos; *bráctea* triangular, truncada en el ápice, con el margen parcamente peloso; *baya* inversamente piramidal, trígona, lampiña.

Crece en la orilla del río Pilatón, cerca de Cascajal 1.400 m., colectada por E. ANDRÉ.

48. *P. substenoarpum* C. DC.; *frutex* 2-3. m. altus; *ramulis* glabris; *foliis* modice petiolatis, elliptico-oblongis, basi aequali acutis, apice longiuscule cuspidatis, cuspidate mucronulata, utrinque glabris; *nervo* I circiter ad  $\frac{3}{4}$  longitudinis suae nervos subrectos et adscendentibus utrinque circiter 8 mittente; *petiolo* glabro, paullo supra basim vaginante; *pedunculo* petiolum aequante glabro; *amento* maturo quam limbus circiter dimidium breviore; *bracteæ* pelta triangulari, margine villosula, pedicello angusto viloso; *bacca* oblongo-obpiramidata, trigona glabra.

C. DC. *Piper. Sodiroanæ*, loc. cit. p. 492.

*Arbusto* 2-3 m. alto; *ramos* lampiños; *pectolos* 1- $\frac{1}{2}$  cm. largos, lampiños, envainadores hasta á poca distancia de la base; *limbos* 13 cm. largos, 5-5  $\frac{1}{2}$  anchos, elíptico-oblongos, puntiagudos é iguales en la base, cuspidados y arrejonados en el ápice, lampiños de ambos lados, pelúcidos y pelúcido-punteados, peninervios hasta las  $\frac{3}{4}$  partes de su longitud; *nervios* laterales casi erguidos y ascendentes, 8 de ambos lados, *pedúnculos*  $\pm$  á los pecíolos; *amentos* maduros mitad más cortos que los límbos; *pelta* de la bráctea triangular, algo pelosa en el margen, con pedicelos angosto veloso; *baya* oblongo-obpiramidal, trígona lampiña, carnosa en el ápice; *estigmas* 3 pequeños,  $\pm$  sésiles; *estambres* 3, con las anteras globosas, mucho más cortas que los filamentos.

Cruce con la especie precedente.

49. *P. brachypodium* C. DC. *foliis brevissime petiolatis, amplis, ovatis, apice acuminatis, basi inaequali obtusis, rigidis subcoriaceis, utrinque glabris, tactu scabris; nervo I ad  $\frac{1}{2}$  longitudinis suae nervos II alternos, subadscendentibus, subtus valde prominentes, adpresso hirtellis utrinque 4-6, supremos ad apicem ductos, sursumque nervulos validiores mittente; petiolo brevi, adpresso hirto; amento brevi, breviter pedunculato; bracteæ apice truncata-peltatae glabriuscule, vertice semilunari glanduloso.*

C. DC. *Prodr. loc. cit. p. 327. Artante brachypoda* Benth. *in bot. of Sulphur p. 167, tab. 54.*

*Arbusto 1-1  $\frac{1}{2}$  m. alto; ramos y ramitos  $\pm$  pelosos; pecíolos 5-7 mm. largos, pubescentes principalmente en la cara superior; limbos 20-25 cm. largos, 10-12 cm. anchos, aovado-elípticos ó algo trasovados, acuminados en el ápice, desiguales y obtusos en la base, papiráceos ó, con el tiempo, subcoriáceos, opacos y muy finamente pelúcido-punteados, lampiños de ambos lados, salvo en los nervios brevemente pubescentes y  $\pm$  escabros especialmente en la página inferior; nervio I peninervio hasta la mitad; nervio II 6-7 de cada lado, prominentes en la página inferior, los dos superiores convergentes en el ápice, los inferiores más tenues; amento breve y brevemente pedunculado; bráctea truncada-peltada semilunar, casi lampiña y glandulosa en el ápice.*

Crece en los bosques tropicales á las orillas de los ríos *Toachi* y *Pilatón* entre 800 y 900 m.; y en la isla *Gorgona*.

50. *P. Pittieri* C. DC. *frutex 1-3 m. altus; ramis fere glabris, crasse nodosis; foliis longiuscule petiolatis, membranaceis, glabris, subtus in nervis pubescentibus pellucido-punctatis, late ovatis, apice breviter acuminatis, basi subaequali cordatis; nervo I ultra  $\frac{1}{2}$  longitudinis suae nervos II utrinque 7-8 alternos, ascendentibus, supremos ad apicem ductos, infimos tenuiores mittente; petiolo basi vaginante, sursum marginato; pedúnculo oppositifolio, quam petiolus triplo breviore; amento cilindrico elongato, apice obtuso, quam limbus breviore; bracteæ late peltata subdiscoidea, margine hirsuta, staminibus tribus, filamentis elongatis pubescentibus; bacca glabra.* (Descrp. iuxta specimina nostra).

C. DC. *in Durand & Pitt. Primit. fasc. 1º p. 204 et in Piperac. Sodiroan. loc. cit.*

*Arbusto* 1-3 m. alto; *ramos* casi lampiños jugosos; *pecíolos* 5-6 cm. largos, envainadores en la base, más ó menos marginados las  $\frac{3}{4}$  partes; *limbos* anchamente aovados, 18-24 cm. largos y anchos brevemente acuminados en el ápice, acorazonados en la base, herbáceo-jugosos, rígido membranáceos cuando secos, pelúcido-punteados, verde-oscuros en la página superior, pubescentes en los nervios y con pelos muy cortos, enanchados en la base en ambos lados; *nervio I* robusto, dividido hasta sobre la mitad en 7-8 II patente-ascendentes de ambos lados, los dos superiores convergentes en el ápice; *retículo* laxo, poco prominente, parduzco; *pedúnculo* 1  $\frac{1}{2}$ -2 cm. largo, robusto, brevemente pubérulo; *amento* cilíndrico, recto, poco más corto que el limbo, 5-7 mm, grueso; *bráctea* anchamente peltada, discoidea, hirsuta negruzca en el centro, breve y densamente pelosa y franjeada en el margen, pedicelo grácil, lampiño; *estambres* tres; *filamentos* largos pubescentes; *anteras* pequeñas; *baya* trasovada, lampiña.

Crece en los bosques tropicales, cerca de la confluencia del río *Napa* con el *Pilatón*.

51. *P. pallidirameum* C. DC. *foliis* parvis, brevissime petiolatis, lanceolatis, basi subaequali acutis, apice longiuscule acuminatis, utrinque glabris; *nervo centrali* ad  $\frac{1}{4}$  longitudinis suae nervos, ascendentes utrinque 3 sursumque nervulos sat validos et patulos mittente; *petiolo* glabro basi vaginante; *pedúnculo* glabro, petiolum aequante; *amento* limbū paulo superante gracili; *bracteæ* spathulatae, brevis, inferne utrinque dense hirsutae, vertice inflexo, margine hirtello; *bacca* obovata, glabra.

C. DC. *Piperac. Sodiroan. loc. cit. p. 493.*

*Arborescente*; 3-6 m. alto; *ramos* adultos rollizos, con la epidermis blanca y lentecillas pequeñas, los tiernos angulosos verde-amarillento, así como los pecíolos, limbos y pedúnculos, muy lampiños; *pecíolos* 4-6-12 mm. largos envainadores en la base, superiormente marginados ó todos alados; *limbos* 6-8 cm. largos, 3-5 cm. anchos, elíptico-lanceolados puntiagudos é iguales ó casi iguales en la base, cuspidados y glanduloso-mucronados en el ápice, coriáceos y finamente pelúcido punteados; *nervio I* dividido hasta la  $\frac{1}{4}$  parte inferior en 3-4 II de cada lado, erecto-patentes, los dos superiores convergentes en el ápice del limbo y más arriba en otros menores, pero bastante robustos; *pedúnculo* igual ó algo más largo que el pecíolo; *amentos* erguidos, rígidos, cilíndricos 7-9 cm. largos, 3 mm. gruesos; *bráctea* acusada, oblicuamente truncada, y densamente hirsuta en el ápice; *estambres* 3 exertos; *anteras* muy pequeñas, aovadas,

glandulosas; *baya* suborbicular, trasovada glandulosa, apiculada en el ápice; *estigmas* 3 lineares, subsésiles.

Crece en los bosques subtropicales y subandinos cerca de Niebly, Naranjal, Canzacoto etc. 1.600-2.000 m.

52. P. Carpunya R. & P.; *foliis* breviter petiolatis, ovato ellipticis, apice modice acuminatis, acumine acuto mucronulato, basi subaequali cordatis, coriaceis, utrinque glabris, supra nitidis, subtilissime pellucido-punctatis; *centrali nervo* subitus prominulo, ad  $\frac{2}{3}$  suae longitudinis, nervos subalternos adscendentibus utrinque 4-5, supremos ad apicem ductos, sursumque nervulos validiores mittente; *petiolo* glabro, pedunculum glabrum aequante; *amento* densifloro, folium subaequante; *bractea* subcucullato-obovatae aureae, intus birsutae, vertice inflexo; *bacca* subgloboso-trigona glabra; *stigmatibus* abbreviatis.

R. & P. Flor. Peruv. I. p. 37, tab. 63, fig. b., Ottonia Carpunya Miq. Syst. p. 547 et O. Lessertiana ibid. p. 546. Piper Carpunya C. DC. Prodr. loc. cit p. 329 et Piper. Sodir. loc. cit. p. 493.

Arbol 6-8 m. alto, en todas partes muy lampiño; ramos flexuosos, rollizos, nudosos, con los nudos aproximados, abultados, superficie cenicienta y lenticelosa; *pecíolo* 8-10 mm. largos, interiormente acanalados, lampiños; *limbos* coriáceos, lampiños, lustrosos, pelúcido-punteados, aovado-elípticos, más ó menos inequiláteros, acorazonados en la base, con los lóbulos ligeramente desiguales, redondeados, medianamente acuminados en el ápice puntiagudo y mucronado, 9-12 cm. largos, 5-7 cm. anchos; *nervio* I dividido hasta las  $\frac{2}{3}$  partes en 4-5 II de cada lado, los dos superiores terminados en el ápice, y más arriba en otros más débiles; todos prominentes en la página inferior; *pedúnculo* igual al pecíolo; *amento* recto, rígido, cilíndrico, obtuso igual ó poco más certo que el limbo, 2 mm. grueso; *bráctea* cculiforme obovada, encorvada, lampiña; *baya* subgloboso-trigona, lampiña.

Crece en las pendientes occidentales del volcán Pululahua en la hacienda "Niebly."

53. P. glabrirameum C. DC.; *foliis* brevissime petiolatis, basi aequilateris, apice acute cuspidatis, utrinque glabris, inferioribus late ovatis, basi cordulatis, superioribus lanceolato-ovatis, basi obtusis, vel lanceolato-ellipticis basi acutis; *nervio centrali* circiter ad  $\frac{1}{3}$  longitudinis

suae nervos ascendentibus utrinque 4 et superne nervulos multos mittente; petiolo glabro, pedúnculo quam petiolus paullo breviore, glabro; amento quam limbus  $\frac{3}{3}$  breviore, haud crasso; bracteae cucullatae latae, inferne dense villosae, vertice inflexo triangulari glabro; baccā obpyramidalato-trigona, glabra.

c. DC. in *Piperac. Sodiroan.* loc. cit. p. 493.

*Arbol* de estatura mediana, 5-6 m. alto, muy ramoso, lampiño en todas sus partes; ramos flexuosos, comprimidos, nudosos, verrugosos, con epidermis blanquecina; pecíolos 5-20 mm. largos, enanchados en la base, los de los ramos principales alados hasta el limbo, los de los ramitos últimos  $\pm$  marginados; limbos rígidamente papirácceos, finalmente coriáceos, verde-blanquecinos, pelúcido-punteados, 10-20 cm. largos, 5-13 cm. anchos, los de los ramos principales ó más lozanos anchamente aovados, redondeados ó algo puntiagudos y desiguales en la base,  $\pm$  asimétricos, los de los ramos últimos mucho menores, aovado-ú oblongo-elípticos, obtusos ó puntiagudos en la base, todos acuminados en el ápice glanduloso ó calloso; nervios  $\pm$  hundidos en la página superior, prominentes en la inferior; el I dividido hasta la mitad ó la  $\frac{1}{3}$  parte inferior en 4 II más robustos ascendentes, los dos superiores convergentes y terminados en la punta del limbo, y superiormente en otros más débiles patentibus; pedúnculo igual ó poco menor que el pecíolo; amento erguido, cilíndrico, 7-10 cm. largo, 2-2  $\frac{1}{2}$  mm. grueso, obtuso en el ápice; bráctea cculiforme, con pedículo ancho, alado, pubescente, el ápice aovado-triangular, el margen pubescente; estigmas tres sésiles, lineares; baya obpiramidal-trigona,  $\pm$  glandulosa, apiculada.

Crece en las pendientes occidentales del *Mojanda* cerca de Pericho, item cerca de *Niebly*, *San Florencio* y en el valle de *Pallatanga*.

53 \* P. hypoleucum Sp. nov.; frutex vel arbor plurimetralis; ramis ramulisque glabris; foliis breviter petiolatis; petiolo basi vaginante, vagina scariosa, margine ciliolata, sursum dorso leviter pubescente vel glabro; limbis oblongo-lanceolatis, basi paullo inaequilateris, latere longiore obtusiusculo, breviore acuto, e  $\frac{1}{4}$  inferiore in apicem subobliquum, mucronatum gradatim angustatis, subcoriaceis, supra nitidis glabris; nervis venulisque impressis creberrime rugulosis, subtus dense breviterque cinereo-hirtis vel subtomentosis; nervo I nervos II hinc 4-5, illinc 5-6 erecto-ascendentibus, 2 supremis pa-

rum infra apicem evanescens mittente; *reticulo* minuto prominulo; *pedunculo* petiolum aequante vel superante, gracili glabro; *amento* tenui cylindrico, recto, apice mucronato, quam limbus 2-3-plo breviore; *bractea* cucullata, cuneata apice rotundata, cinereo hispida; *staminibus* 3, filamentis exertis quandoque anantheris, apice breviter clavellatis; *ovario* obovato, brevissime puberulo; *stigmatibus* 3 subsessilibus, linearibus, divergentibus.

Arbusto ó árbol piramidal 6-8 m. alto; *ramos* y *ramitos* gráciles, lampiños con epidermis bruno-obscura, estriolados, lisos ó finamente muriculados; *entrenudos* 3-5 cm. largos, los nudos abultados; *hojas* pecioladas; *pecíolos* tenues 1-2 cm. largos en la base, con la *vagina* escariosa, libre, brevemente apestañada, lampiños ó pubescentes en el dorso; *limbos* oblongo-lanceolados 8-15 cm. largos, 3-6 cm. anchos hacia la  $\frac{1}{4}$  parte inferior, inequiláteros en la base, con el lado mayor subobtuso, el menor puntiagudo, el margen algo ondulado, prolongados gradualmente hacia el ápice algo oblicuo, acuminado y mucronado, de consistencia membranáceo-papirácea ó casi coriácea, finamente pelúcido-punteados, intensamente verdes, lampiños brillosos y finamente rugosos en la página superior, breve y densamente ceniciente-hirtos ó casi tomentosos en la inferior; *nervio* medio dividido casi hasta la mitad en 4-5 II del lado menor y 5-6 de lado mayor, erecto-ascendentes, los 2 superiores desvanecidos por anastomosis laterales debajo del ápice del limbo; *retículo* fino y denso, con los pelos adpresos y más cortos en los nervios, más largos y crespos en el parenquima; *pedúnculos* lampiños ó muy prontamente alampiñados, patente, 5-10 mm. largos; *amentos* rectos, cilíndricos, ordinariamente mucronados en el ápice, 5-8 cm. largos, 3-4 mm. gruesos, negruzcos; *bractea* cuculiforme, enanchada y truncada en el ápice, sericeo-hirta; *estambres* 3 exertos, con frecuencia ananteros y entonces brevemente dilatados en el ápice; *ovario* trasovado, enanchado de los lados, brevemente pubérulos; *estigmas* 3 subsésiles, lineares, puntiagudos divergentes.

Especie próxima al *P. adenandrum* C. DC.; Prodr. loc. cit. p. 273. *Artanthe adenandra*, Miquel Syst. p. 515, del cual se distingue por el indumento, por las proporciones de los limbos, de los amentos &c.

Crece en los bosques subandinos de la cordillera del *Pichincha*, cerca del pueblo de *Nono*, hacienda "La Merced" y entre *Alaspungo* y *Pacay*. Colectada en flor en Agosto y Setiembre de 1899.

54. P. Quitense C. DC.; *foliis brevissime petiolatis lanceolatis apice acuminatis, acutisque mucronulatis basi acutis, membranaceis, utrinque glabris; nervis subtus prominulis; nervo centrali ad  $\frac{1}{3}$  usque suae longitudinis nervos II alternos, ascendentibus utrinque 2 mittente; petiolo glabro; pedunculo glabro petiolum longe superante; bractea glabra, vertice subinflexo-peltata; stigmatibus 3, raro 4; filamento antheram longe superante; ovario oblongo glabro, apice in stylum longum attenuato; stigmatibus 3.*

C. DC. *Prodr. loc. cit. p. 337.*

*Arbusto; ramos lampiños; pecíolos breves (3 mm. largos) lampiños; lóbhos membranáceos lampiños de ambos lados, lanceolados, acuminados, y mucronulados en el ápice, puntiagudos en la base; nervios prominentes inferiormente; el I dividido hasta  $\frac{1}{3}$  parte de su longitud en 2 II de cada lado ascendentes, alternos; pedúnculos lampiños, 1 cm. largos; amentos breves (tiernos) 1 cm. largos; bráctea lanceolada, lampiña, encorvado-peltada en el ápice; estambres 3 (raras veces 4) filamentos mucho más largos que las anteras; ovario oblongo, lampiño, prolongado en el ápice en el estilo largo grácile; estigmas tres.*

Crece en los Andes de Quito, colectada por JAMESON.

55. P. piluliferum Kunth.; *frutex plurimetralis, scandens; foliis subsessilibus, elliptico-lanceolatis, apice longe acuminatis, acumine acuto, basi inaequali subattenuatis, lobo maiore auriculatum producto, supra glabris, subtus ad nervos puberulis; nervo centrali usque ad  $\frac{1}{3}$  suae longitudinis nervos alternos adscendentibus utrinque 4-5 mittente; pedunculo hirtello; amento sphaericō, densifloro; bractea spathulata, apice inflexa, glabra; staminibus 2 exertis; ovario apice in stylum brevem attenuato; stigmatibus 2 lateralibus.*

Kth. in H. et B. Nov. gen. plant. v. I. p. 53; *Sphaerostachys Humboldtii Miq. Syst. p. 376.; Id. Illustr. p. 68 P. piluliferum c. DC. Prodr. loc. cit. p. 339. Idem Piperac. Sodir. loc. cit. p. 494.*

*Arbusto 3 y más m. alto, muy ramoso, trepador; ramos flexuosos, estriados ó surcados, algo escabros, con los nudos abultados: epidermis blanquecina; pecíolos 2-3 mm. largos; lóbhos membranáceos, pelúcido punteados, intensamente verdes y lampiños en la cara superior, blanquecinos y pubescentes en los*

nervios en la inferior, oblongo-ó elíptico-lanceolados, ± asimétricos, 10-15 cm. largos, 4-6 cm. anchos, linear-cuspidados en el ápice, desigualmente auriculado-acorazonados en la base, con el lóbulo mayor casi orbicular, tendido sobre el pecíolo y el menor; nervio I dividido en la  $\frac{1}{3}$  parte inferior en 4-5 II de cada lado, prominentes en la cara inferior, ascendentes, los dos superiores convergentes y terminados en la base de la cúspide del limbo, y superiormente en otros pinados más débiles; pedúnculo 1 cm. largo; amento globuloso 5-7 mm. en diámetro, densifloro; bráctea espatulada, encorvada en el ápice, lampiña; estambres 2 exertos; ovario prolongado en el estílo; estigmas 2; baya obpiramidal-tetrágona, obtusa en el ápice.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales desde 400 hasta 2.000 m. en los bosques de *Santo Domingo* cerca del río *Tanti*, de *San Nicolás*, *Nanegal*, *Gualea*, *Pallatanga*, etc.—Colectada también por JAMESOM en los Andes de *Quito* (3.000 p.) y por HUMBOLDT y BONPLAND en la provincia del *Azuay* entre el tambo de *Burgay* y *Cuenca*.

56. *P. subulatum* C. DC. *foliis breviter petiolatis, ample ovatis, v. ovato-ellipticis, non rugosis, acumine longe subulato, basi parum inaequali cordulatis, supra parce pilosis, subtus densius et, praesertim ad nervos, fusce pilosis, firmulo membranaceis, crebre pellucido-punctulatis; nervis subtus prominentibus; centrali ad  $\frac{1}{3}$  usque longitudinis suae nervos alternos subadscendentibus utrinque 7-8, quorum medii utrinque 2 ad apicem, sequentes alte supra medium ducti, infimi subtile Mittente; petiolo dense fusce villosa, pedunculum aequa villosum, aequante; amento florente quam folium multoties breviore; bractea conico-lanceolata, carnosa, apice acutiuscula, adpresso hirtella; antherae loculis discretis, connectivo supra loculos apiculato; filamento antheram superante.*

c. DC. *Prodr. loc. cit. p. 345 et Piperac. Sodir.*  
*p. 495.*

*Arbusto 1  $\frac{1}{2}$ -2 m. alto; ramos tiernos, angulosos, nudosos, y (con los pedúnculos, pecíolos y nervios en la página inferior de las hojas), cubiertos de pelos largos, lanuginosos parduzcos; pecíolos 3-5 mm. largos, lanuginosos; limbos 20-25 cm. largos, 9-12 cm. anchos, aovado-elípticos, terminados en cúspide linear-aleznada, ligeramente asimétricos, algo desiguales, obtusos y escotados en la base, membranáceos, opacos, pelúcido-punteados y esparcidos de puntos glanduliformes, negros en la página in-*

ferior, 6 en entrabbas; *nervio I* dividido hasta la  $\frac{1}{3}$  parte inferior en 7-8 II erecto-ascendentes de cada lado, los 2 superiores convergentes y terminados en el ápice, todos prominentes en la cara inferior y anastomosados por nervillos transversales paralelos; *pedínculos* robustos, 3-5 cm. largos; *amento* (hermafrodito) patente cilíndrico, obtuso, 4-5 cm. largo, 6-7 mm. grueso; *bráctea* lanceolada, puntiaguda en el ápice, pubescente; *ovario* sésil, oval-elíptico, anguloso en la base, prolongado superiormente en el estilo, casi tan largo como el ovario y articulado con él; *estigmas* 3, lineares recorvados; *estambres* 3 (?), con filamentos exertos; *anteras* elípticas, mucronuladas en el ápice.

Crece en los bosques de *Los Colorados* en la orilla del río *Peripa*.

El sabio Monógrafo de esta familia C. DC. (loc. cit.) coloca esta especie bajo la rúbrica "*Stylus nullus*" además agrega á la descripción respectiva la frase: "Dioicum, femina ignota." En nuestros ejemplares las flores son hermafroditas, y el ovario evidentemente elíptico. Atribuimos á la diferencia de la combinación sexual la diversidad que se nota entre nuestra descripción y la del citado autor.

57. *P. bulleum* C. DC. *foliis* breviter petiolatis, ova-to-acuminatis, acumine longe cuspidato, basi parum inaequali cordulatis, supra glabris, subtus fusce villosis, subcoriaceis, opacis; *centrali nervo* subtus prominente, ad  $\frac{1}{2}$  longitud. usque nervos subalternos, subadscendentibus utrinque 6 subtus prominulos, quorum 2 supremi ad apicem ducti, mittente; *petiolo* fusce villoso; *pedunculo* fusce villoso, petiolum aequante; *amento* quam folium multoties breviore; *bractæ* conico-lanceolatae glabrae, apice uncinato-acuto; *antheræ* connectivo supra loculos producto.

C. DC. locis citatis.

*Arbusto* 1-2 m. alto; con ramos gráciles, flexuosos, nudosos, así como los pecíolos y página inferior de las hojas, muy breve y densamente ceniciento-ó fuliginoso-pubescentes; *pecíolos* 3-5 mm. largos; *limbos* elíptico-lanceolados, 20-30 cm. largos, 5-9 cm. anchos, larga y gradualmente cuspidados en el ápice, breve y desigualmente acorazonados en la base, subcoriáceos, pelícido-punteado, lampiños y abollado-rugosos en la página superior, subfuliginoso-tomentosos y alveolados en la inferior; *nervio I* dividido hasta la  $\frac{1}{3}$  parte ó la mitad en 5-6 II ascendente-erectos de cada lado, con los dos superiores convergentes y terminados en el ápice; *pedúnculo* tan largo como el pecíolo; *amento* (fem. immaturo) 3 cm. largo, 3-4 mm. grueso, obtuso;

*bráctea* cónico-lanceolada, encorvada en el ápice, *estigmas* sé-siles.

Crece en los bosques subtropicales en el camino de *San Florencio* á *Santo Domingo* entre 900-1.600 m.

58. *P. filistylum* C. DC. *frutex* 80-100 cm. altus; *ra-mis* glabris vel tenuiter pubescentibus; *foliis* magnis, breviter petiolatis, subobovato ellipticis, basi inaequali cordulatis, apice acuminatis, supra glabris, subtus ad nervos nervulosque adpresse puberulis: *nervo centrali* nervos fere ad  $\frac{1}{2}$  longitudinis suae 8 adscendentibus et alternos utrinque mittente; *petiolo* alte vaginante, glabro; *amento* quam folium multoties breviore; *bractea* spathulata, apice excepto, villosa; *ovario* glabro, conoides, in stylum filiformem apice minute 2-3-lobulatum attenuato.

c. DC. *Piperac. Sodir.* in *Bulletin loc. cit.* p. 491.

b. *obovatum* var. nov. *foliis* minoribus, obovatis, asymmetricis, subtus undique dense et longiuscule pubescentibus.

Mata ó arbustito 80-100 cm. alto, con ramos jugosos, medulosos, parcamente pubescentes; *pecíolos* 2-3 cm. largos, enanchados en la base, lampiños; *limbos* membranáceos, jugosos, lampiños, brevemente pubescentes en el margen y en los nervios de lo página inferior, muy finamente pelúcido-punteados, y con puntos negruzcos glanduliformes en entrambos, 25-35 cm. largos, 16-20 cm. anchos, subelípticos, oblicuamente acuminados y mucronados en el ápice, contraídos y desigualmente auriculado-acorazonados en la base, con el lóbulo mayor (3 cm. largo) tendido sobre el pecíolo, el menor divergente; *nervios* gruesos, inferiormente prominentes, el I dividido hasta  $\frac{1}{2}$  ó las  $\frac{2}{3}$  partes de su longitud en 6 II alternos, ascendentes, con los dos superiores convergentes y prolongados en el ápice, además dos muy tenues repartidos en los lóbulos; *pedúnculo* axilar  $4\frac{1}{2}$ -5 cm. largo, pubcente filiforme, bibracteado, simple, ó una ó dos veces dividido; *pedicelos* 1-2 cm. largos; *amento* (aún tierno) 3-4 cm. largo, 4-5 mm. gruesos; *bráctea* linear-oblonga (ex C. DC. espatulada) velluda, salvo en el ápice; *flores* monoclinas, las superiores abortivas; *estambres* tres, anteras exertas, acuñadas; *estilo* largo, filiforme, trigono, muy brevemente trilobado.

b. *obovatum* planta menor; hojas menores, trasovadas, asimétricas, densamente pubescentes en toda la página inferior.

Crece en la región tropical de *Santo Domingo* de los *Colo-rados* 300-800 m.

NOTA.—Esta especie ha sido colocada por el ilustre Mo-

nógrafo de las Piperáceas en la sección "*Ca, punya*," pero, por los pedúnculos axilares, debe transferirse á la "*Potomorphe*."

59. *P. umbellatum*; *foliis longe petiolatis, rotundato-reniformibus, apice breviter attenuatis, acutis, basi profunde cordatis, supra subtusque ad nervos breviter hirtellis, membranaceis, subpellucidis, subtiliter et crebre pellucido-glandulosis, nervis subtus prominulis, centrali ad apicem ducto, usque  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$  longitudinis supra basin nervos alternos vel suboppositos adscendentibus utrinque 2 (quorum inferi fere e basi soluti) et ex ipsa basi utrinque 5-6 divaricantes mittente, nervulis subtransverse parallelis; petiolo circiter usque ad  $\frac{1}{2}$  longitudinis vaginante, dorso striatim hirtello; amentis in pedunculo communi, quam petiolus multoties breviore striatim hirtello, 4-9 umbellatis, breviter pedunculatis, quam folia multoties brevioribus; bracteæ pelta triangulari-semilunari, margine hirsuta; stigmatibus 3 linearibus, sessilibus.*

C. DC. *Prodr. loc. cit. p. 332.*

*Arbusto 2-3 m. alto, blanquecino, muy lampiño; tallo erguido, nudoso; entremados 15-20 cm. largos; pecíolos subcilíndricos, 15-20 cm. largos; límbos suborbicular-reniformes, 30-35 cm. largos y anchos, brevemente acuminados, acorazonado-reniformes en la base, con los lóbulos divergentes, redondeados, tenueamente membranáceos, jugosos, verde-glaucescentes inferiormente, pellucido-punteados, lampiños ó muy brevemente pubescentes en los nervios; nervio I dividido en 2 II de cada lado entre la base y la  $\frac{1}{4}$  ó  $\frac{1}{3}$  parte inferior, los dos superiores convergentes y terminados en el ápice, además en 4-6 II de cada lado, derivados de la base del limbo, todos anastomosados por nervios transversales, paralelos y prominentes en la página inferior; pedúnculos 2-3 axilares, 5-9 cm. largos, estriados, muy lampiños ó brevemente pubescentes; amentos 4-9 umbelados en el ápice del pedúnculo, cilíndricos, rectos, blancos, 5-8 cm. largos, 2-3 mm. gruesos; bráctea peltada, pelta triangular-semilunada, breve y densamente pubescentes en el margen; estigmas 3, lineares sésiles.*

Crece en los bosques tropicales húmedos cerca de *San Miguel de Los Colorados* y de "*Puente de Chimbo*."

Varía ya con los ramos tiernos, pecíolos, pedúnculos y límbos muy fina y densamente pubescentes, ya en todas partes muy lampiño.

60. P. Cuernavacanum C. DC.; *foliis longe petiolatis ovato-rotundatis, apice acutis, basi profunde cordatis, paulo supra basin peltatis, membranaceis, subopacis, pellucido-punctatis, laete subslavificantibus, utrinque et subtus densius molliterque pubescentibus, undeninerviis; nervis subtus prominulis; centrali nervo nervum utrinque i supra basin oppositos mittente, petiolo ad  $\frac{1}{3}$  longitudinis usque vaginante pubescente; amentis in pedunculo axillari communi ternatis; pedunculo communi petioli dimidium aequante puberulo; pedicellis singulis quam pedunculus comm. triplo brevioribus, puberulis; amentis limbos dimidios aequantibus; bracteæ vertice truncato-peltatae; pelta triangulari, margine subaureo-villosa; staminibus 2; antheris caducis; baca obpyramido-trigona.*

C. DC. in Linn. vol. 37, p. 363 et Piperac. Sodir. loc. cit. p. 494.

*Arbusto 1-2 m. alto; ramitos pubescentes; hojas largamente pecioladas, aovado-redondeadas, 18 cm. largas, 21 cm. anchas, puntiagudas en el ápice, profundamente acorazonadas en la base y peltadas algo sobre la base, membranáceas, subopacas, pélucido-punteadas, cano-ó amarillento-pubescentes de ambos lados, especialmente en el inferior, undeninervias; nervios algo prominentes inferiormente, el central con dos laterales opuestos á poca distancia de la base; peciolos 12 cm. largos, alados hasta la mitad, pubescentes; pedúnculos axilares, solitarios, 5-7 cm. largos, pubérulos; pedicelos (ternados) en la extremidad del pedúnculo; pubescentes, tres veces más cortos que éste; amentos iguales á la mitad del limbo; bráctea truncado-peltada; pelta triangular, subaureo-villosa en el margen; estambres 2, anteras caducas; baya trigona, inversamente piramidal.*

Crece en la región tropical á la orilla del río Toachi, colectada también por E. ANDRÉ.

61. P. peltatum L.; *foliis longe petiolatis, ad  $\frac{1}{3}$  longitudinis peltatis, rotundato-ovatis, apice protracto-acutis, basi rotundatis, concavo-truncatis vel breviter cordatis, utrinque glabris, firme membranaceis vel membranaceis subopacis, pellucido-punctatis; nervis subtus prominulis; centrali ad apicem ducto, nervos alternos vel oppositos adscendentibus utrinque supra basin 2, e basi utrinque 6-5 mittente, nervulis subtransversim parallelis; petiolo ad  $\frac{1}{3}$  longitudinis usque vaginante glabro, alis*

linearibus; *amentis* in pedunculo communi axillari, quam petiolus multoties breviore, glabro, 7-10 umbellatis, densifloris, quam folia fere triplo brevioribus, breviter pedunculatis; *bracteæ* apice peltatae, pelta triangularis-semilunari, margine hirsuta; *bacca* glandulosa.

Linn. Sp. 42. *Piper pruinosum* Willd., *P. speciosum* Willd., *Heckeria scutata* Kth., *Peperomia pruinosa* Kth., *Potomorphe peltata* Miguel Syst p. 203; et alia synonyma complura. Vid. apud. DC. Prodr. loc. cit. p. 331.

*Arbusto* 2-3 m. alto; *ramos* subherbáceos medulosos, estriados, lampiños, glaucescentes; *pecíolos* 15-20 cm. largos, rollizos, alados, hasta la mitad, lampiños; *limbos* discoideo-aovados, puntiagudos ó acuminados en el ápice, truncado-cóncavos en la base, peltados en la  $\frac{1}{4}$  sobre la base, 20-30 cm. largos é igualmente anchos, tenuemente membranáceos, lampiños ó finamente pubescentes en los nervios, pelícido-punteados, pálidos ó garzos en la página inferior; *nervio* I dividido hasta  $\frac{1}{4}$  parte en 2 II de cada lado, los 2 superiores convergentes y terminados en el ápice; *nervios* basilares 6-5 de cada lado divaricados, todos ligeramente prominentes en la página inferior y anastomosados por nervillos arqueados subparalelos; *pedúnculos* axilares 1-3, desiguales, 3-5 cm. largos, erguidos lampiños; *pedicelos* 7-10, umbellados, 1 cm. largos; *amentos* 7-10 cm. largos, rectos, cilíndricos, obtusos en el ápice, 3 mm. gruesos; *bráctea* peltada, pelta triangular-lunada, hirsuta en el margen.

Crece en los bosques tropicales de *Los Colorados* y del valle de *Pallatanga*.

#### ADICIONES

(Pág. 678, después de *P. Miersinum*, agréguese)

19 \* *P. eriocladium* Sp. nov. *frutex* erectus plurimetalis; *ramis* dense retrorsum lanatis; *foliis* ovatis, acuminatis, basi breviter inaequali rotundatis vel cordulatis, supra intense viridibus, caelato-rugosis, in nervis pilosis, subtus sordide canesceni-pilosus, alveolatis, ad  $\frac{1}{2}$  usque utrinque 6 nerviis; *nervis* 2 supremis ad apicem usque ductis, infimis tenuioribus; *petiolis* 2  $\frac{1}{2}$ -3 cm. longis, subcylindricis, hirsuto-lanatis, prope basin ad  $\frac{1}{3}$  vaginatis; *pedunculo* petiolum  $\frac{1}{3}$  superante, cylindrico, erecto, robusto; *amentis* cylindricis obtusis, quam lim-

bi  $\frac{1}{2}$  brevioribus; *bractea* subtriangulari, centro umbo-nata, margine ciliata, deorsum longe pilosa; *filamentis* 4 linearibus, leviter exertis; *bacca* obovato-cuneata, glabra; *stigmatibus* 3 sesilibus, linearibus, divergentibus.

*Arbusto* multicaule 4-5 m. alto; *entrenudos* 10-15 cm. largos, así como los nudos (abultados) cubierto de pelos largos, blandos, ceninientos, dirigidos hacia atrás; *pecíolos* brevemente envainadores en la base, casi cilíndricos, 3-5 cm. largos, cubiertos, así como los nervios y el pedúnculo de pelos análogos, pero más cortos que los del tallo; *limbos* aovados ó aovado-elípticos, acuminados en el ápice, iguales ó ± desiguales en la base, arredondeados ó muy ligeramente acorazonados; 12-18 cm. largos, 8-10 cm. anchos en la  $\frac{1}{3}$  parte inferior, membranáceos, muy rugosos, verdes, algo pulverulento-pubescentes, pelosos en los nervios de la cara superior, más pálidos, hirsutos en los nervios y profundamente alveolados en la cara inferior; *nervios* II 6 7 de cada lado del central, erecto-patentes, los 2 superiores, convergentes y terminados en el ápice; *los inferiores* más tenues y patentes, terminados sucesivamente en el margen; *pedúnculo* opositifolio, erguido, cilíndrico, robusto, doble más largo que el pecíolo correspondiente; *amento* 10-15 cm. largo, casi 1 cm. grueso, erguido, obtuso en el ápice; *bractea* casi triangular, prolongada hacia atrás, disciforme y callosa en el centro, largamente apestañada en el margen; *estambres* brevemente salientes; *baya* trasovado-acuñada, angulosa; *estilos* 3 breves, lineares, divergentes.

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha hacia Verde-cocha. (Enero 3 de 1900).

(Pág. 684, antes del *P. Guayasanum*, póngase:)

26 \* *P. Ecuadorensis* Sp. nov. *Frutex* 2-3-metralis; *caule*, *ramis*, *petiolisque* verrucoso-muricatis, glabrescentibus; *petiolis* subcylindricis, basi *vagina* stipuliformi, late alata, hyalina, verrucosa, decidua instructis; *limbis* amplissimis, sub-rotundis, basi profunde cordatis (lobis latis obtusis) apice breviter abrupteque acuminatis, membranaceis, valde rugosis, pellucido-punctatis, supra in nervis, subtus undique tenuiter, breviter denseque pubescente-tomentosis; *nervo centrali* fere ad dimidium suae longitudinis nervos II utrinque 6-7 mitente; *pedunculis* opositifoliis, cylindricis, robustis, erecto-patentibus, 8-10 cm. longis, quam petioli dimidio, quam amenta triente brevioribus; *amentis* sub-

cylindricis, apice obtusis, (adhuc immaturis) 15 cm. longis, 12-15 mm. crassis, densifloris; *bractea* clavato-cuneata, intus vix concava, apice subtruncata, margine ciliato-hirsuta; *staminibus* (plerumque) 4, antheris articulatis, didymis; *bacca* subovato-cuneata, subangulata, apice in stylum brevem contracta, *stigmata* 3-2 (quandoque 4-5) linearia.

*Arbusto* 2-3 metros alto; *tallos* achaparrados, crasos, medulosos y, así como los ramos y los pecíolos, muy verrugosos, al principio tenuemente aracneoso-tomentosos, finalmente lampiños; *pecíolos* casi cilíndricos robustos, con la base abrazadora abultada, envainadores en la base, con la vaina (en forma de estípula intra-peciolar) tenuemente membranácea, lanceolada, acuminada, anchamente alada, adherida al pecíolo en el dorso en la mitad inferior, caediza, algo verrugosa y ligeramente blanquecino-tomentosa, pronto alampiñada; *limbos* casi orbiculares,  $\pm$  40 cm. largos y anchos, algo inequiláteros, profundamente acorazonados en la base, brusca y brevemente acuminados en el ápice, membranáceos, muy rugosos, finalmente pelúcido-punteados, lampiños, salvo en los nervios, é intensamente verdes en la página superior, pálidos, densa y brevemente pubescentes en la inferior; *nervio central* dividido casi hasta la mitad inferior en 6-7 II de cada lado, erecto-patentes, los tres superiores convergentes y terminados en el ápice del limbo, los inferiores, gradualmente más tenues; *pedúnculo* opositifolio, robusto erecto-patente, apenas muriculado, algo pubescente, 8-10 cm. largo abultado en la base; *amentos* (todavía no maduros)  $\pm$  15 cm. largos, 12-15 mm. gruesos, casi cilíndricos, obtusos en el ápice, muy densifloros; *bráctea* mazudo-acuñada, apenas cóncava interiormente, triangular en el ápice, convexa en el centro é hirsuto-apestañada en el margen; *cstambres* 4, filamentos cortos apenas exertos, negruzcos, articulados con las anteras; *anteras* dídimas, amarillentas, caedizas; *baya* obpiramidal acuñada, angulosa, prolongada, en el ápice en el estilo muy breve; *estigmas* 3-2 (á veces 4-5) lineares-negruzcos.

Especie magnífica y muy distinta por sus grandiosas hojas redondas, tallos y ramos verrugosos, pedúnculos largos, gruesos y erguidos, por las proporciones de los amentos y la forma de las brácteas y de los frutos.

Crece en los bosques de las pendientes occidentales del Pichincha, 2000-2400 m. y en la cordillera oriental, cerca del pueblo de Oyacachi.

(Pág. 848, después de **P. Pittieri**, añádase:)

50 \* *P. hymenopodium* Sp. nov.; *arborescens*, 3-4-metralis; *ramis* tenuiter puberulis, mox glabrescentibus; *petiolis* 4-6 cm. longis, cum stipula oppositifolia connatis, eaque delapsa, fere usque ad limbum marginatis, tenuiter pubescentibus; *limbis* late ovatis, basi leviter et subaequaliter cordatis, apice breviter acuminatis, membranaceis, crebre pellucido-punctatis, brevissime tenuiterque pubescentibus supra intense viridibus, brevissime pilosis, subtus pallidis, pube brevissima (in nervis densiore) obtectis; *nervo centrali* ultra medium in nervos laterales utrinque 8-9 diviso, 2 superioribus ad apicem usque ductis, insimis tenuioribus, fere contiguis patentibus; *pedunculo* quam petiolus 2-3-plove breviore, robusto crasso; *amento* crasso, erecto, cilíndrico, limbi  $\frac{1}{2}$  superante; *bractea* cucullata, apice triangulari, margine dense ciliata; *bacca* obovata angulata; *stigmatibus* sessilibus, linearibus divergentibus.

Arbusto 3-4 m. alto; tallos lampiños, con los nudos muy abultados pubescentes, entrenudos prontamente alampiñados, recorridos alternativamente por rayas longitudinales verdes y purpurascientes; pecíolos 4-6 cm. largos, vaginados hasta 1 cm. debajo de la base del limbo y soldados con la estípula opositifolia, caediza, cartilaginea; limbos aovados, ligeramente acorazonados en la base, con los lóbulos ± desiguales, brevemente acuminados en el ápice, membranáceos, herbáceos, pelúcido-punteados, muy breve y finamente pubescentes de ambos lados, más densamente en los nervios y en el inferior, verde, opacos en el haz, ceniciente-verduzcos en el envés; nervio medio dividido hasta poco más de la mitad en 8-9 laterales, los 2 superiores convergentes en el ápice, los inferiores ténues aproximados; pedínculo cilíndrico, robusto, erguido, 2-3 veces más corto que el pecíolo; amento (blanco durante la floración), cilíndrico, obtuso con frecuencia estéril en el ápice, 10-12 cm. largo, 6-7 cm. grueso; bractea ligeramente cuculiforme, discoidea, triangular en el ápice, apestañada en el margen, con el pedicelo anguloso, hirsuto, anteras 3 (?), blancas, casi 4-angulares, con el conectivo craso; baya casi trasovada, prismática, angulosa lampiña; estigmas 3 cortos, sé-siles, lineares, divergentes.

Crece en la región subandina, en la pendiente occidental del Pichincha, (Enero 3 de 1900).

Especie muy parecida al **P. Pittieri**, del cual se distingue por la estípula adherida al pecíolo, los amentos mayores y la forma de la bráctea.

## G. 2. PEPPEROMIA R. &amp; P.

*Flores monoclini, raro diclini, nudi, in amenta, seu spicas, dispositi, 1-bracteati; stamina 2, lateralia; filamenta brevia; antherae oblongae vel subglobosae; extorsae, bivalves; ovarium sessile vel substipitatum, apice obtuso v. rostrato; stigma sessile, indivisum, terminale v. (infra apicem ovarii) dorsale; ovulum 1 erectum; bacca (v. nucula) plus minusve succulenta v. sicca; embryo parvus, albumine farinoso.*

*Flores monoclinas, raro diclinas, dispuestas en amentos ó espigas más ó menos densos, bracteadas en la base; periancio nulo; estambres 2, laterales respecto al ovario; filamentos cortos; anteras extorsas, biloculares, con los lóculos confluentes; ovario sésil ó subpedicelado, obtuso ó puntiagudo ó rostrado en el ápice; estigma sésil, indiviso, á veces apincelado, terminal ó dorsal (debajo del ápice del pico del ovario); óvulo 1 erguido; fruto baya pequeña con pericarpo tenue, á veces seco; semilla albulinosa, albúmen farinoso; embrión pequeño.*

*Plantas pequeñas herbáceas, perennes, raras veces ánuas, con tallos erguidos ó rastreros, con frecuencia filiformes; hojas alternas, opuestas ó verticiladas, muy enteras, jugosas ó ± carnosas, con frecuencia pelúcido-punteadas; inflorescencia simple ó compuesta en amentos axilares ó terminales.*

Crecen desde el nivel del mar hasta la elevación de 4.000 m., abundando especialmente en los bosques húmedos calientes y templados, desde el pie de la cordillera hasta 3.000 m.

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1	<i>Amentos</i> dispuestos en espigas, umbelas ó panículas terminales .....	2
—	<i>Amentos</i> solitarios (terminales ó axilares) ó geminados, (uno axilar y el otro terminal) .....	15
2	<i>Amentos</i> aproximados .....	3
—	<i>Amentos</i> apartados; <i>hojas</i> alternas no peltadas .....	8
3	<i>Hoja</i> s (almenos las inferiores) peltadas .....	4
—	<i>Hoja</i> s no peltadas, ± verticiladas, acorazonadas .....	7
4	<i>Amentos</i> ± regularmente verticilados; <i>tallos</i> y <i>ramos</i> sulcados .....	1. <i>P. Sodiroi</i> .
—	<i>Amentos</i> paniculados, esparcidos; <i>tallos</i> rollizos .....	5

- 5 Planta subacaule; *limbos subdiscoídeos*, 7-9-nervios..... 2. *P. Cotyledon.*
- *Caulescentes*; *limbos discoídeo aovados*..... 6
- 6 Amentos dispuestos en panícula afila; *limbos truncados ó concavos en la base*..... 3. *P. peltigera.*
- Amentos axilares y terminales; *limbos redondeados en la base*..... 4. *P. polybotrya.*
- 7 *Limbos lanceolados*, tomentosos, los superiores opuestos..... 5. *P. Fraseri.*
- *Limbos aovados lampiños*, todos verticilados. 6. *P. costulata.*
- 8 Amentos espigados ó paniculados en el ápice de un pedúnculo afilo..... 9
- Amentos 8-3 terminales, umbelados, plantas lampiñas... 13
- 9 *Limbos peninervios*, angostados en la base..... 10
- *Limb.  $\alpha$ -nervios*, acorazonados..... 12
- 10 Amentos paniculados, 10-12 cm. largos... 7. *P. omnincola.*
- Amentos espigados 1-5 cm. largos..... 11
- 11 *Limbos lampiños* 12-25 cm. largos; amentos 1-2 cm. largos..... 8. *P. aphanoneura.*
- *Limbos velludos* en el envés, glandulosos, 5-6 cm. largos; amentos  $\pm$  iguales á los limbos... 9. *P. glandulosa.*
- 12 Planta casi lampiña; *limbos aovado-acuminados*, 9-nervios..... 10. *P. Ecuadorensis.*
- Planta velluda, *limbos orbicular-aovados*, 11-nervios... 11. *P. villosa.*
- 13 *Limbos orbicular-aovados*, escotados en la base; tallo casi alado..... 12. *P. subalata.*
- *Limbos acuñados* en la base..... 14
- 14 *Limbos lanceolados*, 7-nervios; amentos 8-3..... 13. *P. Chimboana.*
- *Limbos elíptico-lanceolados*, plurinervios; amentos ternados..... 14. *P. ternata.*
- 15 Ovario estilífero; *estigma apical*; *limbos suborbiculares*.. 16
- Ovario no estilífero ni prolongado en punta recta..... 18
- 16 *Limb.* 5 cm. en diámetro; amentos fusiformes..... 15. *P. pachystachya*
- *Limb.* menores; amentos filiformes..... 17
- 17 *Limb.* acorazonado-reniformes, setulosos de ambos lados..... 16. *P. hispidula.*
- *Limb.* orbicular-aovados, pubescentes en los nervios de la página inferior..... 17. *P. pilinervia.*
- 18 Hojas alternas (en los números 30 y 74 las inferiores opuestas, en el número 48 opuestas ó verticiladas).... 19
- Hojas opuestas (ó las de los ramos floríferos alternas)... 71
- Hojas verticiladas (al menos las de los tallos ó ramos fértiles) .. 78

## (HOJAS ALTERNAS)

19	<i>Estigma</i> apical ó casi apical, oblicuo.....	20
—	<i>Estigma</i> infra-apical ó delantero, oblicuo; <i>ovario</i> superiormente complanado, ± peltado, alesnado ó acuminado .....	59
20	<i>Limb.</i> grandes (10-16 cm. largos).....	21
—	<i>Limb.</i> menores.....	23
21	<i>Limb.</i> peninervios, acuminados, lampiños de ambos lados .....	18. <i>P. basellaefolia</i>
—	<i>Limb.</i> α-nervios .....	22
22	<i>Limb.</i> oblongo-lanceolados, 7-nervios, lampiños inferiormente; <i>amentos</i> terminales.....	19. <i>P. stenostachya</i>
—	<i>Limb.</i> acorazonados, aovados, 11-nervios, setuloso-pelosos; <i>amentos</i> terminales y axilares .....	20. <i>P. albovittata</i>
23	<i>Limb.</i> 2-9 cm. largos.....	24
—	<i>Limb.</i> menos de 2 cm. largos.....	48
24	<i>Limb.</i> adultos pubescentes de ambos lados.....	25
—	<i>Limb.</i> adultos pubescentes de un lado ó en los nervios .....	27
—	<i>Limb.</i> adultos lampiños de ambos lados.....	34
25	<i>Limb.</i> orbicular-aovados, acorazonados, 9-nervios, tan largos como los amentos.....	21. <i>P. Pandiana</i>
—	<i>Limb.</i> lanceolados, obtusos en la base, 3-nervios, más largos que los amentos.....	22. <i>P. induta</i>
—	<i>Limb.</i> angostados en la base, 5-nervios, amentos axilares y terminales	26
26	<i>Limb.</i> elípticos, casi = á los amentos ..	23. <i>P. truncívaga</i>
—	<i>Limb.</i> subrómbeo-ó aovado-elípticos, 3-4 veces más cortos que los amentos .....	24. <i>P. defoliata</i>
27	<i>Limb.</i> angostados en la base, <i>amentos</i> axilares y terminales	28
..	<i>Limb.</i> no angostados en la base .....	29
28	<i>Limb.</i> lanceolados ó trasovados, 3-nervios, poco más cortos que los amentos .....	25. <i>P. saxatilis</i>
—	<i>Limb.</i> elíptico-lanceolados, 3-5-nervios, 2-3 veces más cortos que los amentos .....	26. <i>P. trinervis</i>
29	<i>Limb.</i> obtusos en la base, 7-nervios.....	30
—	<i>Limb.</i> suborbiculares ó acorazonados en la base .....	31
30	<i>Amento</i> i opositifolio, más corto que el limbo.....	32
—	<i>Amentos</i> axilares y terminales, filiformes, más largos que los limbos .....	27. <i>P. enantiostachya</i>
—	<i>Amentos</i> axilares y terminales, filiformes, más largos que los limbos .....	28. <i>P. Tablahuasiana</i>
31	<i>Limbos</i> suborbiculares, obtusos en el ápice .....	33
—	<i>Limbs.</i> aovados, ± angostados en el ápice; <i>amentos</i> axilares y terminales .....	33

- 32 *Tallo* (echado) y ramos retrorso-pelosos; *amentos axilares* casi iguales á los limbos ..... 29. *P. Lehmanni*.
- *Tallo* (erguido) y hojas blandamente pubérulas; *amentos axilares y terminales*, mucho más largos que los limbos ..... 30. *P. crassilimbus*.
- 33 *Limb.* subsésiles, 7-nervios, 2-2 ½ cm. largos, opacos ..... 31. *P. Miquelianae*.
- *Limb.* peciolados, 9-nervios, 5-6 cm. largos, pelúcido-punteados ..... 32. *P. Grisari*.
- 34 *Limb.* peninervios; *amento terminal* robusto, más largo que los limbos ..... 18. *P. basellaefolia*.
- *Limb.* α-plinervios ..... 35
- *Limb.* α-nervios ..... 40
- 35 *Limb.* elíptico-rómbeos, lanceolados, negro-punteados; *amentos axilares y terminales*, más largos que los limbos ..... 36
- *Limb.* acorazonados en la base ..... 38
- 36 *Limbos* 3-5-plinervios, lanceolados, acuminados; *pedúnculos* casi = á los pecíolos ..... 33. *P. melanostigma*.
- *Limb.* 5-7-plinervios ..... 37
- 37 *Limb.* 5-plinervios, 6-8 cm. largos; *amentos* solitarios ó geminados, 6-9 cm. largos ..... 34. *P. nigro-punctata*
- *Limb.* 5-7-plinervios, 3-5 cm. largos; *amentos* 3-7 cm. largos ..... 35. *P. dendrophila*.
- 38 *Limb.* 11-plinervios, 6-9 cm. largos; *pecíolos* 4-6 cm. largos ..... 36. *P. syringaeifolia*.
- *Limb.* 7-plinervios, menores ..... 39
- 39 *Limb.* aovado-acuminados, más cortos que los amentos ..... 37. *P. inconspicua*.
- *Limb.* suborbicular-aovados, más largos que los amentos ..... 38. *P. pteroneura*.
- 40 *Limb.* ± puntiagudos en la base ..... 41
- *Limb.* obtusos ó acorazonados en la base ..... 46
- 41 *Amentos* axilares, solitarios; *tallos* lampiños, 4-gonos ..... 42
- *Amentos* terminales, solitarios, ó termin. y axilares ..... 43
- 42 *Limb.* lanceolados, los inferiores ± trasovados; *pedúnculo* mucho mayor que el pecíolo ..... 39. *P. angularis*.
- *Limb.* aovado-elípticos, pedúnculo casi = al pecíolo ..... 40. *P. nemorosa*.
- 43 *Amentos* terminales solitarios (v. et. n° 43); *limbos* trasovados, 5-7-nervios ..... 41. *P. Guadalupensis*
- *Amentos* axilares y terminales ..... 44
- 44 *Limb.* lanceolados, 3-nervios, 3 cm. largos, ± doble más cortos que los amentos ..... 42. *P. Dauleana*.
- *Limb.* elípticos, 3-5-nervios; *tallos* 4 gonos ..... 45

- 45 *Limb.* elíptico-lanceolados, acuminados, 3-5-nervios; *tallo*  
4-alado ..... 43. *P. alata.*
- *Limb.* elípticos ó orbiculares, obtusos ó escotados en  
el ápice, 5-nervios, 3 cm, largos ..... 44. *P. trunciseda.*
- 46 *Tallos* erguidos, dicótomo-ramosos; *limbos* subdeltóideo-  
aodados; *amentos* opositifolios ..... 45. *P. pellucida.*
- *Tallos* filiformes, prostrados; *amentos* axilares ..... 47
- 47 *Limb.* subpeltados, 5-nervios, orbicular-acorazonados,  
puntiagudos en el ápice ..... 46. *P. subpeltata.*
- *Limb.* 5-7-nervios, acorazonado-reniformes, obtusos en el  
ápice ..... 47. *P. Jamesoniana.*
- 48 *Tallos* erguidos ..... 49
- *Tallos* prostrados, rastreros ó trepadores ..... 50
- 49 *Limb.* aoado-elípticos, 3-5-nervios, lampiños; *amentos*  
axilares y terminales ..... 48. *P. foliosa.*
- *Limb.* orbicular-aoados, 3-nervios, pubescentes; *amentos*  
axilares, solitarios ..... 49. *P. parasitica.*
- 50 *Tallos* 2 ó más mm. gruesos; *limbos* suborbiculares, 13-15  
mm. en diámetro; *amentos* axilares y terminales ..... 50. *P. longicaulis.*
- *Tallos* filiformes, rastreros, ± radicantes ..... 51
- 51 *Amentos* terminales ..... 52
- *Amentos* axilares ..... 58
- 52 *Tallos* y *limbos* lampiños, ó casi lampiños; *limbos* 3-ner-  
vios, ± apestañados en el ápice ..... 53
- *Tallos* y *limbos* (ó *limbos* solos) ± pelosos ..... 55
- 53 *Limb.* suborbiculares, 15 mm. en diámetro, anaranjado-  
glandulosos ..... 51. *P. rubro-punctata.*
- *Limb.* lanceolados ..... 54
- 54 *Limb.* angostamente lanceolados, brevemente pelosos  
en el ápice, blanquecinos en el envés ..... 52. *P. stenophylla.*
- *Limb.* aoado-lanceolados, lampiños en el haz, pelosos en  
el envés ..... 53. *P. demissa.*
- 55 *Tallos* lampiños; *limbos* orbiculares, mínimos, pelosos  
en el haz, lampiños en el envés ..... 54. *P. andinacea.*
- *Tallos* y *limbos* ± sensiblemente pelosos ..... 56
- 56 *Limb.* aoado ó los inferiores, suborbicular-aoados, opa-  
cos, hirsutos de ambos lados ..... 55. *P. serpens.*
- *Limb.* suborbiculares ..... 57
- 57 *Limb.* pelúcidos, ± setulosos de ambos lados ..... 56. *P. nummularifolia.*
- *Limb.* opacos, brevemente pelosos y apestañados ... 57. *P. Tondusii.*

- 58 Tallos y límbos lampiños; límbos orbiculares, subpeltados, apestañados ..... 58. *P. Guayaquilensis.*
- Tallos y límbos hirtos; límbos suborbiculares, 3-5-nervios ..... 59. *P. Metapalcoensis.*
- 59 Limb. peninervios ..... 60
- Limb.  $\alpha$ -(7)-plinervios; amentos terminales ..... 65
- Limb.  $\alpha$ -nervios ..... 66
- 60 Tallos endeble, rastreros ó sarmentosos; amentos geminados, doble más largos que los límbos ..... 60. *P. distachya.*
- Tallos robustos, erguidos ó ascendentes ..... 61
- 61 Limb. oblongo-lanceolados, cuspídos, 3-4 veces más largos que anchos ..... 61. *P. lancifolia.*
- Limbos de otra forma ..... 62
- 62 Limb. rómbeo-elípticos, puntiagudos de ambos lados ..... 63
- Limb. obtusos ó escotados en el ápice ..... 64
- 63 Nervio I pinado en las  $\frac{2}{3}$  partes inferiores; amento I terminal ..... 62. *P. pyrifolia.*
- Nervio I todo pinado; amentos geminados en el ápice de un ramo afilo ..... 63. *P. Durandi.*
- 64 Limb. oblongo-espatulados, escotados; amentos solitarios ó geminados ..... 64. *P. emarginata.*
- Limb. trasovados, obtusos ó escotados; amentos terminales ..... 65. *P. magnoliaefolia.*
- 65 Limbos subsésiles, oblongo-elípticos, acuminados, agudos en la base, 6-7 cm. largos ..... 66. *P. elongata.*
- Limb. peciolados, orbicular-aovados, acorazonados, 3-4 cm. largos ..... 67. *P. Pululahuana.*
- 66 Limb. escotados ó acorazonados, en la base ..... 67
- Limb. angostados en la base ..... 70
- 67 Limb. suborbicular-aovados, escotados en la base ..... 68
- Limb. aovado-acuminados, acorazonados, apestañados, inferiom. blanquecinos ..... 69
- 68 Amento I en el ápice de un ramo axilar ú opositifolio, pedicelos 1-bracteados ..... 68. *P. scandens.*
- Am. 2-4 en el ápice de 1 ó 2 ramos axilares, el uno terminal, el otro axilar ..... 69. *maior.*
- 69 Limb. ligeram. peltados, 7-nervios, lampiños, salvo en la base ..... 70. *P. stelechóphila.*
- Limb. no peltados, 1-nervios, pubescente en el envés ..... 71. *P. flavescens.*
- 70 Limb. 7-nervios, trasovados ó lanceolados, acuñados en el ápice ..... 72. *emarginulata.*
- Limb. 5-nervios, elíptico-ó aovado-acuminados, agudos en la base ..... 73. *P. silvestris.*

## (HOJAS OPUESTAS)

- 71 *Hojas* todas opuestas ..... 71  
 — *Hojas* opuestas, ó las de los ramos floríferos alternas ..... 74. *P. anomala*.  
 72 *Limb.*  $\pm$  5-plinervios, y tallos lampiños ..... 72\*  
 — *Limbos*  $\alpha$ -(3-5)-nervios ..... 73  
 72\* *Tallos* rollizos; *limbos* orbicular-reniformes ..... 75. *P. Pichinchae*.  
 — *Tallos* cuadrangulares; *limbos* rómbicos ó romboídeos ..... 76. *P. tetraqueta*.  
 73 *Limb.* 8-15 mm. largos ..... 74  
 — *Limb.* 2-5 cm. largos ..... 75  
 74 *Planta* muy lampiña; *pecíolos* = á los *limbos*; *amentos* terminales ..... 77. *P. petiolata*.  
 — *Planta* setuloso-pelosa; *pecíolos* =  $\frac{1}{4}$  de los *limbos*; *amentos* axilares ..... 78. *P. petraea*.  
 75 *Ament.* terminales solitarios; *limb.* lancolados, 3 nervios ..... 79. *P. Consoquitlana*.  
 — *Ament.* axilares solitarios; *limb.* elípticos, 5-nervios,  $\pm$  pubescentes ..... 80. *P. ciliata*,  
 — *Ament.* axilares y terminales ..... 76  
 76 *Tallos* y *limbos*  $\pm$  pelosos ..... 77  
 — *Tallos* barbados en los nudos; *limbos* pubescentes en los nervios y en el margen ..... 81. *Fernandeziana*.  
 77 *Limb.* casi redondos, algo acorazonados. 82. *P. rotundata*.  
 — *Limb.* elípticos ó trasovados ..... 83. *P. fruticetorum*.

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

## (HOJAS VERTICILADAS)

- 78 *Ament.* axilares, solitarios; *tallos* rastreros; *limb.* 4-ternos, suborbicular-trasovados ..... 84. *P. peepuloides*.  
 — *Ament.* terminales ó finalm. laterales, solitarios ..... 79  
 — *Ament.* axilares y terminales, verticilados ..... 90  
 79 *Limb.* 5-10 mm. largos ..... 80  
 — *Limb.* más de 10 mm. largos ..... 84  
 80 *Tallos* estériles rastreros, filiformes, con hojas opuestas, los fértiles con hojas verticiladas, setuloso-hispida en el haz ..... 81  
 — *Tallos* erguidos ó radicantes en los nudos; *hojas* todas verticiladas ..... 82  
 81 *Hojas* (de los tallos fértiles) 4-6-nas; *limbos* oblongo-elípticos, 1-nervios ..... 85. *P. caespitosa*.  
 — *Hojas* (de id.) 4-5-nas, linear-elípticas, 3-nervias ..... 86. *P. linearis*.

82 Limb. (y tallo) lampiños ó muy breve y finamente pubescentes, 1-nervios .....	83
— Limb. 4-5-nos, 1-3-nervios, pubescentes en el haz, tomentosos en el envés .....	87. <i>chrysotrichia</i> .
83 Limb. 4-nos, oblongo-elípticos, lampiños, apestañados .....	88. <i>P. aphylla</i> .
83 Limb. 4-5-nos, oblongo-ovados, finamente pubescentes .....	89. <i>P. microphylla</i> .
84 Limb. 10-15 mm. largos; tallos radicantes en los nudos. 2-3-cótomas .....	85
— Limb. 2-4 cm. largos; tallos ± erguidos .....	88
85 Limb. trasovado-acuñados, profundamente escotados en el ápice; tallos y ramos bifurcados ..	90. <i>P. quadrifolia</i> .
— Limb. y tallos diferentes .....	86
86 Limb. oblongo-rómbeos, obtusos, lampiños, coloreados en el envés .....	91. <i>P. rubioides</i> .
— No .....	87
87 Limb. 3-4-nos, suborbiculares ó trasovados, pubérulos en el envés; ramos (en los nudos) y pedúnculos hirtos .....	92. <i>P. reflexa</i> .
— Limb. 4-nos trasovado-elípticos, lampiños de ambos lados, así como los ramos y los pedúnculos .....	93. <i>P. Loxensis</i> .
88 Tallos endebles, prostrados ó péndulos; limbos 4-5-nos, rómbeo-elípticos, subpeninervios .....	94. <i>P. Millei</i> .
— Tallos robustos, erguidos; limbos 3-6-nos, coriáceos tri-nervios .....	95. <i>P. Congona</i> .
— Tallos robustos erguidos; limbos ± trasovados .....	89
89 Limb. membranáceos, trasovados, mucho más cortos que los entrenudos; amentos laxifloros .....	96. <i>P. melanosticta</i> .
— Limb. coriáceos, angostamente trasovado-acuñados, = ó poco menores que los entrenudos; amentos densifloros .....	97. <i>P. inaequalifolia</i> .
90 Limb. 5-12 mm. largos .....	91
— Limb. 1½-6 cm. largos .....	93
91 Limb. 4-nos, obtusos .....	92
— Limb. 3-4-nos ú opuestos, ovoido-oblongos, 5-6 mm. largos .....	98. <i>P. Galapagensis</i> .
— Limb. 5-6-nos, linear-elípticos, 3-nervios, 5-7 mm. largos .....	99. <i>P. párvula</i> .
92 Limb. suborbicular-trasovados, lampiños ó finam. pubescentes, 10-12 mm. largos .....	100. <i>P. Kunthiana</i> .
— Limb. trasovados, finamente tomentosos, 5-6 mm. largos .....	101. <i>P. Corazonícola</i> .
93 Limb. opuestos ó ternados ó 4-nos .....	94

- 93 *Limb.* 4-6-nos.....  
 94 *Limb.* 1-nervios, pubérulos, 15-18 mm. largos, 6.7 mm.  
     anchos..... 102. *P. flagelliformis.*  
 — *Limb.* mayores, plurinervios, lampiños..... 95  
 95 *Limb.* rómbeo-lanceolados, 3-5-nervios, 5-6 cm. largos.....  
 — *Limb.* elíptico-rómbeos, 5-nervios, 3-5  $\frac{1}{2}$  cm. largos..... 103. *P. Victoriana.*  
 — *Limb.* lanceolados, 5-nervios, pubescentes en los nervios..... 104. *P. blanda.*  
 96 *Limb.* linear-lanceolados, 1-3-nervios, lampiños.....  
 — *Limb.* lanceolados, 5-nervios, pubescentes en los nervios..... 105. *P. galiooides.*  
 — *Limb.* lanceolados, 5-nervios, pubescentes en los nervios..... 106. *P. lanceolata.*

(Continuará).



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL