



Anales de la Universidad Central del Ecuador

CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO



POR EL R. P. L. SODIRO S. J.

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

PIPERACEAE ENDLICHER

Florcs nionoclini, raro diclini. perianthium nullum; stamina 2-6, (raro 5-∞) hypogyna, filamentis liberis aut rarius basi ovario adnatis: antherae terminales, erectae, in filamento saepe articulatae, loculis 2 distinctis, v. in unum confluentibus, longitudinaliter dehiscentibus, ovarium sessile, vel rarius stipitatum (in generibus nostris) 1-loculare, 1-ovulatum, obtusum v. stylo conico aut elongato 2-5-fido rostratum; stigmata 2-5 (saepius 3-4). vel 1 sessile, Fructus parvus indehiscens, baccatus v. fe- re siccus, semen parvum, globosum albuminosum, embryo minimus; radicula supera; cotyledonibus brevibus.

Flores moclinas, raras veces diciinas, desnudas; sostenidas por brácteas escamiformes; *estambres* 2-6, hipoginos, con los filamentos libres, las anteras 2-4-loculares, 2-4-valves, con dehiscencia longitudinal; *ovario* único, 1-locular-monospermo, sésil ó brevemente, estipitado ó inmerso en la raquis; *estilo* 1 entero ó 2-3-fido, con frecuencia nulo; *estigma* uno ó tantos como las divisiones del estilo ó, faltando éste, sésil entero ó apincelado, colocado en ó hacia el ápice de los carpelos; *óvulo* solitario, ortotropo; *fruto* baya ó núcula, ya estipitada, ya sésil, ya inmersa en la raquis; *semilla* albuminosa; *albúmen* copioso, amiláceo, endurecido exteriormente; *embrión* muy pequeño, anidado en el ápice del albúmen; *radícula* súpera; *cotiledones* pequeños, poco distintos.

CLAVE

DE LOS GENEROS ECUATORIANOS

- 
- Estambres* 2-6; *estigmas* 3-4 (raro 2 ó 5)—*Arbustos*, *raro árboles* 1. *Piper*.
Estambres 2; *estigma* 1. terminal ó lateral.—*Hierbas* comúnmente *suculentas* 2. *Peperomia*.

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL


G. I. PIPER L.

Flores monoclini [raro diciini], in amenta cylindrica [in una specie globuliformia] dense conferti, bractea squamiformi suffulti. *perianthium* nullum; *stamina* 2-4 [raro 5-∞] filamentis brevibus, v. rarius bracteam + excedentibus; antheris plerumque brevibus, ovatis, 2-locularibus, longitudinaliter dehiscentibus; *ovarium* unicum, per anthesin sessile v. substipitatum, ápice obtusum vel stylo conico aut elongato rostratum, stigmatibus 2-5 erectis vel recurvis coronatum, *bacca* ovoidea v. globosa, interdum 3-4-angulata, sessilis v. rarius + stipitata. *pericarpio* succulento v. tenuiter carnoso.

Flores monoclinas ó declinas, dispuestas en amentos densos cilíndricos (en una especie globuliformes), solitarias en la axila de una bráctea escamiforme; periancio 0; estambres 2-4, raro 5-∞; filamentos libres, breves ó más largos que las brácteas; anteras aovadas ó alargadas, con los lóculos paralelos distintos, descentes longitudinalmente, ó confluentes en uno terminal bivalve; ovario sésil ó estipitado, obtuso ó angostado en el estilo; estilo 2-5-fido con los ramos estigmatosos erguidos ó divergentes; óvulo único ortotropo; fruto baya ovoidea ó globulosa ó 3-4-angulosa, lisa, libre ó + inmersa en las brácteas ó en la raquis, sésil ó pedicelada; pericarpio suculento ó tenuemente carnoso; semilla conforme, con testa tenué; albúmen y embrión ut supra.

Frúticos con frecuencia trepadores, raras veces árboles pequeños, con tallos y ramos nudosos; nudos abultados, articulados; hojas alternas enteras, con frecuencia acorazonadas en la base; peninervias ó ∞-nervias, pecioladas; estípulas adheridas al pecíolo ó entre sí en una opuesta á las hojas; amentos (ó espigas) muy densos, originariamente terminales, finalmente (por ulterior prolongación del eje folífero) opositifolios, brevem. pendunculados; raro axilares, sésiles ó subsésiles, solitarios ó 2-3-nados ó umbelados en el ápice de un eje axilar.

Plantas propias de la zona tropical y subtropical de ambos hemisferios. En el Ecuador abundan desde el nivel del mar hasta 2.000 metros. Más arriba disminuyen rápidamente, así que apenas unas pocas (3-4) especies ocurren sobre el nivel de 3.000 metros.


ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL
QUITO
FUNDADA EN 1851

CLAVE DE LAS ESPECIES

1 Amentos opositifolios, solitarios.....	2
— Amentos axilares, solitarios ó agregados.....	57
2 Flores monoclinas.....	3
— Flores todas declinas ó las inferiores (en el amento) monoclinas, las superiores declinas.....	56
3 Estambres 4 (in nº 6 3?).....	4
— Estambres 3 ó 2.....	45
4 Ovario estilífero en el ápice.....	5
— Estilos 0, (estigmas sésiles).....	9
5 Ramos y hojas lampiños.....	1. <i>P. phytolaccaefolium</i> .
— Ramos y hojas + pelosos.....	6
6 Pedúnculos iguales ó más cortos que los pecíolos; limbos planos.....	7
— Pedúnc. más largos que los pecíolos; limbos rugosos.....	8

7	Limbos aovados, obtusos en la base ...	2. <i>P. rufescens</i> .
—	Limbos oblongo-lanceolados, desiguales y acorazonados en la base	3 <i>P. verbascifolium</i> .
8	Pediúnculos más cortos que los amentos 4. <i>P. hylebates</i> .	
—	Pediúnculos + =á los amentos.....	5 <i>Fraseri</i> .
—	Pediúnculos más largos que los amentos.....	6. <i>P. appendiculatum</i> .
9	Baya tetrágona, ó casi tetrágona.....	10
—	Baya obpiramidal-trígona ó trasovada.....	41
10	Bráctea peltada ó truncada en el ápice, comunmente angostada hacia la base.....	11
—	Bráctea no peltada ni angostada hacia la base.....	31
11	Limbos peninervios.....	12
—	Limbos ∞ -plinervios.....	29
12	Nervio I (primario ó central) dividido en II (secundarios) en casi toda su longitud.....	13
—	Nervio I dividido en II sólo en parte de su longitud.....	16
13	Limbos y ramos lampiños.....	14
—	Limbos (y ramos) + densamente pelosos.....	15
14	Limbos elíptico-oblongos, muy desiguales en la base	
— 7. <i>P. tuberculatum</i> .	
—	Limbos aovados casi iguales en la base 8. <i>P. augustum</i> .	
15	Limbos rugosos, escabros, doble más largos que los amentos.....	9. <i>P. Andrcanum</i> .
—	Limbos planos no escabros, 3 ó más veces más largos que los amentos.....	10. <i>P. brevispica</i> .
16	Pecíolos envainados ó alados sólo en la base.....	17
—	Pecíolos alados ^{ultra} la mitad.....	27
17	Limbos escabros en la página superior ó en entradas	18
—	Limbos lisos (no escabros) + iguales en la base.....	23
18	Limbos escabros de ambos lados.....	19
—	Limbos escabros y rugosos en la parte superior, pubescentes en la inferior.....	21
19	Amentos rectos; pediúnculos + iguales á los pecíolos	
— 11. <i>P. hirsutum</i> .	
—	Amentos + encorvados pediúnculos 2-4 veces más largos que los pecíolos.....	20
20	Limbos ligeramente acorazonados; pediúnculos 3-4 veces más largos que los pecíolos.....	12. <i>P. aduncum</i> .
—	Limbos profundamente acorazonados; pediúnculos doble más largos que los pecíolos....	13. <i>P. angustifolium</i> .
21	Amentos maduros casi=á los limbos.....	
—	Amentos mitad más cortos que los limbos.....	
— 14. <i>P. trachyphyllum</i> .	
22	Limbos iguales en la base; pediúnculos más largos que los pecíolos.....	15. <i>P. crocatum</i> .

— Limbos + desiguales en la base; pedúnculo igual al pecíolo.....	16. <i>P. Bredemeyeri.</i>
23 Limbos + pubescentes ó tomentosos.....	24
— Limbos lampiños ó pubescentes en los nervios.....	20
24 Limbos casi iguales en la base, finam. pubescentes en el haz; nervios II 7 de cada lado.....	17. <i>P. Sodiroi.</i>
— Limbos + desiguales y redondeados en la base; nervios II 4-5 de cada lado.....	25
25 Limbos planos, membranáceos densa y finam. hirsutos de ambos lados.....	18. <i>P. molliusculum.</i>
— Limbos areolado-rugosos, coriáceos hirto-tomentosos en la pág. inferior.....	19. <i>P. Miersinum.</i>
26 Limbos lampiños, mucho más largos que los amentos.....	20. <i>P. peruvianum.</i>
— Limbos pubescentes en los nervios en la cara inferior, poco más largos que los amentos.....	21. <i>P. durirameum.</i>
27 Pecíolos angostamente alados, más cortos que los pedúnculos; limbos iguales ó más largos que los amentos.....	22. <i>P. pseudo-Churumuyu.</i>
— Pecíolos anchamente alados, limbos desiguales en la base.....	28
28 Limbos oblongo-aovados, inferiormente hirsutos; amentos crasos, = ó poco más largos que los limbos.....	23. <i>P. lunulibracteatum.</i>
— Limbos aovados, acorazonados ^{mitad} lampiños de ambos lados; amentos tenues mucho más largos que los limbos.....	24. <i>P. hylophilum.</i>
29 Pecíolo todo alado, 3-4 veces más largo que el pedúnculo, limbos muy desiguales en la base.....	35. <i>P. pseudo-nobile</i>
— Pecíolo alado en la mitad inferior, igual ó doble más largo que el pedúnculo.....	30
30 Pecíolo doble más largo que el pedúnculo; amento más largo que el limbo.....	26. <i>P. subglabribracteatum.</i>
— Pecíolo poco más largo que el pedúnculo; amento casi igual al limbo.....	27. <i>P. Guayanum.</i>
31 Limbos peninervios, inferiormente lustrosos; pecíolo mitad más corto que el pedúnculo.....	28. <i>P. silvarium.</i>
— Limbos multiplinervios.....	32
32 Limbos 8-10 cm. largos, aovados, planos, más largos ó = á los amentos.....	20. <i>P. atrorameum.</i>
— Limbos mayores, profundamente acorazonados	33
33 Ramos y limbos hirsutos; amentos 8-12 cm. largos	30. <i>P. longepilosum.</i>
— Ramos y limbos lampiños ó pubescentes; amentos mayores péndulos.....	34

34	<i>Limbos oblongo-lanceolados ó trasovados</i>	35
—	<i>Limbos aovados ó oval-lanceolados</i>	36
35	<i>Limbos oblongo-lanceolados, abollado-rugosos, inferiormente hirsutos</i> 31. <i>P. Hydrolapathum</i> .	
—	<i>Limbos trasovados, + lampiños</i> 32. <i>P. regale</i> .	
36	<i>Limbos aovados, poco más largos que anchos</i> 37	
—	<i>Limbos oval-lanceolados, $\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$ más largos que anchos</i> 39	
37	<i>Limbos coriáceos, abollados, ligeramente acorazonados; lóbulos basales divergentes</i> 33. <i>P. bullatifolium</i> .	
—	<i>Limbos membranáceos, casi planos, profundamente acorazonados</i> 38	
38	<i>Peciolo todo alado; limbo aovado</i> 34. <i>P. Boissierianum</i>	
—	<i>Peciolo alado hasta la mitad; limbo suborbicular-aovado</i> 35. <i>P. squamulosum</i> .	
39	<i>Peciolo 12-15 cm. largo, alado hasta la mitad, lóbulos basales divergentes</i> 36. <i>P. Umbraculum</i> .	
—	<i>Peciolo 6-8 cm. largo, todo alado, lóbulos basales convergentes</i> 40	
40	<i>Amentos = ó más largos que los límbos</i> 37. <i>P. subtropicum</i>	
—	<i>Amentos mitad más cortos que los límbos</i> 40*	
40*	<i>Límbos fuliginoso-hirtos; am. crasos</i> 38. <i>P. fuliginosum</i> .	
—	<i>Límbos casi lampiños; amentos tenuis</i> 38*. <i>P. platylobum</i>	
41	<i>Bráctea peltada ó truncado-peltada, angostada hacia la base</i> 42	
—	<i>Bráctea cúculiforme; límbos ásperos en la página superior, pubescientes en la inferior</i> 39. <i>P. tumidum</i>	
42	<i>Límbos peninervios, rugosos, pecíolo corto</i> 43	
—	<i>Límbos multiplinervios</i> 44	
43	<i>Límbos lampiños, superiormente escabros, inferiormente pubescentes; amentos rectos</i> 40. <i>P. lineatum</i> .	
—	<i>Límbos lisos, rugulosos, inferiormente, sedoso-pelosos; amentos + falciformes</i> 41. <i>P. lanceaeifolium</i> .	
44	<i>Límbos obtusos en la base, lampiños; nervios de la página inferior apestañados en el margen</i> 42. <i>P. barbatum</i> .	
—	<i>Límbos acorazonados, cano-pubescentes</i> 43. <i>P. andicolum</i> .	
45	<i>Estambres 3; estigmas sésiles</i> 46	
—	<i>Estambres 2, laterales, ó 3 (siendo 1. postico) ovario estílifero</i> 55	
46	<i>Bráctea peltada ó truncado-peltada, angostada hacia la base</i> 47	
—	<i>Bráctea no peltada ni angostada; límbos lampiños, lisos, subcoriáceos</i> 53	
47	<i>Límbos peninervios, acuminados</i> 48	

- Limbos ∞ -nervios (11), profundamente acorazonados algo más largos que los amentos 44. *P. pseudomarginatum*.
- 48 Limbos muy lampiños, elípticos puntiagudos en la base .. 49
- Limbos aovados, \pm acorazonados 51
- 49 Peciolas doble más largos que los pedúnculos; limbos asimétricos 45. *P. asymmetricum*.
- Peciolas más cortos ó casi iguales á los pedúnculos.
- 50 Peciolas más cortos que los pedúnculos; limbos desiguales y obtusos en la base, nervios II 3-4 de cada lado 46 *P. alpinum*.
- Peciolas \pm iguales á los pedúnculos; limbos puntiagudos, casi desiguales en la base 52
- 51 Limbos peninervios casi hasta el ápice; peciolos vaginados en la base 47. *P. Cascajalanum*.
- Limbos peninervios en las dos terceras partes; peciolos vaginados ultra la base 48. *P. substenocarpum*.
- 52 Limbos subsésiles, escabros; amentos y pedúnculos breves 49. *P. brachypodium*.
- Limbos largamente peciolados, lisos; amentos 10-12 cm. largos 50. *P. Pittieri*.
- 53 Limbos elíptico-lanceolados, puntiagudos en la base, 3-nervios en la mitad inferior, iguales ó más cortos que los amentos 51. *P. pallidirameum*.
- Limbos oval-elípticos, más largos que los amentos.
- 54 Limbos acorazonados en la base 52. *P. Carpunya*.
- Limbos obtusos ó puntiagudos en la base 53. *P. glabrirameum*.
- 55 Estigmas 3; amento cilíndrico, I cm. largo 54. *P. Quitense*.
- Estigmas 2; amento globuliforme 55. *P. piluliferum*.
- 56 Ovario (en las flores monoclinas) estilífero; limbos aovados elípticos, planos 56. *P. subulatum*.
- Estigmas sésiles; limbos rugosos 57. *P. bullosum*.
- 57 Estigmas estipitados; pedúnculo solitario; limbos trasovados, ligeramente acorazonados 58. *P. filistylum*.
- Estigmas sésiles 58
- 58 Limbos no peltados, acorazonado-reniformes; pedúnculos 2-3 en cada axila 59. *P. umbellatum*.
- Limbos peltados 59
- 59 Limbos ligeramente peltados, pedúnculos solitarios; amentos ternados 60. *P. Cuernavacanum*.
- Limbos altamente peltados, pedúnculos 1-3 en cada axila, amentos 1-7 en cada pedúnculo 61. *P. peltatum*.

I. *P. phytolaccaefolium*. *Opiz frutex v. arbuscula*, ramorum iuniorum cortice livido-virente, albo- maculato;

*foliis breviter petiolatis, ovato oblongis, utrinque atte-
nuatis, latitudine sua subdupo longioribus, glabris, den-
se membranaceis, utrinque nigro-punctulatis; petiolis
canaliculatis glabris; pedunculis oppositifoliis, suberec-
tis, glabris, petiolum aequantibus v. parum superantibus;
amentis cylindricis obtusis, folio triplo brevioribus; bractea
peltata, pelta triangulari-lunulata, ovario stylo brevi bre-
viterque 3-fido apiculato; baccā obovata angulata, late-
raliter compressa.*

*Opiz, Reliq. Haenk. fascic. 3. p. 151. apud DC.
Prdr. XVI. I. p. 369. Artanhe phytolaccae folia Miq.
Syst. p. 543. Peltobryon phytolaccae folium Presl. epim.
p. 229.*

Arbusto 2-3 metros alto, á veces arborescente; ramos numerosos, los jóvenes lívido-verdes con manchas blanquizcas; hojas densas, persistentes; peciolos 8-11 mm. largos, marginados, lampiños; limbos ovado-oblongos, acuñados en la base, acuminados y mucronados en el ápice, 10-15 cm. largos, 4-6 cm. anchos, membranáceos, esparcidos de puntos negros glanduliformes en ambas páginas, apestañados en el margen, por lo demás lampiños, peninervios hasta la $\frac{1}{3}$ parte superior; pedúnculo opositifolio, erguido, igual ó poco más largo que el pecíolo; amentos cilíndricos, obtusos, 2 $\frac{1}{2}$ -3 cm. largos, 6-8 mm. gruesos; bráctea peltada, triangular-lunulada, glandulosa; ovario apiculado por el estilo breve y brevemente trifido; baya trasovada, angulosa comprimida lateralmente.

LA HISTÓRICA
Crecé cerca de Guayaquil (HAENKE) y de Bodegas y en los valles de Mindo y de Pallatanga hasta 2.000 metros. Colectada también en los bosques de Pangoa por el SR. R. RIOFRÍO.

2. P. rufescens. C. DC. frutex 3-5 metralis; ramis pulverulento-pubescentibus v. tomentosis, rufescensibus, demum glabrescentibus; petiolis 1-2 cm. longis, marginatis, hispidis v. tomentosis; limbis ovato-acuminatis, + asymmetricis, basi inaequali subtruncatis, dense membranaceis, pellucido-punctatis, supra glabris aut glabrescentibus, subtus ad nervos pubescentibus v. ut petioli pedunculique, dense molliterque rufescenti-tomentosis; nervo medio ad $\frac{1}{3}$ usque partem in nervos laterales utrinque 4-5 diviso, quorum 2 superiores ad limbi apicem ducti; pedunculis oppositifoliis, brevibus; amentis teretibus elongatis, apice acutis; bractea apice triangulari rufo-pubescente; baccā stylifera subrotunda, lateraliter compressa; stigmatibus 3, brevibus, recurvatis.

C. DC. In Durand et Pitt. Primit. fasc. I, p. 218.
et Piperaceae Sodiroan. in Bullet. de l' Herbier Boissier,
Vol. vi. p. 479.

Arbusto multicaule, muy ramoso, 2-5m. alto; ramos rollizos, pulverulento-tomentosos ó pubescentes rojizos, finalmente alampiñados; pecíolos 1-2 cm. largos, marginados, ± hispidos ó tomentosos; limbos aovado-acuminados, desiguales en la base, algo asimétricos, 15-25 cm. largos, 8-15 cm. anchos en la 1/5 parte inferior; rígidamente membranáceos, pelúcido-punteados lampiños en el haz, (salvo en los nervios) pubescentes en el envés, ó breve densa y blandamente pubescentes, rojizos en la página inferior; nervio I dividido hasta la $\frac{1}{3}$ parte inferior en 4-5 II de cada lado, hundidos en página superior, los 2 superiores terminados en la punta del limbo; pedúnculos opositifolios, 5-12 mm. largos, cilíndricos; amentos rectos, cilíndricos 10-15 cm. largos, apenas 5. mm. gruesos, puntiagudos en el ápice; bráctea peltada, subtriangular en el ápice, rojizo-pubescente; baya estilifera casi redonda, comprimida lateralmente, muriculada; estigmas breves recorvados.

Crece en la región subtropical y subandina entre 1.200 2.000 m., en las pendientes occidentales del volcán *Pululahua* cerca de *Niebla*, del *Pichincha* en los bosques de *Gualea* y del *Chimborazo* en el valle de *Pallatanga*.

De esta especie ocurren dos formas bien distintas; la una casi lampiña, con limbos más largos y estrechos, desiguales en la base, sensiblemente asimétricos, pecíolos, pedúnculos y amentos más largos etc.—La otra, (que suponemos ser la descrita por el Sr. DC., cuya descripción ignoramos) con los ramos, pecíolos, limbos (inferiormente) y pedúnculos ocráceo-tomentosos; limbos anchamente aovados, relativamente más cortos y más anchos, iguales en la base y poco sensiblemente asimétricos; pecíolos y pedúnculos más cortos y amentos más largos.

3. P. verbascifolium C. DC. foliis brevissime petiolatis oblongis v. oblong-lanceolatis, basi valde inaequali auriculatim cordatis, coriaceis, pellucido-punctatis, ciliolatis flavescenti-viridibus, utrinque planis et tomentosis, nec bullatis nec scabris, nervo centrali subtus prominulo, ad medium usque longitudinis nervos utrinque 5-8, subtus prominulos subadscendentibus mittente; petiolo tomentoso, basi ima vaginante; pedunculo tomentoso, petiolum aequante; amento obtusissimo; bractea apice peltada; pelta triangulari semilunari convexa, margine hirsuta, pedicello hirtello; ovario glabro; stigmatibus linearibus.

C. DC. Prodr. XVI. I. p. 258. *Artanthc. verbascifolia*

Miquel Syst. p. 431. et A. leucophylla Miq. in Hooker Lond. journ. Bot. vol. 4. p. 457.

Ramos rollizos, pubescentes, los más tiernos gris-tomentosos; *limbos* muy brevemente (5-8 mm.) peciolados oblongos ú oblongo-lanceolados, desiguales y auriculato-acorazonados en la base con el lóbulo mayor encorvado y tendido sobre el pecíolo, coriáceos, pellúcido-punteados, gradualmente angostados hacia el ápice, 14-16 cm. largos, 5-5 ½ cm. anchos, subareolados y gris-tomentosos en la página superior, reticulato-foveolados y con tomento gris amarillento en la inferior (Miq.); *nervio* medio inferiormente algo prominente, dividido casi hasta la ½ en 5-8 secundarios de cada lado ascendentes; *pecíolo* tomentoso, envainador en la base; *pedúnculo* tomentoso, = al pecíolo; *amentos* opositifolios, erguidos, obtusos, cilíndricos, casi encorvados, 5-6 ½ cm. largos, 4-5 mm. crasos; *brácteas* peltadas en el ápice, pelta triangular-sublunular, hirsuta en el margen; *ovario* lampiños; *estigmas* (y estambres) 4. lineares.

Crece en las cercanías de Quito, colectada por JAMESON.

4. *P. hylebates* c. DC. *suffrutex metrum v. paullo altior; foliis brevissime petiolatis, ellíptico-lanceolatis, basi breviter inaequali, latere breviore acutis, longiore obtusis, apice longiuscule et acute cuspidatis, supra minute puberulis scabridisque, et basin versus ad nervum centralem villosis, subtus ad nervos venasque villosis, in pagina minute puberulis; nervo centrali fere usque ad ½ longitudinis suae nervos utrinque 6 ascendentes mittente; petiolo* dense viloso; *pedunculo* opositifolio, petiolum pluries superante, gracili, viloso; *amento* quam folii *limbus* fere triplo breviore; pedunculum superante; *bractea* oblonga, apice subacuta, dorso inferne villosa; *antheris* ovatis parvis, quam filamenta multo brevioribus; *bacca* rotundato-subtetragona, glabra quam stylus longiore.

c. DC. *Piperac. Sodiroanac. in Bullet., de l' Herbier Boiss. vi. p. 479.*

Subarbusto metro ó poco más alto, á veces trepador; *ramos* jóvenes densamente hirsutos y escabros, adultos gráciles 1-2mm. gruesos; *pecíolos* 5-8 mm. largos, setuloso-hirsutos; *limbos* 12-15 cm. largos, 4-6 cm. anchos, asimétricos, elíptico-lanceolados, algo desiguales en la base, con el lado mayor obtuso (3-4 mm. más largo) el menor agudo; cuspidados en el ápice, pubérulos, areolado-rugosos y muriculado escabros en la página superior, alveolado-reticulados, setuloso-estrigosos y escabros, especialmente en los nervios, en la inferior, membranáceos, ó casi coriáceos, densamente pelúcido-punteados; *nervio* medio dividido casi

hasta la mitad en 5-6 secundarios de cada lado; *pedúnculos opositifolios*, gráciles $2\frac{1}{2}$ -3 cm. largos, hirsutos; *amentos cilíndricos*, obtusos, (aun jóvenes) $3\frac{1}{2}$ cm. largos, 4 mm. gruesos; más largos que los pedunculos; *bráctea oblonga* casi aguda en el ápice, así como la raquis, setuloso hirsuta; *estambres 4*, anteras aovadas mucho más cortas que los filamentos; *baya subtetrágona*, lampiña; *estilo breve y brevemente trifido*.

Crece en los bosques subtropicales y subandinos en las faldas del volcán Corazón y del Atacatzo-1.300-2.000 m.

5. P. Fraseri c. DC. *suffrutex humilis* fere e basi ramosus; *foliis subsessilibus subobovato-oblongis*, basi parum inaequali cordulatis, apice longiuscule et suboblique protracto-acuminatis, supra valde bullatis puberulisque, subtus areolatis, ad nervos nervulosque valde villosis, inter nervulos brevius pilosulis, margine ciliatis; *nervo centrali* alte ultra dimidium longitudinis suae nervos tenues adscendentibus et suberectos utrinque 10-11, nervulis validis intermixtos, mittente; *petiolo* brevissimo et dense villoso; *pedúnculo* opositifolio elongato, gracili, longe villoso; *amento* pedunculum subaequante, quam folii limbus pluries breviore, non mucronato; *bracteae pelta* triangulari, margine dense et flavide villosa; *bacca* ovata, glabra.

c. cn. Prodr. loc. cit. p. 269 et. Piperac. Sodir., in Bullet. loc. cit. p. 480.

Mata 40-60 cm. alta, ramosa desde poco sobre la base, arqueado-encorvada; *ramos* breves (y hojas) patentes, dísticos, densa y largamente pelosos; *pecíolos* 2-5 mm. largos, setuloso-hirsutos; *limbos* ± 20 cm. largos, 7 cm. anchos, casi trasovado-oblongos, asimétricos, con el lado interior recto, angosto desde la $\frac{1}{3}$ parte superior hacia la base, el exterior arqueado, más ancho, obtuso y más prolongado en el pecíolo, brusca y largamente prolongados en el ápice en cúspide linear, de consistencia membranáceos, casi pelúcidos, densa y finamente pelúcido-punteados, abollado-rugosos, algo ásperos y pubescentes en la cara superior-alveolados, setulosos en los nervios y purpurascientes, cuando tiernos, en la inferior, *nervio* medio dividido hasta sobre la mitad en 10-11 secundarios de cada lado, tenuis, ascendentes; *pedúnculos* opositifolios, gráciles, setuloso-hirsutos, 5-7 cm. largos; *amento* 3-5 cm. largo, 4-5 mm. grueso; ± = á los pedúnculos *bráctea* peltada y triangular en el ápice, amarillento-villosa; *estambres 4*; *anteras* aovado-agudas; *baya* evidentemente estilifera, lampiña; *cstigmas* 3, lineares.

Crece en los bosques tropicales húmedos, entre los ríos *Toachi* y *Napa* 800-900 m.

6. *P. appendiculatum* C. DC. *foliis subsessilibus, ovali-oblongis, apice longe acuminatis, acumine obtusiusculo, basi angustatis, hinc resectis, illinc auriculato-rotundatis, pellucido-punctatis, valde bullatis, scabro-hirtellis, subtus longe ferrugineo pilosis; petiolo et pedunculo longe ferrugineo- piloso; amento quam pedunculus breviore; bractea conchaesformi, peltata, ciliato-hirta; staminibus 3, (?) filamentis exertis; ovario ovoides, glabro, apice in stylum brevem attenuato.*

C. DC. *Prodr. loc. cit. p. 369. Artanthe appendiculata* Benth. *Pl. Hartwegiana p. 254.*

Arbusto de 2-3 pies de alto, con ramos jóvenes pedúnculos, pecíolos y nervios de la página inferior de las hojas largamente ferrugineo-pelosos, limbos 16-20 cm. largos, 5-7 cm. anchos sobre la mitad, subsésiles, oboval-oblongos, largamente acuminados en el ápice, con la punta angosta algo obtusa, angostados hacia la base, con un lado recortado á 4-5 mm. del tallo, el otro auriculado-redondeado extendido hasta el tallo, consistencia membranácea, peludo-punteados, muy abollados y escabro-hirtos en la página superior, ferrugineo-pelosos en la inferior; pedúnculos 2 ½-3 ½ cm. largos; amentos + 2 cm. largos bráctea más corta que el ovario, ^{con}conoideo-peltada, apestañado-hirta; filamentos (3?) exertos; ovario aovado, lampiño, prolongado en el estilo breve, trifido, con los ramos estigmatosos recorvados,

Crece en las pendientes occidentales del *Pichincha* en los bosques de *Nanegal*, colectado por HARTWEG. En nuestro concepto esta especie no difiere de la anterior.

7. *P. tuberculatum* Jacquin *foliis petiolatis, oblique ovatis, ovato-oblongis oblongisve, apice acutis v. subacuminatis, basi valde inaequali rotundatis, rarissime subcordatis, latere maiore cum petiolo fere omnino vel dimidio adnato, utrinque glabris v. subtus ad nervos subtiliter puberulis, saepe subtus fusco- vel nigro-punctulatis; nervo centrali subtus prominulo, utrinque tota longitudine nervos 8-10, subtus subprominulos, subpatulos, nervulis fortioribus intermixtos mittente; petiolo glabro v. dorso subtilissime hirtello, ad limbi latus minus usque vaginante, alis linearibus angustis; pedunculo petiolum subaequante, glabro v. subtiliter puberulo; amento folium aequante vel superante, bracteae pelta triangulari-subrhomboideali, margine hirsuto, pedicello lato, subcu-*

cullato; *bacca* glabra lateraliter compressa.

Apud. c. DC. Prodr. loc. cit. p. 265. Steffensia tuberculata Kth, in Linn v. 13, p. 614; Artanthe tuberculata Miq. Syst. p. 497.

Arbusto, á veces arborescente; *ramos* rollizos verrugosos y escabros, los tiernos pubescentes; *limbos* peciolados 12-14 cm. largos, 4-6 cm. anchos oblicuamente aovados ó aovado-oblongos, ú oblongos, puntiagudos ó acuminados en el ápice. muy desiguales en la base, con ambos lados redondeados, el exterior 1 1 ½ cm. más largo que el interior, y casi todo adherido al pecíolo, rígidamente membranáceos, lampiños de ambos lados ó *pubérulos* en el inferior y en los nervios, no ó muy finamente pelucido-punteados; *nervio* I prominente en el dorso, dividido en toda su extensión en 8-10 II de cada lado, alternos ascendentes, alternados con otros bastante robustos y anastomosados entre sí por venas también prominentes; *peciolos* 3-5 mm. largos, envainadores hasta la base del lóbulo menor del limbo, lampiños ó pubérulos; *pedúnculos* opositifolios, gráciles, 2 2 ½ cm. largos, *amentos* rectos, cilíndricos; 8-10 cm. largos; 2-3 mm. gruesos; *bractea* pedicelada peltada, con la pelta discoídeo-triangular ó casi romboidal, apestañada con pelos finos *densos*, amarillentos, el pedícelo ancho cúculiforme; *ovario* subgloboso, lampiño; *estigmas* 3, obtusos pubérulos; *baya* subtetrágona, comprimida lateralmente, lampiña.

Crece en la región tropical, cerca *Guayaquil*, *Bodegas*, *Puente de Chimbo* &c. Colectada también por el SR. V. ORTONEDA.

8. *P. augustum* Rudge *frutex* bi-trimetalis; *foliis* breviter petiolatis, magnis, ovato-oblongis, apice breviter acutis, basi breviter inaequali acutis, utrinque, praesertim subtus, punctulatis; *nervo centrali* tota longitudo nervos patulo-subadscendentibus utrinque circiter 13, nervulis validioribus intermixtos, mittente; *pedunculo* scabriusculo petiolum paullo superante; *amento* quam folium triplo breviore; *bracteac pelta triangulari*, margine hirsuta; *stamina* 4; *bacca* obovata tetragona.

Rudge, apud DC. *Prodr. loc. cit. p. 309, et. c. DC. in Piperac. Sodir. Bulletin loc. cit. p. 482.*

b. *magnifolium*. c. DC. *foliis* quam in specie maioribus; *limbis* ad 45 cm. longis, 26 cm. latis-*bacca* matura valde succulenta. c. DC. *Pip. Sodir. loc. cit.*

Arbusto 2-3 m. alto, multicaule, densamente folioso; *ramos* gruesos jugosos, de color verde-lívido, los nudos muy abultados; *pecíolo* 1 ½-2 ½ cm. largo, aplastado por el dorso, marginado;

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

AREA HISTÓRICA

limbos 30-35 cm. largos, 18-20 cm. anchos, aovados, inequiláteros, puntiagudos en el ápice, algo desigualmente prolongados en la base, densamente membranáceos, y (mientras vivos) jugosos lampiños, intensamente verdes y algo pruinoso en la cara superior, pálidos en la inferior, finamente pelúcido-punteados (cuando secos), peninervios en casi toda su extensión; nervio medio robusto, prominente inferiormente; los laterales patente-ascendentes, ± paralelos, los medios distantes 2 cm. uno de otro, los superiores siempre más apartados; pedínculos opositifolios, 1½-2½ cm. largos; amentos 12-15 cm. largos, 12-15 mm. gruesos; bráctea peltada, triangular-semilunada; baya trasovada sub-tétragona aplastada lateralmente.

b. *magnifolium* hojas mayores que en la forma típica; limbos hasta 45 cm. largos, 20 cm. anchos; baya madura [y raquis] muy suculenta lampiña.

Especie hermosa y muy adecuada como planta de adorno por su lindo follaje.

Crece en los bosques tropicales de Santo Domingo y en la provincia del Guayas cerca de Puente de Chimbo.

9. P. *Andreamum frutex* sarmentosus, saepe scandens; foliis breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, basi leviter inaequali acutis, apice acute acuminatis, supra bullatis et scabride hirtellis, subtus adpresso molliterque pilosis; nervo centrali fere e tota longitudine nervulos utrinque circiter 12. subtus prominulos mittente; petiolo dense hirsuto, basi ima vaginante; pedunculo oppositifolio, dense hirsuto, petiolum subaequante; amentis quam folia subdupo brevioribus; bracteae pelta triangulari, margine dense et pallide villosa.

b. *parvifolium* Id. foliis brevissime petiolatis, lanceolatis, utrinque dense molliterque [subtus flavide] pilosis, dein supra rugulosis; nervo centrali fere tota longitudine nervulos suberecto-adscendentes utrinque 8-10 mittente; petiolo pedunculoque subaequifolius, cum ramulis dense et flavide villosis; bracteae pelta pedicelloque claviformi hirsutis; filamentis fere ad medium ovarii insertis; bacca glabra rotundato-subtetragona, apice breviter apiculata.

c. DC. in Journ. Morot v. IV p. 397 et Piperac. Sodir., in Bulletin de l' Herbier Boiss. loc. cit. p. 697.

Arbusto sarmentoso, con ramos largos, con frecuencia trepador en los troncos de los árboles, los tiernos amarillento-pelosos; limbos breves, peciolados, coriáceos [secos] opacos, oval-ó oblongo-lanceolados, hasta 13 cm. largos, 5 cm. anchos, algo asi-

métricos, levemente desiguales y puntiagudos en la base, pálido-blancuecinos, abollados y escabro-hirtos en la página superior, amarillentos y cubiertos de pelos blandos, aplicados al limbo en la inferior; *nervio central* dividido en casi toda su longitud en nervios sucundarios \pm 12 de cada lado, algo prominentes en el envés; *pecíolo* 6-7 mm. largo, densamente hirsuto, envainador en la base; *pedúnculo opositifolio*, tan largo [é igualmente hirsuto] como el pecíolo *amento cilíndrico obtuso*, doble más corto que el limbo, casi 7 mm. grueso cuando maduro; *pelta* de la bráctea sabtriangular, densa y pálidamente vellosa en el margen.

En los bosques del volcán *Pululahua* 2.900 m., colectada por E. ANDRÉ, y en las pendientes occidentales del *Pichincha* y del *Atacatzo*.

b. parvifolium. *limbos* menores muy brevemente peciolados, más angostos que en la forma típica, rugulosos [con la edad] y no escabros, densa y blandamente peloso-blancuecinos en la cara superior, amarillentos en la inferior; *nervios laterales* 8-10 de cada lado, ramos, pecíolos y pedúnculos amarillento pelosos; *escudo* y pedicellos claviforme de la bráctea hirsutos; *filamentos* insertados hacia la mitad del ovario; *baya* lampiña arredondeada subtetrágona, apiculada en el ápice.

Crece en los bosques del Chimboraço cerca de S. Pablo, y de Bilován.

10. *P. brevispica* c. DC. *frutex* 2-3 metris; *foliis* brevissime petiolatis, lanceolatis, basi parum inaequali acutis, apice acute acuminatis, supra iunioribus adpresso pilosulis, demum glabratris et ^{subscabris} subscabris, subtus dense et adpresso pilosis; *nervo centrali* fere tota longitudine nervos II suberectos adscendentibus utrinque 8-10 mittente, superiores gradatim tenuiores; *pecíolo* dense hirsuto, basi vaginante; *pedúnculo* opositifolio, \pm petiolum fere duplo superante et dense hirsuto; *amento* florente quam limbus fere quadruplo breviore; *bractae pelta* triangulare carnosa pedicelloque dense hirsutis; *ovario* ovato acuto, glabro; *antheris* rotundatis quam filamenta brevioribus, *stigmata* 3, sessilia linearia.

c. DC. *Piperac. Sodir. loc. cit. pag. 1, 81.*

Arbusto 2-3 mt. alto, con ramos gráciles alargados pulverulentos y muy brevemente setuloso-hirtos; *pecíolos* 3-5 mm largos, densamente hirsutos, envainadores en la base; *limbos* 7-9 cm. largos, oblongo elípticos, \pm inequiláteros, brevemente, acumulados, puntiagudos mucronados en el ápice, algo desiguales en la base, con el lado mayor obtuso, el menor puntiagudo, membranacos opacos, densa y finamente pelúcido punteados, muricula-

do-escabros y con pelos breves y adheridos, finalmente alampiñados en la cara superior, densa y brevemente setuloso-hirtos (especialmente en los nervios) en la inferior; *nervio* medio dividido en casi toda su extensión en 8-10 II. de cada lado, prominentes y anastomosados por retículo fino; *pedúnculos*, opositifolios, 4-6 mm. largos, brevemente hirsutos y pulverulentos; *amentos* (floríferos) 1½-2 cm. largos, 4-5 mm. gruesos, cilíndricos, obtusos; *bráctea* peltada subtriangular-discoidea hirsuta; *estambres* 4, breven exertos, anteras casi redondas; *estigmas* 3, sésiles lineares.

Crece en las pendientes subandinas del Chimborazo cerca de Sicto, entre S. Pablo y Chillancs.

II. *P. hirsutum* Swartz frutex 3-4-metralis, ramis gracibus, elongatis; foliis breviter petiolatis, inferioribus ellipticis v. lanceolatis, omnibus apice acute acuminatis, basi inaequali rotundatis obtusis v. attenuatis, lobo longiore cum peciolo adnato, membranaceo-rigidis, pellucido-punctulatis, supra verruculoso-scabris, subtus ad nervos adpresse hirtellis; *nervo* centrali ad apicem ducto, subtus prominulo, ad medium usque nervos utrinque 5-6 alternos, subadscendentibus, subtus prominulos, supremos ad apicem ductos mittente; *petiolo* hirto, ad basin vaginante; *pedunculo* oppositifolio, hirtello, petiolum aequante v. superante; *amento* maturo quam folium paulo breviore; *bracteae* pelta triangulari-semilunari, margine hirsuta; *bacca* apice glanduloso-puberula.

c. dc. *Prodr. loc. cit.* p. 276, et *Pip. Sod. loc. cit.* p. 483. *Steffensia hirsuta* et *S. scabra* Kunth.; *Artanthe hirsuta* Miq: *Syst. 446.*, *Art. asperifolia* Miq in *Mart. Flora Brasil.* p. 45. *A. Olfersiana* Id. *ibid.* p. 46. &c.

Arbusto 3-4 m. alto, con ramos gráciles y largos, angulosos (cuando secos) ± pubescentes, especialmente en los nudos y finalmente muriculado-áspberos; *limbos* brevemente peciolados, los inferiores aovado-elípticos ó elíptico-lanceolados, oblongos, los superiores elíptico-lanceolados, todos ± asimétricos, angosta y bruscamente acuminados, y mucronados en el ápice, desiguales, arredondeados ó ± obtusos ó puntiagudos en la base, con el lado mayor adherido al peciolo, 8-1 cm. largos, 5-8 cm. anchos, á veces mayores rigidamente membranáceos, pelúcido-punctulados, muriculado-scabros, ± arrugados en la página superior y con pelos cortos y aplicados en los nervios de la inferior; *nervio central* dividido ± hasta la mitad en 5-6 II de cada lado, erecto-ascendentes, casi paralelos entre sí, todos (como también las

venillas trasversales) prominentes inferiormente, los 2 superiores con el central terminados en la punta; *pecíolos* 4-8-10 mm. largos, envainados en la base, \pm pelierizados; *pedínc.* opositifolio, igual ó poco mayor que el pecíolo; *amento* recto poco más corto, á veces igual ó más largo que el limbo; *escudillo* de la bráctea triangular-semilunar, hirsuto en el margen; *baya* glandulosopubescente en el ápice.—Especie polimorfa, mas las variaciones son poco constantes é insuficientes aún para establecer *variedades* bien definidas.

Crece en la zona tropical en la provincia del *Guayas* y de *Los Ríos* cerca de "El Naranjito" (ORTONEDA) de Balao, Guayaquil, Puente de Chimbo., valle de Pallatanga; en la del *Pichincha* en la parroquia de Santo Domingo de los Colorados, y en los bosques de *Gualea*-(de 0-1.800 m. sobre el nivel del mar.)

12. *P. aduncum* L. *arbuscula* vel *frutex* 2-4 m., multicaulis, ramosissimus; *soliis* breviter petiolatis, oblongo-elipticis, apice acuminatis, acumine acuto et mucronato, basi \pm inaequali rotundatis v. cordulatis. v. latere minore acuto, rigide membranaceis, subopacis, pellucido-punctatis, supra scabris pilosulisque, subtus, praesertim ad nervos, \pm molliter pubescentibus, saepe margine ciliatis; *nervo centrali* ad $\frac{1}{2}$ longitudinis nervos II utrinque 6-7 alternos, adscendentibus, subtus prominentes, supremos ad apicem ductos, mittente; *petiolo* brevi, basi imia vaginante, utrinque hirtello: *pedunculo* oppositifolio, petiolum plus duplo superante, puberulo; *amento* \pm uncinato, mucronato quam limbus breviore; *baccae* *pelata* triangulari, margine fusce-v. aureo-hirsuta; *bacca* glabra.

C. CD. *Prodr.* XVI. 1, 285, *P. scabrum* Lam., *P. celtidifolium*. Kth. *Nov. gen.* I. p. 5 et *Steffensia adunca* Kunth., in *Linn.* 13, p. 83, *Artanthe adunca* Mig. *Com. phyt.* p. 49. &.

Continuará.