

## ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

## CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO

DE LA


## FLORA ECUATORIANA

POR EL R. P. J. SODIRO, S. J.

## PIPERACEAS ECUATORIANAS

G. 2. PEPPEROMIA. R. &amp; P.

(Continuación: v. supr. p. 214)



84.\* *P. gattulata* sp. nov. *repens*, bisurcatim ramosissima, glaberrima; *caule* tenui e nodis radicante, multi striato cum ramis basique petiolorum purpureo-maculato; *foliis* 3-5-nis longiuscule petiolatis; *limbis* obovatis, apice integris subobtusis v. obiter retusis, glaberrimis; carnosulis, parce pellúcido-punctatis, obscure pinnati-nerviis; *pedunculis* solitariis terminalibus, folia suprema aequantibus v. superantibus; *amentis* [nondum plene evolutis] quam pedunculi 2-plo-3-plove longioribus, tenuibus cylindricis, densifloris; *bracteis* magnis, orbicularibus, centro peltatis; *ovario* immerso, ovato, apice acutato; *stigmate* terminali, nigrescente, puberulo. (bacca ignota.)

*Planta* pequeña, rastrera, muy lamiña; *tallo* tendido, repetidas veces bisurcado, ramosísimo, *entrenudos* 1½-3 cm. largos apenas 2 m. gruesos, ∞-estriados y salpicados, así como los ramos y bases de los peciolos, por manchas pequeñas purpúreas; *hojas* verticiladas ternas-quinas pecioladas; *peciolos* erguidos 2½-4 mm.

largos; *limbos*, desde la extremidad del pecíolo patentes trasversados, acuñados en la base, obtusos ó escotados en el ápice; 7-10 mm. largos, 5-7 mm. anchos, carnosos, oscuramente pelucido-punteados y pínatinervios, con 3-4 nervios II de cada lado del central; *pedúnculos* 1  $\frac{1}{2}$  cm. largos, terminales solitarios; *amentos* delgados cilíndricos, (durante la floración) 3-5 cm. largos, ± 1  $\frac{1}{2}$  mm. gruesos densifloros; *brácteas* orbiculares anchas, glandulosas, peltadas en el centro; *ovario* inmerso, aovado, adelgazado hacia el ápice; *estigma* terminal negruzco, fina y parcamente pubescente. (D. s. m. v.)

Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental entre *Papallata* y *Cuyujua* (2. 1901)

Especie afine á la *P. microphylla* Kth. y á la *P. aphylla*, C. DC.

85. *P. linearis* c. DC. *foliis* plerumque quinis petiolatis, linear-ellipticis, apice obtusis, supra pilosulis, membranaceo-pellucidis, trinerviis; *amentis* terminalibus subdensifloris, filiformibus, longiuscule pedunculatis, folia duplo superantibus; *bractea* rotundata, carnosula, centro peltata; *ovario* subimmerso; *stigmate* minuto; *bacca* semiimmersa, apice oblique mucronulata, flavicante.

c. DC. *Prodr. loc. cit. p.* 463.

Tallo rastreiro, filiforme; hojas verticiladas, comunmente 5-nas; pecíolos 3-6 mm. largos, *limbos* 10 mm. largos, 2 mm. anchos, linear-elípticos, obtusos en el ápice, pubescentes en la página superior, membranáceo-pelúcidos, trinervios; amentos terminales subdensifloros filiformes, doble más largos que hojas; *pedúnculos* 5-7 mm. largos; *bráctea* orbicular, peltada en el centro, subcarnosa; *ovario* subinmerso; *estigma* diminuto; *baya* semiimmersa, mucronada oblicuamente en el ápice, amarillenta.

Colectada por JAMESON en los *Andes de Quito* y por E. ANDRÉ en el *Cascajal* cerca de S. Florenejo. (1500 metros.)

85.\* *asperuloides* sp. nov. stolonifera; *stolonibus* elongatis, filiformibus, caulibusque angulato-striatis, 1-2 dm. altis, 1  $\frac{1}{2}$  mm. crassis, irregulariter ramosis; *foliis* petiolatis, 3-5-nis. (nunc oppositis) breviter petiolatis; *limbis* linearibus, [nunc inferioribus obovatis] crassiusculis, utrinque convexis, utrinque obtusis vel apice retusis, 1-nerviis, subtus glabris, supra sparse setulosis, apice pen-

*nicillato-ciliatis*, 8-12 mm. longis,  $\pm$  2 mm. latis; *pedun-*  
*lis* folia involucrantia subæquantibus striatis, erectis, gla-  
bris; *amentis* terminalibus solitariis, erectis cylindricis,  
pedunculos 3-4-plove superantibus, remotifloris; *bractea*  
discoidea, centro peltata; *ovario* semiimmerso depresso,  
apice antice stigma pennicillatum gerente; *bacca* semi-  
immersa globulosa, glanduloso-muriculata.

Estolonífera; estolones muy largos, filiformes, radicantes en los nudos y, así como los tallos fértiles, estriados, setuloso-pubescentes ó  $\pm$  lampíños; tallos fértiles 1-2 dm. altos; irregularmente ramosos; hojas pecioladas, verticiladas; pecíolos 1½-2 mm. largos, lampíños; limbos  $\pm$  carnosos, convexos de ambos lados, pelúcido-punteados (con puntos gruesos) esparcidos de pelos setulosos en la haz y  $\pm$  lampíños en el envés, apestañados en el ápice, (obtuso ó apenas escotado) con pocos pelos rectos y cerdosos, 1-ó  $\pm$  claramente 3-nervios, con el nervio central desvanecido antes del ápice, y dividido en venillas laterales, terminadas (así como los 2 nervios laterales basilares) dentro del margen, las de los estolones y las inferiores de los tallos fértiles, más largamente pecioladas, (pecíolos 3-4 mm. largos) trasovado-acuñadas 3-5-nas, las de los tallos fértiles, brevemente pecioladas, 5-8-nas, lineares, obtusas de ambos lados, 5-10 mm. largas, 2-2½ mm. anchas; pedúnculos terminales, ó finalmente laterales, iguales ó poco más largos que las hojas superiores, estriados, lampíños; amentos erguidos, rígidos, 3-4 cm. largos, laxifloros; bráctea orbicular, pedicelada, peltada en el centro; filamentos largos, anteras pequeñas, brevemente elípticas, amarillo-blanquecinas; ovario semiimmerso, ancho deprimido; estigma oblicuo, apical, apincelado; baya semiimmersa, globulosa muriculada, brevemente apiculada [D. s. m. viv.]

Crece entre los musgos en los bosques subandinos occidentales del m. Atacatzo y del Pichincha [4. 1,900.]

86. P. chrysotrichia Miq. *foliis* plerumque quaternis, brevissime petiolatis vel subsessilibus, ovalibus vel obovato-rotundatis, supra puberulis, subtus hirtello-tomentosis, coriaceis, lutescentibus, pellucido-punctulatis, infimis circa marginem serie glandularum pellucidarum insculptis, uninerviis vel subtrinerviis; *centrali nervo* validiore sed non prominente, lateralibus tenuissimis, infra medium evanidis; *amentis* verticillatis vel terminalibus solitariis; *bractea* rotundata, centro peltata, pallide mar-

ginata; *ovario* glabro, vix immerso apice puberulo; *bacca* globosa nigra.

*Miq. Syst. p. 163. c. DC. loc. cit. p. 449.*

Hierba erguida, jugosa, 8-10 cm. alta; *tallo* rollizo parduzco pubérulo; *hojas* verticiladas, por lo común 4-ternas, muy brevemente pecioladas ó subsésiles; *limbos* 6-10 mm. largos, 3-6 mm. anchos, ovales ó trasovado-orbiculares, pubérulos en la página superior, pubescente-tomentosos en la inferior, brevemente apestañados, amarillentos, coriáceos, pelúcido-punteados, los inferiores con una serie de glándulas pelúcidas impresas á lo largo del margen, 1-nervios ó casi 3-nervios, con el nervio central bastante grueso, pero no prominente, los laterales tenues y desvanecidos antes de la mitad del limbo; *amentos* axilares, opuestos ó verticillados ó terminales solitarios, filiformes sublaxifloros, 2-5 cm. largos, cilíndricos obtusos; *pedúnculos* 5-10 mm. largos; *bráctea* orbicular peltada en el centro, pálida en el márgen; *ovario* apenas inmerso, lampiño; *estigma* apical, pubérulo; *baya* globosa, lampiña, negra. (Ex Miq. loc. cit.)

Crece en el páramo de Cumbal, colectada por E. ANDRÉ.

87. *P. aphylla* c. DC., *foliis* plerumque quaternis brevissime petiolatis, oblongo-ellipticis, apice obtusis, basi subattenuatis minutis glabris ciliolatis membranaceis, pellucido-punctulatis, obsolete nervulosis, uninerviis nervuloque juxta marginem currente; *petiolo* puberulo, *amentis terminalibus* subdensifloris; *pedunculo* subtiliter hirtello, petiolum superante; *bractea* rotundata, centro peltata; *ovario* subimmerso; *stigmate* minuto.

c. DC. *Prodr. p. 465.*

*Tallo* rastreiro y afilo inferiormente, ascendente ó erguido, 10-25 cm. alto, ramoso; *ramos* tiernos superiormente pubérulos; *hojas* ordinariamente cuaternas, muy brevemente pecioladas; *peciolos* 1 mm. largos, pubérulos; *limbos* 4-10 mm. largos, 1  $\frac{1}{4}$ -mm. anchos, oblongo-elípticos, obtusos en el ápice, adelgazados hacia la base, membranáceos, lampiños, finamente apestañados, pelúcido-punteados, 1-nervios, muy tenuemente reticulado-venosos, con nervio marginal; *amentos* terminales subdensifloros; *pedúnculos* pubérulos, 3-5 mm. largos; *bráctea* orbicular, peltada en el centro; *ovario* subimmerso; *estigma* diminuto.

Crece en las bosques de Gualea región suprtropical.

88. *P. microphylla* Kunth *foliis quaternis quinisve, brevissime petiolatis, oblongo-lanceolatis, apice obtusiusculis, basi in petiolum attenuatis, utrinque minutissime puberulis, apicem versus minutissime ciliolatis, rigidulis subopacis, glanduloso-punctulatis, enervulosis uninerviis; petiolo ciliolato; amentis terminalibus filiformibus densifloris pedunculatis, folia duplo superantibus; bractea rotundata, glandulosa, centro peltata subsessili; ovario ovato; stigmate carnosulo, post anthesin semi-immerso.*

*Kunth. in H. & B. Nov. gen. pl. vol. I. p. 69; Id. Synops. p. 121; Miq. Syst. p. 167; C. DC. loc. cit. p. 465.*

Planta perenne suculenta, en seco coriácea, rastrera, afila en la base; *tallo* y *ramos* subtetragónos, secos, asurcados, los tiernos muy finamente pubérulos, 15 cm. altos, hojas 4-nas-5-nas; *peciolos* apenas 1 mm. largos brevemente apestañados; *limbos* oblongo-lanceolados, 4-7 mm. largos, 1½-2 mm. anchos, agudos en el ápice, adelgazados hacia la base, tenuemente pubérulos de ambos lados, brevemente apestañados hacia el ápice, algo rígidos, opacos, glanduloso-punteados, 1-nervios, nervillos imperceptibles; *amentos* terminales, filiformes, densifloros, 20-27 mm. largos, 1-½ mm. gruesos, rectos, obtusos; *pedúnculos* 8-10 mm. largos, subhirtos ó casi lampiños; *bractea* orbicular subsesil, peltada en el centro, glandulosa; *ovario* aovado suboblicuo, estigmatoso en el ápice; *estigma* carnososo, pubérulo.

En los bosques subandinos del volcán *Cotacachi (Quisaya)* del *Pichincha* y del *Corazón*. 1,800-1,900 m.

89. *P. quadrifolia* Kunth, *foliis quaternis, e basi cuneata obovatis, apice obtusis, emarginatis, brevissime petiolatis, coriaceis glabris, trinerviis vel subtriplinerviis, centrali nervo ad apicem usque ducto, utrinque nervos 1-2 alternos mittente; amentis terminalibus solitariis, longiuscule pedunculatis, filiformibus, densifloris, folia triplo quadruplove superantibus, rhachi glabra; bractea subsessili, rotundata, centro peltata; ovario per anthesin immerso, ovato-oblongo; stigmate carnosulo-puberulo; baccia immersa ovata, apice mucronata.*

*Kunth in. H. et B. Nov. Gen. pl. loc. cit. et in Synops. p. 121; Miq. Syst. p. 159; C. DC. Prodr. loc. cit. p. 454.*

*Tallo* radicante en la base y en los nudos, seco 4-5-angulosso lampiño, repetidas veces 2-3-cótomo, abultado en los nudos, con los ramos igualmente angulosos y lampiños; *hojas* verticiladas 4-ternas (á veces quinas); *peciolos* 1½-2 mm. largos; *limbos* trasovados, profundamente escotados en el ápice y acuñados hacia la base, 8-12 mm. largos, coriáceos, lampiños, lustrosos, muy finamente apestañados en el ápice, pelúcido-punteados, 3-6-subtriplinervios; *nervios* todos inmersos y poco perceptibles; *nervio periférico* perceptible en la mitad superior de los limbos; *amentos* terminales, solitarios, cilíndricos, rígidos densifloros, 2½-3 cm. largos, sostenidos por pedúnculos lampiños (en seco angulosos) 1-1½ cm. largos; *bractea* orbicular, peltada en el centro; *ovario* inmerso; *estigma* caloso pubérulo; *baya* inmersa-aovada, mucronada en el ápice.

Crece en los bosques subandinos del *Pichincha* y del *Corazón*, 1.800-2.200. m., colectada también por SPRUCE.

90. *P. rubioides* Kunth, *foliis* quaternis, breviter petiolatis, oblongo-rhombeis, basi acutis, apice protracto obtusis, utrinque glabris, tenuissime ciliolatis, subtus purpureis, fere opacis, trinerviis nervuloque juxta marginem currente; *petiolo* tenuissime velutino-puberulo; *amentis* terminalibus, densifloris, filiformibus, folia multoties superantibus; *bractea* rotundata, centro peltata; *bacca* globosa acuta brevi.

*Kth. loc. cit. p. 70, Id. Synops. I, p. 122. Miq. Syst. p. 162. C. DC. Prodr. loc. cit. p. 452.*

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

*Tallo* rastreiro en la base, tetrágono muy finamente aterciopelado-puberulo; *hojas* 4-ternas, brevemente pecioladas; *peciolos* 2 mm. largos, con el indumento del tallo; *limbos* oblongo-rómnicos, puntiagudos en la base, prolongados y obtusos en el ápice, apenas 15 mm. largos, lampiños de ambos lados, muy tenuemente apestañados, purpúreos en la página inferior, subcoriáceos, subopacos, trinervios y con un nervillo marginal; *amentos* terminales, filiformes, densifloros, mucho más largos que las hojas; *bráctea* orbicular peltada en el centro; *ovario* subinmerso, *estigma* subdiscoídeo, algo carnoso; *baya* globosa, puntiaguda.

Crece en las pendientes occ. del volc. el *Corazón*, colectada también por E. ANDRÉ.

90\* *P. discifolia* sp. nov. *caule* elongato, prostrato, e nodis radicante, sursum assurgente, in sicco angulato,

tenuiter puberulo, ramoso; *internodiis* quam folia 3-4-plove longioribus; *foliis* ternis-quinis, (hinc inde oppositis) petiolatis; *petiolis* 2-½ mm. longis, puberulis; *limbis* disciformibus, carnosis in sicco coriaceis, supra marginēque pubescentibus, subtus glabris, (cum petiolis) nigro-punctatis, basi vix conspicue trinerviis; *pedunculis* terminalibus mox, caule excrescente, lateralibus, erectis, rigidis, angulatis, tenuiter puberulis, folia duplo triplove superantibus; *amentis* elongatis, 8-10 cm. longis, 2 mm. crassis, erectis, cylindricis, annulatim densifloris; *bractea* discoidea, centro peltata; *ovario* basi immerso, apice conico stigma punctiforme gerente.

Tallo difuso, echado en la base, radicante de los nudos, ramoso, superiormente ascendente, brevemente encrespado-pubescente, finalmente alampiñado; *entre nudos* 3-5 cm. largos; *hojas* verticiladas, ternas-quinas, ó á veces las inferiores opuestas, pecioladas; *peciolos* 2-3 mm. largos, pubescentes; *limbos* orbiculares, 12-18 mm. en diámetro, ó levemente elípticos, obtusos de ambos lados, trinervios en la base y reticulado-venosos (con los nervios laterales y las venas apenas sensibles) carnosos, en seco coriáceos, opacos, pubescentes en la **haz** y en el margen; inferiormente lampiños y esparcidos, (así como los peciolos y los ejes tiernos) de puntos negros; *pedúnculos* terminales ó finalmente (por ulterior prolongación del eje) laterales, delgados, rígidos, pubérulos, en seco angulosos, 2½-4 cm. largos; *amentos* 8-10 cm. largos, 2 mm. gruesos, erguidos, densifloros; *bráctea* relativamente grande, orbicular, <sup>DIC 1879</sup> peltada en el centro, glandulosa; *ovario* immerso en la base, aovado-cónico, terminado en el estigma puntiforme apical; *baya* conforme glandulosa, cónico-acuminada. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del m. *Pichinchá* hacia *Gualca*.

Es una de las especies mayores y más hermosa de esta sección.

91. *P. reflexa*. A. Dietr. *foliis* ternis cuaternisve (raro ad dichotomias senis), petiolatis, pellucido-punctatis, supra glabris, subtus pilosis, coriaceis, obsolete trinerviis, nervulosis vel enervulosis nervuloque saepe apicem versus juxta marginem currente; *petiolo* hirtello, amentis terminalibus pedunculatis, folia 2-5-plo superantibus; *pe-*

*dunculo* tenuiter hirtello; *rhachi* hirtella foveolata; *bractea* rotundata centro peltata, subsessili, glabra, carnosula; *ovario* profunde immerso, ovato-acuto; *stigmate* capitellato, puberulo; *bacca* ovato-acuta, subpatente.

*b. valantoides*, enervulosa minor; *foliis* 9 mm. longis; *rachi* densius pubescente. C. DC.

Hierba rastrera suculenta, por lo común epífita, muy ramosa; *tallo* (seco) asurcado-anguloso, lustroso, pubérulo, especialmente en los nudos; *hojas* ternadas ó cuaternas (á veces en las dicotomías senas); *pecíolos* muy cortos, pubérulos; *limbos* 8-12 cm. largos y algo menos anchos, subrómbeo-elípticos ó los inferiores, suborbiculares ó suborbicular-trasovados, carnosos, en seco subcoriáceos, lámpíos, (brevemente apestañados hacia el ápice) lustrosos, pelúcido-punteados y esparcidos (como también los ramos) de puntos negros, trinervios; *nervios* resueltos en ramos sucesivamente más tenues, constituyendo un retículo irregular poco perceptible, el central terminado en el ápice, los laterales refundidos finalmente en el periférico algo apartado del margen; *amentos* terminales, cilíndricos, densifloros; 1½-2 cm. largos, 2 mm. gruesos, obtusos en el ápice, sostenidos por pedúnculos pubérulos, 1-2 cm. largos; *raquis* setuloso-hispida; *bráctea* suborbicular, pelúcido-punteada apestañada; *ovario* immerso, oval oblicuo; *estigma* pedicelado-subdisciforme; pubérulo; *baya* aovada, mucronada, negruzca.

*b. valantoides* C. DC. menor; *limbos* 7-9 mm. largos, venillas imperceptibles; *raquis* más densamente pubescente. *P. valantoides*, Miq; *Syst. p. 174 et in Mart. Flor. Brasil IV. pág. 17 tab. 2. fig. 5. C. DC. loc. cit. p. 452.*

Crece en la región andina y subandina del m. Mojanda y del Cotacachi cerca de Perucho, item en los bosques superiores del Pichincha y del Corazón en las rocas y troncos vetustos.

92. *P. laxensis* Kth. *foliis* quaternis, breviter petiolatis, obovato-ellipticis, apice obtusis, retusisve, basi acutiusculis, utrinque glabris, rigidulis, enerviis vel subuninerviis; *centrali nervo* obscure discernendo; *petiolo* glabro; *amentis* terminalibus densifloris, filiformibus, folia multoties superantibus; *pedunculo* glabro, folia aequante, *bractea* rotundata glandulosa, centro peltata, subsessili; *ovario* immerso, ovato, apice acuminato; *stigmate* capitellato, puberulo.

*Kunth.* in *H. & B. Nov. Gen.*, vol. 1 p. 70; *Id. Synops.* 1. pag. 122; *Miq. Syst.* pag. 158. c. DC. *Prodr. loc. cit.* p. 457.

Tallo prostrado y rastrero en la base, simple ó dicotómica-  
mente ramoso, lampiño, coriáceo, subtetrágono cuando seco;  
hojas 4-ternas, pecioladas; *pecíolos* 1 mm. largos, lampiños; *lim-  
bos* 6-10 mm. largos, 6 mm. anchos, trasovado-elípticos, obtusos  
ó retusos en el ápice, puntiagudos en la base, lampiños de am-  
bos lados, rígidos y casi coriáceos cuando secos, opacos, ener-  
vios; *nervio central* apenas discernible; *amentos terminales*, fili-  
formes, densifloros, mucho más largos que las hojas; *pedúnculos*  
lambiños, 5-10 mm. largos; *bráctea* orbicular, glandulosa, pelta-  
da en el centro, subsésil; *ovario* aovado, inmerso, acuminado en  
el ápice; *estigma* cabezudo, pubérulo.

Entre los musgos y en los troncos vetustos de la región  
andina y subandina.

92.\* *P. cera troides* sp. nov. caule e basi prostrata, e  
nодis radicante, ramoso, erecto vel ascendente, terete,  
in sicco angulato, pilis brevibus mollibus crispe et inca-  
no puberulo, demum glabrato; *foliis* ternis-quaternis, in  
dichotomiis plerumque quinis, petiolatis; *petiolo* 2-4 mm.  
**longo**, longiuscule pubescente; *limbis* ellipticis, v. subel-  
liptico obovatis, rotundatisve, basi ± in petiolum con-  
tractis, apice obtusis vel obiter retusis, ± crasse carnosis,  
exsiccando coriaceis, pellucido-punctatis, cinereis v. glau-  
cescentibus, supra marginaque puberulis, infra glabris et  
nigro-punctatis, basi tri-nerviis. *nervis* omnibus immer-  
sis [in sicco aegre discernendis], centrali ad apicem usque  
ducto, laterales infra medium evanidis, *pedunculis* ter-  
minalibus v. demum lateralibus, solitariis erectis, pube-  
rulis, *folia* involucrantia demum superantibus; *amentis*  
cylindricis, erectis rigidis, 4-7 cm. longis, 2-3 mm. crassis,  
densifloris; *bractea* discoidea, centro peltata; *ovario* in  
rachi carnosa alveolata inmerso; *bacca* ovato-conica  
muricata acuminata, apice summo stigmatifera.

*b. hypericifolia* differt foliis maioribus obovatis, ±  
apice retusis, ± nitentibus, excepto margine ciliato, utrin-  
que glaberrimis, bis tri-nerviis, nervoque primario evi-  
denter penninervio, plerumque inæqualibus;—inflores-  
centia et reliqua ut in typo.

Tallo rastrero ó pendulo de los troncos vetustos, radicante de los nudos, ramoso, cilíndrico, anguloso cuando seco, esparcido, así como los pecíolos, de pelos ramosos, blandos, algo encrespados, blanquecinos, en apariencia pulverulento-pubescentes; *entrenudos* inferiores 3-8, los superiores, 2-8 cm. largos; *hojas* inferiores opuestas, las superiores 3-4-nas, ó en los ramificaciones quinas, pecioladas; *pecíolos* 2-4 mm. largos, comprimidos, pulverulento-pubescentes; *limbos* carnosos, secos coriáceos, cenciantos ó blanquecinos, pelúcido-punteados, apestañados en el margen y pulverulento-pubescentes en la haz, lampiños en el envés, trasovados, ó trasovado-elípticos, ó casi redondos, contraídos en el pecíolo y obtusos ó algo escotados en el ápice, trinervios en la base, con los nervios laterales muy tenues, desvaneidos en la mitad inferior, el nervio medio extendido hasta el ápice del limbo, dividido en dos ó tres secundarios de cada lado, todos inmersos y apenas sensibles en las hojas secas; *pedúnculos* solitarios, terminales ó con el tiempo laterales, erguidos, pubérulos, en seco angulosos, iguales ó, cuando adultos, más largos que las hojas del verticilo propio; *anclitos* erguidos, rígidos, densifloros, 4-7 cm. largos, 2-3 mm. gruesos; *bráctea* orbicular, peltada y muy brevemente pedicelada en el centro, glandulosa; *ovario* inmerso en la raquis carnosa y alveolada; *baya* globulosa en la base, superiormente cónica acuminada, con el estigma apical.

*6. hypericifolia* difiere de la forma anterior por las hojas mayores, lampiñas de ambos lados verdes brillosas, los nervios más evidentes, las inferiores comúnmente opuestas, las superiores 3-4-nas notablemente desiguales en cada verticilo,—inflorescencia y lo demás como el tipo.—Rara.

Especie afine á la P. *Hartwegiana* Miq., de la cual se distingue por el número de las hojas de cada verticilo, los pecíolos notablemente largos, los limbos negro-punteados en el envés; etc.

Común en la región Andina y Subandina de ambas cordilleras, y en las pendientes occidentales del *Pichincha* entre *Nono* y *Gualea*.

93. P. *Millei* sp. nov. caespitosa, e nodis radicans; *caulibus* numerosis, erectis vel diffusis, saepe pendulis, cylindricis, modice crassis, primum (cum petiolis) dense breviterque puberulis; demum glabratis; *foliis* verticillatis 4-5-nis, vel ad ramificationes 6-nis; *petiolis* brevibus, subteretibus, supra leviter complanatis; *limbis* subelliptico-oblongis, utrinque angustatis apice obtusis, vel inferioribus subobovatis, dense carnosis, glabris, obscure

pellucido-punctatis, ad basin trinerviis, sursumque nervis lateralibus utrinque 2-3, omnibus intra marginem evanidis; *nervo* peripherico tenuissimo; aegre conspicuo; *amento* terminali, demum [merithallo excrescente] specie laterali, longiuscule attenuato; *rachi* carnosa alveolata, alveolis ellipticis; *bractea* parva orbiculari, pedicellata, peltata; *ovario* inclusio ovato; *stigmate* apicali; *bacca* immersa, libera muriculata.

*Planta* cespitosa; *tallos* numerosos, rollizos, anguloso-alados cuando secos, densa y brevemente pubérulos, finalmente alampiñados, arraigantes en los nudos, los centrales erguidos, 15-25 cm. altos, los periféricos tendidos y á veces péndulos, hasta 40 cm. largos; *hojas* verticiladas 4-nas-5-nas, ó, en las divisiones de los tallos, 6-nas; *pecíolos* 2-3 mm. largos, semicilíndricos, aplanados en el lado interior, finamente pubescentes; *limbos* inferiores ± trasovados, acuñados, los superiores oblongo-elípticos, angostados en ambas direcciones, obtusos en ápice, 1½-3 cm. largos, 7-12 mm. anchos, carnosos, lampiños, finamente pelúcido-punteados, trinervios en la base, con los dos nervios laterales desvanecidos dentro del margen ultra la mitad del limbo, y superiormente con dos ó tres nervios laterales de cada lado; *nervio* periférico aproximado al margen, poco sensible; *pedúnculo* terminal y finalmente, por ulterior desarrollo del tallo, aparentemente lateral, cilíndrico, erguido, engrosado hacia arriba, 15-20 mm. largo; *amento* 6½-8 cm. largo, 3-4 mm. grueso, adelgazando uniformemente desde la mitad hacia ambas extremidades; *raquis* crasa, carnosa, alveolada, con alvéolos elípticos, al tiempo de la maduración 3 mm. largos, 1 mm. anchos; *bráctea* orbicular, peltada, pedicelada, durante la floración tan grande como el alveolo, más tarde hasta ½ menor; *ovario* inclusio, aovado, rostrado; *estigma* apical escotado; *baya* globular-aovada, rostrada, muriculada, madura negruzca, libre en el fondo del alvéolo.

Crece en la altiplanicie cerca de Pifo, á 2.700-3.000 metros, descubierta por el P. LUIS MILLE S. J.

94. *P. melanosticta* sp. nov. *caule* e basi prostrata radicante, assurgente, tereti, sursum verticillatim ramoso, breviter puberulo, demum glabro; *foliis* 5-6-nis, breviter petiolatis obovatis, obtusis, ± carnosis, pelucido-punctatis, subtus glabris et glandulis nigrescentibus conspersis, supra basin versus petioloque puberulis, apice ciliolatis, trinerviis et obsolete venulosis, nervo que periferico intra-

marginali instructis; *amentis* terminalibus solitariis pedunculatis rectis, subfiliformibus; sublaxifloris, folia involucrantia multoties superantibus; *pedunculo* eadem aequante; *bractea* orbiculata, subsessili, centro peltata; *ovario* basi immerso, apice stigma puberulum gerente; *bacca* ovata muriculata.

*Tallo* prostra lo en la base, á veces estolonífero, radicante, rollizo, robusto, 3-5 mñ. grueso, muy breve y finamente pubescente, finalmente lampiño, superiormente ramoso, con los ramos verticillados 3-5 nos; *hojas* verticiladas 3-5-nas, brevemente pecioladas, trasovadas, obtusas en el ápice, 1½-2½ cm. largas, 7-10 mñ. anchas, carnosas, pelúcido-punteadas, lampiñas y esparcidas de glándulas negruzcas en el evés, pubescentes hacia la base en la haz, apestañadas en el ápice; *pecíolo* 1-1½ mm. largo pubescente; *amentos* terminales solitarios, filiformes, 5-8 cm. largos, apenas 1 mm grueso, sublaxifloros, sostenidos por pedúnculos 8-12 mm. largos lampiños; *bráctea* suborbicular, subsésil, peltada en el centro, glandulosa; *ovario* semi-inmerso, oval prolongado en estilo mucroniforme, oblicuamente estigmatoso en el ápice; *baya* aovada, muriculada, negriza.

Especie en el aspecto y tamaño muy parecida á la *P. galloides* Kunth, distinguiéndose, empero por las hojas pecioladas, trasovadas, por los amentos terminales, solitarios, &c.

Crece en los bosques subandinos entre *Noto* y *Gualea* ya terrestre, ya adherida á los troncos vetustos.

95. *P. inaequalifolia* R. & P. *foliis* quaternis senisve petiolatis, inaequalibus, superioribus longioribus, oblongo-spathulatis, apice obtusis, basi in petiolum decurrentibus, inferioribus obovatis, omnibus glabris, rigidulo-membranaceis, pellucido-punctulatis, subopacis trinerviis; *centrali nervo* ad apicem, lateralibus ad medium usque ductis, aegre discernendis, petiolo glabro; *amentis* axillaribus terminalibusque verticillatis vel solitariis subdensifloris, folia multoties superantibus; *bractea* rotundata, centro peltata, subsessili; *ovario* semi immerso obovato; *stigmate* carnosulo.

R. & P. loc. cit. p. 30 tab. 46 f. a, Kunth. in H. & B. loc. cit. p. 71 et in Synops. 1. 122. Miq. Syst. p. 148. c. DC. Prodr. loc. cit. p. 464.

*Planta* densamente cespitosa; *tallos* erguidos, cilíndricos, dicótomas y radicantes inferiormente, lampiños ó brevemente pubescente-tomentosos; *hojas* verticiladas 4-6 nas, subsésiles, replejas; muy enteras ó algo escotadas en el ápice, carnosas, opacas, pelúcido-punteadas, lampiñas, trinervias, con el nervio central extendido hasta el ápice, los dos laterales desvanecidos cerca de mitad; *las terminales* (ó florales) oblongo-espatuladas, contraídas paulatinamente hacia la base, dos ó tres veces más largas que las inferiores; *las inferiores* trasovadas, convexas en el lado inferior, más carnosas que las superiores; *amentos* axilares y terminales, verticillados (2-5) erguidos desiguales, los exteriores (axilares) menores subdensifloros, mucho más largos que las hojas; *bractea* orbicular, subsésil, peltada en el centro; *ovario* trasulado, semiinmerso; *estigma* algo carnoso.

Crece, segúu R. & P., en varios departamentos del Perú y cultivada comunmente con el nombre de *Congona* por su olor aromático, siendo probable quas se dé aun en el Ecuador. (Véase también la especie siguiente).

95.\* *P. Congona* sp. nov. dense caespitosa; *caulibus* erectis, indivisis, teretibus, glabris aut brevissime pulv-  
rulento tomentosis; *foliis* verticillatis, 3-6-nis breviter  
petiolatis, subaequalibus, oblongis, deorsum cuneatis,  
apice obtusis breviterque retusis, coriaceis glaberrimis,  
tenuiter 3-nerviis et obscure reticulato-venulosis, nervo-  
que peripherico parum infra apicem decurrente; *amentis*  
terminalibus v. demum, caule ex crescente, lateralibus,  
altero abortiente solitariis, (breviter pedunculatis, pedun-  
culo infra medium 1<sup>el</sup> 2<sup>ro</sup> bracteato, <sup>ro</sup> pedicello supra brac-  
team quam pedunculus subdupo longiore) strictis,  
densifloris, folia suprema 3-4-plove superantibus; *bractea*  
suborbiculari pedicellata, supra centrum peltata; *ovario*  
inmerso; *stylo* disciformi, centro stigmatifero; *bacca* de-  
mum emersa, orbiculari, muriculata.

*Planta* densamente cespitosa; *tallos*, desde la base brevemente rastrera, erguidos, rollizos, multisulcados cuando secos, indivisos, 30-40 cm. altos, hasta 1 cm. gruesos, lampiños ó muy breve y finamente pulv-  
rulento-tomentosos; *hojas* (y ramos) verticiladas 3-6-nas, brevemente pecioladas; *pecíolos* 1½ mm.  
largos, aplazados, pubescentes interiormente; *limbos* todos ± iguales, anchamente linear-oblongos, contraídos desde la  $\frac{3}{4}$  parte superior hacia la base y brevemente en el ápice obtuso y ligeramente escotado, subcoriáceos, opacos, pelúcido-punteados

muy lampiños, salvo el ápice, breve y parcamente apestañado, y la base en la página superior brevemente pubérula, trinervios y oscuramente reticulado-venosos, con el nervio central escurrido en el ápice, los laterales desvanecidos ultra la mitad del limbo, más sensibles en la pagina superior; *amentos* terminales ó finalmente (por ulterior desarrollo de tallo) laterales, solitarios; 3-4 veces más largos que las hojas, erguidos, rígidos, carnosos densifloros, sostenidos por un pedúnculo 10-15 mm. largo, 1-2-3-bracteado en la  $\frac{1}{3}$  parte superior; *bráctea* 5-7 mm. larga foliácea; *brácteas* florales trasovado-orbiculares, pediceladas, peltadas en centro; *filamentos* exertos, más largos que las anteras; *ovario* inmerso en la raquis, carnosa, alveolada y glandulosa; *estilo* en forma de disco carnoso, con estigma punctiforme en el centro; *baya* finalmente saliente esférico-trasovada, glanduloso-muriculada, ± puntiaguda. (D. s. e. v.)

Crece en la altiplanicie cerca de Pifo, colectada por el P. LUIS MILLE y cultivada comunmente en los jardines bajo el nombre de "Congona", por el olor débil, pero suave que despiden sus hojas restregadas entre los dedos.

96. *P. galapagensis* Miq. *foliis* ternis quaternisve vel oppositis subsessilibus, ovato-oblongis, apice obtusis, utrinque glabris membranaceis uninerviis; *amentis* axillaribus terminalibusque, brevibus densifloris pedunculatis; *bractea* rotundata centro peltata; *ovario* subimmerso.

*Miq. in Hook. London Journ. of Bot. 4. p. 426 et C. DC. Prodr. loc. cit. p. 465*

Tallo y ramos prostrados 12-15 cm. alto 3-5 mm. grueso, estriado, terciopelado-pubérulo; ramos opuestos, erguidos ó encorvados, prostrados ascendentes hacia el ápice y pubérulos; hojas opuestas-4-5-nas; peciolos muy cortos (apenas 1 mm. largos) pubérulos; limbos elíptico-oblongos, 5 mm. largos, obtusos ó retusos y brevemente apestañados en el ápice, redondeados en la base, coriáceos lampiños, pelúcido-punteados, 1-nervios; amentos axilares y terminales, 1  $\frac{1}{2}$ -2 cm largos erguidos, subdensifloros; pedúnculos 4 mm. largos; bráctea orbicular, peltada en el centro; ovario subinmerso; baya pequeña anchamente aovada, puntiaguda. (Ex D. Hook; An enumeration of the Plants of the Galápagos Archipélago, p. 180).

Crece en la isla James (Santiago), del Archipiélago de Galápagos, colectada por DARWIN.

97. *P. fasciculata\** sp. nov., dense caespitosa; *caulibus* erectis, 8-12 cm. altis, dense breviterque puberulis, rubro maculatis; *foliis* verticillatis 5-6-nis, breviter petiolatis; *petiolis* 1-2 mm. longis, subglabris; *limbis* inferioribus obovato-orbiculatis, superioribus linear-ellipticis, 5-7 mm. longis, 1½-2 mm. latis, carnosis, pellucido punctatis, glabris apicem versus tenuiter ciliatis, prope basin obscure 3-nerviis, nervulis lateralibus supra medium limbi evanescenibus; *nervo* marginali vix apicem versus conspicuo; *amentis* terminalibus axillaribusque, in apice ramulorum ternis-senis, remotifloris, 3-5 cm. longis, 1 mm. crassis, pedunculo 4-6 mm. longo, glabro sussultis; *bractea* orbiculari brevissime pedicellata, centro peltata; *ovario* inmerso, apice stigmatoso; *bacca* globuliformi, mucronata, minutissime muriculata. [D. i. s. v.]

*Planta* muy pequeña, densamente cespitosa, con tallos estériles numerosos en la base, los fértiles erguidos, 8-12 cm. altos, 1½ mm. gruesos, rollizos, abultados en los nudos con manchas purpurascentes, fina y brevemente pelierizados, ramosos hacia el ápice con entrenudos 1-2 cm. largos; *hojas* verticiladas de 5-6 en cada verticilo, brevemente pecioladas; *pecíolos* 1-1½ mm. largos, lampiños, superiormente complanados, *limbos* inferiores trasovados ó trasovado-orbiculares, los superiores linear-elípticos, 5-7 mm. largos, 1½-2 mm. anchos, obtusos en el ápice, angostados en el pecíolo en la base, carnosos cuando vivos y casi coriáceos después de secos, finamente pelúcido-punteados, lampiños de ambos lados, finamente apestañados hacia el ápice, 3-nervios en la base, con los nervios laterales erguidos y desvanecidos hacia la mitad del limbo; *nervio* marginal apenas sensible en la parte superior; *amentos* terminales y axilares verticilados en el ápice de los ramos de 4-6 cm. largos, apenas 1 mm. gruesos, desiguales, los terminales mayores remotifloros; *pedúnculos* 4-6 mm. largos; *bráctea* orbicular brevemente pedicelada, peltada en el centro; *ovario* inmerso mucronado, estigmatoso en el ápice; *baya* aovada globuliforme mucronada, finamente muriculada.

Crece en los bosques tropicales en las orillas del R. *Pilatón* entre los musgos y en los troncos vetustos. (Jun. 1899).

\* Alias *P. parvula* Sod. Cambiase este nombre por haber sido ya aplicado á otra especie por C. DC.

97.\* *P. subcorymbosa* sp. nov. caule e basi radicante erecto striato (in sicco anguloso) brevisime puberulo, sursum verticillatum ramoso, ramis iterato di-tri-chotomis; *foliis* 5-7-nis inæqualibus, breviter petiolatis, obovato-oblongis, 8-15 mm. longis, 2-4 mm. latis, membranaceis, supra petiolisque breviter puberulis, apicem versus ciliolatis, subtus glabris crebreque glanduloso-punctactis, 1-nerviis, obscureque reticulato-venosis; *pedunculis* terminalibus axillaribusque erectis, rigidis, puberulis, in apice ramorum fasciculatis (3-7-nis) folia basilaria superantibus; *amentis* subfiliformibus laxifloris, *folia* 3-6-plo superantibus; *bractea* discoidea, centro peltata; *ovario* semiinmerso, apice antice oblique stigmatifero; *bacca* exerta ovata, breviter acuminata, muriculata.

*Tullos* (fértiles), erguidos, angulosos cuando secos, brevemente pubescentes, 3-4 dm. altos, ± 3 mm. gruesos; *entrenudos* 3-6 cm. largos; *ramos* verticilados, 3-5-nos y ulteriormente repetidas veces bi-3-surcados, los inferiores más largos que los superiores (con lo que la planta adquiere en su conjunto un aspecto cormoso) *hojas* verticiladas, 5-7-nas, brevemente pecioladas, ± desiguales; *peciolos* 1-½ mm. largos, marginados, pubérulos; *limbos* 8-15 mm. largos, 2-4 mm. anchos, oblongo-trasovados, obtusos en el ápice, acuñados hacia la base, membranáceos ó ± carnosos, densamente pelúcido-punteados con puntos negros y amarillos, apestañados en el margen, brevemente pubescentes en la haz, lampiños, glandulosos, 1-nervios, con nervillos laterales muy finos y un nervillo marginal en la mitad superior; *pedúnculos* axilares y terminales, verticilados, por 5-7 en el ápice de los ramos principales y en menor número en los subalternos, iguales ó más cortos que las hojas próximas; *amentos* filiformes, erguidos, laxifloros, 3-7 cm. largos; *brácteas* orbiculares, peltadas; *ovario* semiinmerso, estigmato oblicuamente en el ápice; *baya* globuliforme acuminada, muriculada. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos occidentales del volcán Atacatzo colectada con flores y frutos en Jun. de 1900.

Especie muy afine á la *P. Galoides* Kth. de la cual difiere por las hojas evidentemente pecioladas, ± trasovadas, 1-nervias y por la forma de la baya.

98. *P. Kunthiana* c. dc. *foliis* quaternis, breviter petiolatis elliptico-rotundatis coriaceis, pellucido-punctatis, puberulis vel glabratis, uninerviis, nervo subtus promi-

nulo; *amentis* axillaribus terminalibusque breviter pedunculatis; *pedunculo* puberulo; *bractea* rotundata carnosula pelucido-punctata, centro peltata; *ovario* profunde immerso; *stigmatae* carnosulo pennicillato *bacca* basi immersa ovata, oblique rostellata.

C. DC. *Prodr. loc. cit.* p. 464.

*Tallo* herbáceo, pubérulo, radicante de los nudos, dicótomo; *hojas* cuaternas; *pecíolos* 3 mm. largos; *limbos* elíptico-rómbeos, 11-12 mm. largos, coriáceos, pelúcido-punteados, pubérulos ó alampiñados, 1-nervios, nervio algo prominente en la cara inferior (en nuestros ejemplares con nervillos discernibles bajo el lente), *amentos* axilares y terminales, densifloros sostenidos por pedúnculos pubérulos, 1 cm. largos; *bráctea* orbicular, peltada en el centro, pelúcido-punteada; *ovario* inmerso; *estigma* algo carnoso, apincelado; *baya* aovada, oblicuamente rostrada.

Crece en los bosques andinos de la Prov. de *Riobamba*, hacienda *El Toldo*, colectada también por JAMESON en los Andes de Quito á 16.000 pies.

99. *P. corazonicola* C. DC. *foliis* quaternis, brevissime petiolatis, e basi cuneata *oblongo*-*obovalis*, utrinque velutinis, 1-nerviis; *amentis* axillaribus terminalibusque breviter pedunculatis, inaequilongis, terminalibus longioribus, foliorum *limbos* pluries superantibus; *bractea* orbiculari; *bacca* emersa ovata, sub apice oblique acutato stigmatifera.

C. DC. *Piperac. Sodir. Bullet. loc. cit.*, p. 520.

*Tallo* rastrero en la base, después erguido ramificado; *ramos* ± 8 cm. largos, 1 mm. gruesos, en seco angulosos; muy finamente terciopelados; *hojas* 4-nas; *pecíolos* apenas 1 mm. largos; *limbos* *oblongo*-*obovalados*, acuñados en la base, hasta 9 mm. largos, 5 mm. anchos, en seco membranáceos y amarillentos, muy finamente terciopelados, apestañados en el margen, pelúcido-punteados, 1-nervios; *amentos* axilares y terminales filiformes, laxifloros, 2-5 cm. largos, brevemente pedunculados, desiguales, los terminales más largos; *bráctea* orbicular glandulosa; *baya* emersa, aovada, papilosa, estigmatífera oblicuamente debajo del ápice.

Crece en los bosques subandinos del volcán, el *Corazón*.

100. *P. flagelliformis* Miq. *foliis* oppositis ternisve, sub-

sessilibus, oblongo-ovatis, apice obtusis, basi attenuatis, subtus tenerime subpuberulis, membranaceis, tenuiter uninerviis, tenuissime nervulosis; *amentis* axillaribus terminalibusque, filiformibus sublaxifloris pedunculatis; *pedunculo* glabro; *bractea* rotundata centro peltata; *ovario* subimmerso; *stigmate* orbiculari.

*Miq. loc. cit. p. 423 et c. DC. loc. cit. p. 456.*

*Tallo* echado, 40-60 cm. largo, filiforme, apenas 1 mm. grueso, tetrágono, lampiño; *hojas* opuestas, ternas ó cuaternas; *pecíolos* 1 mm. largos; *limbos* trasovado-oblidos, 18 mm. largos, 7 mm. anchos, obtusos ó retusos y muy finamente apestañados en el ápice, angostados hacia la base, lampiños muy finamente pubérulos en el envés, 1-nervios con nervio intramarginal y finamente venosos; *amentos* 4-7, axilares y terminales, filiformes; erguidos, sublaxifloros; 4-5 cm. largos; *pedúnculos* apenas 1 cm. largos, lampiños; *bráctea* suborbicular, peltada en el centro; *ovario* subimmerso; *estigma* orbicular.

Crece en el Archipiélago de Galápagos, colectada por DARWIN.

101. P. Victoriana c. DC. *foliis oppositis vel ternis, breviter petiolatis rhombeo-lanceolatis, apice protractis, obtusiusculis, basi attenuatis, utrinque glabris, membranaceo-pellucidis, reticulato-nervulosis, 3-5-nerviis nervuloso que juxta marginem currente; amentis terminalibus axillaribusque, sublaxifloris; bractea oblonga centro peltata; ovario immerso; stigmate discoideo.*

c. DC. *Prodr. loc. cit. p. 449.*

*Tallo* herbáceo, erguido, lampiño; *hojas* opuestas ó ternas, brevemente pecioladas; *limbos* 6 cm. largos, 7 mm. anchos, rombo-lanceolados, prolongados y subobtusos en el ápice, adelgazados hacia la base, membranáceo-pelucidos, reticulado-venosos, 3-5-nervios y con un nervio marginal; *amentos* axilares y terminales sublaxifloros; *bráctea* oblonga, peltada en el centro; *ovario* inmerso; *estigma* discoideo.

Crece, según E. ANDRÉ, "en la cordillera central del Ecuador."

102. P. blanda Kunth. *foliis oppositis, ternis quaternisve, breviter petiolatis, elliptico-rhombeis vel rhombeo-*

ellipticis, utrinque acutis, inferioribus elliptico-rotundis rotundisve, omnibus utrinque pubescentibus ciliatisque, fusco-punctulatis membranaceis subpellucidis, laxe reticulato-nervulosis, quinqueriviis; petiolo puberulo; amentis axillaribus terminalibusque, saepe apice ramulorum verticillatim confertis; filiformibus, folia multoties superantibus; bractea ovata carnosula, centro peltata; ovario emerso; stigmate puberulo; bacca ovato-acuta laevi.

*Kth. loc. cit. p. 67 et c. DC. Prodr. loc. cit. p. 458.*

Tallos erguidos, rollizos, carnosos, pubescentes, verde-rojizos; hojas opuestas, ternas, ó cuaternas; pecíolos 5-10 mm. largos, pubérulos; limbos elíptico-rómbeos, ó rómbeo-elípticos, 3-5½ cm. largos, 1½-2½ mm. anchos puntiagudos (ó angostados) de ambos lados, los inferiores elíptico-redondos ó casi redondos; todos pubescentes de ambos lados y apestañados, con puntos negruzcos, membranáceos, casi pelúcidos, laxamente reticulado-venosos, 5-nervios; amentos axilares y terminales, con frecuencia verticillados en el ápice del tallo y de los ramos, filiformes, 5-20 cm. largos, finalmente remotifloros, sostenidos por pedúnculos hirto-pubescentes, 1-3 cm. largos; bráctea aovada, carnosa, peltada en el centro; ovario prominente elíptico, con estigma globoso, pubérulo ó papiloso.

Crece en el Pichincha, colectada por JAMESON y al pie del Cotopaxi cerca de Rumipamba, colectada por HARTWEG—P. Quitensis Benth. (in Pl. Hartweg, p. 253).

103. *P. galoides* Kunth., foliis quaternis-quinis sessilibus, superioribus oblongo-spathulatis vel oblongis, apice obtusis; inferioribus obovatis membranaceis, pellucido-punctatis, subpellucidis, parce nervulosis, vel ener-vulosis, inconspicue trinerviis nervuloque juxta marginem currente; amentis axillaribus terminalibusque, folia multoties superantibus, sublaxifloris, breviter pedunculatis, plerumque apice ramulorum verticillatis; pedunculo glabro; bractea rotundata, centro peltata subsessili; ovario semi-immerso; stigmate glanduloso, carnosulo-papilloso; bacca ovata apice subrostellata.

*Kth. in. H. et B. Nov. gen. v. 1. p. 58; Synops 1. 123; Mig. Syst. p. 156; et c. DC. in Prodr. loc. cit. p. 463.*

*b. longifolia*, c. DC. *foliis linearis-oblongis*, basi subattenuatis, subsessilibus; *limbis* 2-3 cm. longis.

*c. nigro-punctulata* c. DC. *foliis* e basi cuneata obovatis, glabris, nigro-punctulatis, fere enervulosis; *limbis* 8 mm. longis.

*Tallos*: cespitosos, erguidos, cilíndricos, ligeramente acanalados, glaucescentes, pulvérulo-pubérulos, finalmente lampiños, 20-40 cm. altos, 5-10 mm. gruesos, superiormente ramosos; *ramos y hojas* verticiladas 4-6 nas; *pecíolos* 1-2 mm. largos, plano-convexos; *limbos* 1-3 cm. largos, 3-8 mm. anchos, los superiores oblongo-lineares ú oblongo-espatulados, obtusos ó retusos en el ápice, los inferiores ± anchamente trasovados ó elíptico-obovados, todos carnosos lampiños de ambos lados, algo apestañados en el ápice, obscuramente trinervios, tenuemente reticulado-venosos, y con nervio marginal; *amentos* axilares y terminales, verticilados 3-6-nos, filiformes 5-10 cm. largos 1-1½ mm. gruesos, sublaxifloros, erguidos; *pedúnculos* lampiños, 5-10 mm. largos; *bráctea* orbicular, peltada, subsésil, irregularmente apestañada en el margen, glandulosa; *ovario* semiinmerso; *estigma* delantero, papiloso-pubérulo; *baya* subelíptica asimétrica, puntiaguda de ambos lados, terminada en el ápice en apéndice carnoso, papiloso, mucronada.

Crece en los matorrales, rocas y muros vetustos de la altiplanicie, colectada también por JAMESON.

*b. longifolia*, *limbos* linear-oblongos, sésiles, obtusos ó ligeramente puntiagudos en el ápice, más claramente trinervios, reticulado-venosos y pelúcido-punteados.

Es la forma más comun.—Crece con la anterior, colectada también por FRASER.

*c. nigro-punctulata* hojas trasovadas, acuñadas hacia la base, lampiñas, negro-punteadas; *nervillos* poco ó no perceptibles; *limbos* 8 mm. largos.

Colectada en el Ecuador por JAMESON.

104. P. lanceolata c. DC., *foliis quaternis-senis*, breviter petiolatis, lanceolatis, basi in petiolum subdecurrentibus, supra ad nervos pubescentibus dein, nervis exceptis, glabratris, rigidulo-membranaceis, pellucido-punctulatis, enervulosis, quinquenerviis, nervis 3 centralibus subtus subcarinato-prominulis; *nervo centrali* ad apicem usque ducto, lateralibus alte supra medium ductis, exter-

nis subtilioribus, nervulo pellucido juxta marginem currente; petiolo supra pubescente; amentis axillaribus breviter pedunculatis filiformibus, subdensifloris, folia duplo superibus; pedunculo glabro petiolum aequante; bractea rotundata centro peltata subsessili; ovario postea semiimmerso, apice oblique acutato; stigmate puberulo.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 459.

Tallos erguidos, á veces trepadores en los arbustos, en seco angulosos lampiños, setuloso-hirsutos en los nudos; entrenudos hasta 10-12 cm. largos; hojas verticiladas, 3-4-nas; pecíolos 2-4 mm. largos, interiormente peloso-pubescentes; límbos 3-5 cm. largos, 2 cm. anchos, elíptico-lanceolados, acuminados en el ápice, angostados en la base y escurridos en el pecíolo, lateralmente ± asimétricos, membranáceos, pelúcido-punteados, muy brevemente pelosos en la página superior, finalmente (salvo en los nervios pubescentes) alampiñados, glaucescentes y lampiños en la inferior, apestañados en la mitad superior, triplínervios y reticulado-venosos; nervios todos prominentes en la página inferior; nervio central terminado en el ápice, los dos laterales superiores algo más abajo y los dos exteriores cerca de la mitad del límbo; nervio periférico tenue, aproximado al margen; amentos axilares y terminales en el tallo y en los ramos, tenuemente filiformes, laxifloros, 6-10 cm. largos; pedúnculos lampiños, 7-10 mm. largos, apenas 1 mm. gruesos; bráctea elíptica ó suborbicular, peltada en el centro; ovario semiimmerso, oval-oblongo, puntiagudo en el ápice; estigma diminuto, infra-apical delantero; baya subglobuliforme, apiculada, papilosa.

Crece en la región subandina y subtropical, cerca de S. Florencio y de Nieblí; colectada también por SPRUCE y por JAMESON.

## ADICIONES (PIPER)

23.\* P. pachyhyllum sp. nov. frutex 2-3-metralis; ramis petiolisque glabris, verruculosis; petiolis 3-4 cm. longis, usque ad limbi basin late alatis; limbis ovatis, apice acutis basi obtusis symmetricis vel leviter asymmetricis, 18-25 cm. longis, 12-15 cm. latis, dense coriaceis, supra glabris, bullato-rugosis, subtus, praesertim in nervis prominentibus, pubescenti-hirteilis, 11-plinerviis; nervis om-

nibus supra immersis, subtus prominentibus, centrali ad  $\frac{1}{2}$  usque in nervos II utrinque 5 diviso; *pedunculis* oppositifoliis, petiolas subaequantibus aut parum brevioribus; *amentis* 25-40 cm. longis, subcylindricis, apice obtusis; *bractea* cucullata, vix apice peltata, deorsum ± cuneata, dorso marginibusque hirsuta.

Arbusto 2-3 mt. alto; ramos lampiños, verrugosos; hojas pecioladas; *pecíolos* 3-4 cm. largos, lampiños, anchamente alados hasta la base del limbo, con el ala coriácea, libre de un lado y puntiaguda, oblicua; *limbos* aovados, puntiagudos en el ápice, redondeados en la base igual ó algo mayor de un lado, simétricos ó ligeramente inequiláteros, coriáceos, finamente pelúcido-punteados, lampiños y brillosos en la haz, pálidos y pubescentes en le envés, especialmente en los nervios, muy arrugados, 11-plinervios, con los nervios hundidos en la cara superior, prominentes en la inferior; *nervio medio* dividido hasta la mitad en 5 nervios II de ambos lados; *pedúnculo* lampiño ó muy finamente pubescente, igual ó algo más corto que el pecíolo; *amento* opsitólio, cilíndrico' densifloro, hasta 40 cm. largo; *bráctea* triangular-truncada en el ápice, apenas peltada, algo acuñada, vellosa en el dorso y en el margen; *estambres* 4; *baya* lenticular-elíptica, lampiña, truncada en el ápice, con 3 estilos muy cortos. (D. s. e. v.)

Crece en la montaña de Angamarca (11/900).

32.\* *P. stipulosum* sp. nov. fruticosum; *ramis* petiolisque verrucosis nervisque subtus brevissime puberulis; *petiolis* brevibus, fere ad apicem late foliaceo-alatis, alis caulem amplexantibus; *limbis* magnis, subellipticis, apice obtusis, basi cordatis, (lobis inaequalibus obtusis) dense membranaceis v. subcoriaceis, opacis, supra obscure viridibus, nervis venisque impressis, ample rugosis, subtus pallidioribus, nervis venisque prominentibus laxe reticulatis et alveolatis; *nervo centrali* usque ultra medium nervos II utrinque 5-6, spatiis inaequalibus seiunctos et in reticulum intra marginem evanescentes mitten-te.—(Inflorescentia ignota.)

Arbusto 1 m., ó poco más, alto; ramos crasos, nudosos; *entre nudos* 3-4 cm. largos ± 1 cm. gruesos, así como los pecíolos y nervios en la página inferior muy breve y finamente pubescentes y esparcidos (con los pecíolos y el nervio medio) de verrugas

fibrosas, mazudas, truncadas en el ápice; *pecíolos* 4-5 cm. largos, bialados, hasta 5-10 mm. debajo del limbo, con las alas membranáceas ó finalmente apergaminadas, rugosas, lampiñas, casi abrazadoras en la base, hasta 2 cm. anchas; *limbos* densamente membranáceos, con el tiempo coriáceos, opacos, lampiños, (salvo en los nervios y en la página inferior) los adultos algo escabros en la página superior, anchamente arrugados, verdeoscuros, 25-30 cm. largos, 10-15 cm. anchos, cerca ó poco más arriba de la mitad, elipsoídeos, inequiláteros, obtusos en el ápice, acorazonados en la base, con los 2 lóbulos retrorsos, obtusos, el mayor 2½-3 cm. largo (y casi otro tanto ancho) extendido sobre el pecíolo; el menor recto; *nervio central* dividido hasta sobre la mitad en 5-6 nervios laterales, dispuestos en espacios desiguales, ascendentes bajo ángulo muy agudo y resueltos en el retículo dentro del margen.—(Inflorescencia desconocida.) (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales de la Cordillera de *Antamarca* (II/900).

Especie afine, por el organismo vegetativo, al *P. Hydrolapathum* y al *P. regale* C. DC.

[Especie omitida en el lugar correspondiente.]

66.\* *P. scutellariaefolia* sp. nov. *glaberrima-foliis alternis petiolatis; petiolis subcylindricis, pupra 1-sulcatis; limbis late ovatis, acuminatis, basi leviter cordatis, dense herbaceo-membranaceis, supra intense viridibus, subtus glaucescentibus, utrinque glaberrimis, 7-pli-nerviis; nervis 2 supremis parum supra basin liberis et cum centrali in apicem convergentibus; pedunculis oppositifoliis; robustis, petiolum subaequantibus, circa medium articulatis et unifoliolatis, in ¼ superiore 1-bracteatis; amentis solitariis gracilibus, cylindricis; (in specimine unico quod prostat) 7 cm. longis, 2½ mm. crassis; bractea discoidea, centro peltata; antheris maiusculis, albis; ovario immerso, antice oblique stigmatífero; bacca oblonga, muriculata, uncinato-rostrata.*

*Planta* muy lampiña; *tallo* prostrado, radicante, suculento, ligeramente anguloso; *hojas* alternas, pecioladas; *pecíolos* cilíndricos, 1-sulcados interiormente, 4-6 cm. largos; *limbos* anchamente aovados, ligeramente acorazonados en la base, puntiagudos en el ápice, 5-8 cm. largos, 3-6 cm. anchos, membranáceo-jugo-

sos, intensamente verdes en la cara superior, pálidos en la inferior, 7-plinervios, con los 2 nervios superiores libres á poca distancia de la base y convergentes con el central en el ápice; pedúnculos opositifolios, ± al pecíolo robustos, articulados y unisoliolados cerca de la mitad y con una bráctea en la  $\frac{1}{4}$  parte superior; amentos solitarios, delgados, cilíndricos, (en el ejemplar único que tenemos) 7 cm. largos,  $2\frac{1}{2}$  mm. gruesos; bráctea orbicular, peltada en el centro anteras grandes, blancas; ovario inmerso con el estigma infra-apical oblicuo; baya oblonga, muriculada, terminada en pico largo ganchudo.

Crece en los bosques subtropicales de Nanegal y de Gualea.

Especie semejante, en cuanto á la forma de las hojas, á las *P. albovittata* y *P. rupicola* C. DC., de las cuales difiere por el tallo echado, radicante en toda su extensión, por ser lamiña en todas sus partes, por los amentos solitarios y por la forma del ovario y de la baya.



(Continuará).

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL