

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



ANTURIOS ECUATORIANOS
(GEN. ANTHURIUM SCHOTT. ORD. AROIDEAS)
ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL
POR EL R. P. J. SODIRO, S. J.

(Continuación de la Serie XV, Nº 112, pág. 394)

Tallo ascendente rastrero, 5-7 mm. grueso; *entrenudos* muy cortos 1-1½ cm. largos; *catafilos* linear-lanceolados, papiráceos, persistentes, enteros, 10-15 cm. largos; *pecíolos* gráciles, muy brevemente vaginados en la base, sulkados ó angulosamente-sulkados interiormente, 15-20 cm. largos; *articulación* algo abultada, 8-10 mm. larga; *limbos* membranáceo-papiráceos, pálidamente verdes, no punteados, elípticos, 15-28 cm. largos, 8-10 cm. anchos,

truncados ó algo puntiagudos en la base y contraídos bruscamente en el ápice en cúspide linear-mucronada, 10-12 mm. larga; *pedúnculo* 5-8 cm. más largo que el pecíolo y más gracil, así como la espata, salpicados de puntos oscuros; *espata* lanceolada, puntiaguda, 4 cm. larga, 1 cm. ancha; *espádice* sesil, cilíndrico, arqueado, poco más largo que la espata; *tépalos* amarillentos, poco más largos que anchos. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques húmedos subandinos, cerca de *San Florencio*, 1.600 metros.

b *Espádice* evidentemente (8-10 mm.) estipitado;

1 *Espata* verde angostada desde la base hacia arriba, más larga que el espádice.

31. A. lepturum Sod. *caudice* tenui ascendente vel scandente; *internodiis* 2-3 cm. longis cum aliis $\frac{1}{2}$ brevioribus alternantibus; *catuphyllis* linearibus tenuibus, mox frustatim deciduis; *petiolis* tenuibus limborum $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ partem aequantibus, supra 1-sulcatis, in sicco angulosis geniculo mediocri instructis; *limbis* oblongo-ellipticis, basi obtusis, apicem versus nonnihil angustatis et in cuspidem linearem mucronatam productis, latitudine sua 3-4 pllo longioribus, membranaceis vel ± papyraceis, pellucido-punctatis, supra viridibus, subtus viridi-glaucuscescentibus; *nervis* subtus prominulis, 11 utrinque 12-15, omnibus, vel 2 basilaribus infimis exceptis, in nervum collectivum a margine remotum confluentibus; *pedunculo* tenui petiolum superante; *spatha* linear-lanceolata acuta, quam spadix parum breviore; *spadice* longiuscule stipitato subcylindrico, viridi-flavido; *tepalis* latis; *ovario* fere obovato, apice truncato.

Tallo tenue, ascendente ó trepador radicante, metro y más largo; *entrenudos* alternativamente 3-4 y 1-1 $\frac{1}{2}$ cm. largos, blanquecinos; *catafilos* lineares, puntiagudos y mucronado-aristados en el ápice, 6-7 cm. largos, prontamente descompuestos y caedizos; *pecíolos* delgados, 1-sulcados interiormente, con articulación 5-6 mm. larga, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ más cortos que los limbos; *limbos* oblongo-elípticos obtusos (á veces algo puntiagudos) en la base, adelgazados en la $\frac{1}{3}$ parte superior y prolongados en el ápice en cúspide linear mucronadada, 18-30 cm. largos, 6-7 cm. anchos hacia la mitad, membranáceos ó ± (con la edad) densamente pírráceos, bajo el lente finamente pelúcido-punteados, verdes en la haz, blanquecinos en el envés; *nervios* todos impresos en la pá-

gina superior, prominentes en la inferior; los II 12-15 de cada lado, erecto-patentes, ascendentes, terminados, salvo 1-2 basales de cada lado, en el nervio colectivo, distante 6-8 mm. del margen, acompañado de otro marginal paralelo bastante sensible; *pedúnculo* delgado, ± doble más largo que el pecíolo; *espata* linear-lanceolada, alesnada en el ápice, más corta que el espádice, herbácea, oblicuamente insertada, escurrida del lado interior, *espádice* [con estípite 6-8 mm. largo] cilíndrico, obtuso en el ápice, 3½-4½ cm. largo, 3-4 mm. grueso al tiempo de la floración, verde-amarillento; *típalos* algo más anchos que largos; *ovario* globular-trasovado, algo cónico en el ápice (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos occidentales del *Pichincha* (2.900).

2 Espata verde-amarillenta, más ancha hacia la mitad, de ordinario más corta ta que el espádice.

32. A. porrectum? Schott. *caule* tenui adscendente; *internodiis* longiusculis, supremis brevibus; *cataphyllis* linearibus elongatis, mox stuppe resolutis; *petiolis* basi breviter vaginatis, sulcatis; *geniculo* brevi sulcato instruc-tis; *limbis* lanceolatis v. oblongo-lanceolatis, quam petioli 2-plo longioribus, basi acutiusculis, obtusis aut ± retusis, membranaceo-papyraceis, impunctatis, apice subito in cuspidem linearem productis; *nervis* lateralibus i approxi-matis, erecto-patentibus, omnibus (2 infimis exceptis) in nervum collectivum intramarginalem confluentibus; *pe-dunculo* anguloso, fusce punctato, petiolum plerumque superante; *spatha* lanceolata acuta vel acuminata, extus fusce punctata, spadicem breviter stipitatum flavescentem aequante vel eo parum breviore.

Schott *Prodr.* p. 444. Engler loc. cit. p. 382, Id. in DC. Suit. au *Prodr.* II, p. 112.

Caule ascendente ó brevemente trepador; *entrenudos* 2-3 cm. largos, 5 mm. gruesos; *catafilos* lineares, ténues, 8-10 cm. largos, cartilagíneos, punteados, finalmente resueltos en fibras estoposas; *pecíolos* gráciles, vaginados en la base, angulosos anteriormente, 10-15 cm. largos; *articulación* mediana, asurcada anteriormente; *limbos* membranáceos, papiráceos, no punteados, pálidamente verdes, oblongo-lanceolados, prolongados gradualmente hacia el ápice, acuminado ó cuspidado, puntiagudos ó redondeados en la base, 20-25 cm. largos, 5-6 cm. anchos; *nervios* laterales II 12-

15 de cada lado, ascendentes todos, menos los 2 inferiores, reunidos en el nervio colectivo, distante 2-3 mm. del margen; *pedínculos* poco más largos que los pecíolos, endebles, angulosos y, así como la espata, esparcidos de puntos negruzcos, muy finos; *espata* lanceolada, puntiaguda, ± largamente cuspida; *espádice* provisto de estípite, 3-4 mm. largo, amarillento, cilíndrico, igual ó poco más largo que la espata.

Crece en los bosques tropicales; cerca de *San Nicolás*.

B *Limbos* angostados desde la ~~1/3-1/4~~ parte inferior hacia el ápice;

a *Pedúnculo* más largo que el pecíolo;

i *Limbos* obtusos ó subtruncados en la base; *espádice* brevemente estipitado, = 6 más largo que la espata.

33. *A. Nanegalense* Sod. *caudicis tenuis internodiis elongatis glaucescentibus; cataphyllis anguste linearibus, mox destructis; petiolis tenuibus* *limbos subaequantibus basi breviter vaginatis, supra geniculoque bi-sulcatis; geniculo elongato tumido; limbis membranaceis, supra viridibus, subtus glaucescentibus, ovato-lanceolatis, apice acuminatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus; nervis omnibus subtus prominentibus, II, infimis exceptis, in nervum collectivum a margine remotum confluentibus; pedunculis gracilibus, petiolos superantibus; spatha lanceolata basi antrorsum aperta, quam spadix parum breviore; spadice breviter stipitato, tenui subcylindrico, 4-6 cm. longo, flavescente viridi; tepalis aequa fere longis ac latis.*

Tallo gracil trepador; *entrenudos* 5-7 cm largos, ± 6-8 mm. gruesos, blanquecinos; *catafilos* angostamente lineares, ténues, prontamente deshechos y caedizos; *pecíolos* 12-15 cm. largos, brevemente vaginados en la base, casi cilíndricos, interiormente, así como la articulación, ligeramente bi-sulcados; *articulación* abultada, 1-1 1/2 cm. larga; *limbos* oval-lanceolados, redondeados ó algo escotados en la base, acuminados en el ápice, 15-20 cm. largos, 7-9 cm. anchos, tenuemente membranáceos, verdes en la cara, glaucescentes en el envés; *nervios* todos prominentes en la cara inferior, los II, salvo 1 ó 2 de los inferiores, confluentes en el nervio colectivo, distante 8-10 mm. del margen; *pedúnculo* delgado, erguido, 3-5 cm. más largo que el pecíolo; *espata* linear-lanceolada, abierta y escurrida en la base, acuminada y alesnada en el ápice; *espádice* brevemente (2-3 mm.) estipitado, casi ci-

líndrico, 4-6 cm. largo, 3-4 mm. grueso, verde-amarillento; *tépalos* algo más anchos que largos. [D. s. e. v.]

Crece en los bosques de *Gualea*.

2 *Limbos* escotados en la base;

* *Espádice* largamente estipitado, = ó más corto que la espata.

34. A. retusum Sod. *caudice* tenui scandente radicante; *internodiis* longulis glaucescentibus; *cataphyllis* linearibus, tenuiter cartilagineis, mox decompositis deciduis; *petiolis* tenuibus, antice (geniculoque brevi marginato) 1-sulcatis, quam limbi 1½-plo brevioribus; *limbis* e basi subtruncata retusa ovato-lanceolatis, apice in cuspidem linearem productis, latitudine sua subduplo longioribus, tenuiter membranaceis, viridibus; *nervis* subtus exertis, II utrinque 12-15 ± arcuato-ascendentibus, infimis utrinque 1-2 exceptis, in nervum collectivum margini approximatum confluentibus; *pedunculo* tenui petiolum subduplo superante; *spatha* linear-lanceolata, tenuiter herbacea, spadicem aequante v. superante; *spadice* longe [10-15 mm.] stipitato, cilíndrico, tenui viridi-flavesciente.

Tallo endeble, largamente trepador, radicante de los nudos; *entrenudos* 5-10 cm. largos, 3-4 mm. gruesos, blanquecinos; *cafasilos* tenuemente cartilagíneos, rápidamente descompuestos y caedizos, lineares-alesnados, 6-7 cm. largos; *peciolos* ténues 1-sulcados, 10-12 cm. largos, con articulación 5-8 mm. larga, plano-convexa, angostamente marginada, por la base escurrida del limbo; *limbos* oval-lanceolados, escotados ó casi truncados en la base, gradualmente angostados desde la ⅓ inferior hacia el ápice, largamente acuminados, 15-18 cm. largos, 6-7 cm. anchos, tenuemente membranáceos, verdes de ambos lados; *nervios*, finos, prominentes en el envés, los II (12-15 de ambos lados), arqueados ascendentes y, salvo uno ó dos de los inferiores de cada lado, todos confluentes en el nervio colectivo, distante 2½-3 mm. del margen; *pedínculos* gráciles, ± doble más largos que los peciolos; *espata* tenuemente herbácea, linear-lanceolada 5-5½ cm. larga, 4-5 mm. ancha, gradualmente adelgazada hacia el ápice; *estípite* filiforme 10-15 mm. largo; *espádice* tenué cilíndrico, 4-5 cm. largo, durante la floración 3-3½ mm. grueso, verde-amarillento. [D. s. e. v.]

Crece en los bosques occidentales de la cordillera de *Angamarca*.

** Espádice subsesil, casi igual á la espata.

35. A. *tenuicaule* Engler. *caudiculi tenuis internodiis longiusculis; cataphyllis internodia velantibus, mox decompositis; petiolis quam limbi brevioribus, breviter geniculatis; limbis subcoriaceis, e basi ovata atque emarginata lanceolatis, in acumem angustatis, nervis lateribus 1 utrinque círciter 10. infimis 1-2 in marginem exentibus, reliquis adscendentibus in nervum collectivum antemarginalem coniunctis; pedunculo tenui, petiolum superante; spatha lanceolata, acuminata, spadicem subaequante; spadice subcylindrico, subsessili pallide-viridi; tépalis latitudine sua paullo longioribus; ovario ovoideo in stylum conoideum attenuato.*

Engler loc. cit. p. 381.

Tallo endeble, hasta $1\frac{1}{2}$ metro alto; *entrenudos* 2-3 cm. largos \pm 1 cm. gruesos; *catafilos* $2\frac{1}{2}$ -3 cm. largos, prontamente descompuestos; *peciolos* de las hojas mayores \pm 1 dm. largos, brevemente articulados; *limbos* subcoriáceos, aovados y algo escotados en la base, superiormente lanceolados, angostados en la punta, $1\frac{1}{2}$ -2 dm. largos, 4-7 cm. anchos hacia la base; *nervios* laterales 1 \pm 10 de cada lado del central, ascendentes, 1-2 de los inferiores escurridos en el margen, los demás confluentes en el nervio colectivo, distante 3-5 mm. del margen; *pedúnculo* gracil $1\frac{1}{2}$ -2 dm. largo; *espata* lanceolada-acuminada, 5 cm. larga, 12 mm. ancha; *espádice* subcilíndrico, pálidamente verde, brevemente [1-2 mm.] estipitado, 5 cm. largo, 5 mm. grueso; *tépalos* poco más largos que anchos; *ovario* ovoideo, contraído en el ápice en estilo cónico.

Crece en los bosques húmedos, cerca de *Chacayacu* en las pendientes occidentales de los Andes de la provincia de *Cuenca*, colectada por *Lehmann*.

b *Pedúnculo* más corto que el pecíolo; *espádice* sesil ó subsesil;

1 *Limbos* aovados, = ó poco más largos que los peciolos.

36. A. *nemorale* Sod. *caudice* scandente; *internodiis longis crassiusculis; cataphyllis* tenuibus, linear-lanceolatis, mox decompositis; *petiolis* subteretibus, *limbos* subaequantibus, introrsum 1-sulcatis, geniculó brevi marginato instructis; *limbis* ovalibus, latitudine sua plus duplo longioribus, basi obtusis, e $\frac{1}{3}$ inferiore sursum linea con-

vexa gradatim angustatis, apice in cuspidem linearem productis, papyraceis, supra viridibus subtus glaucescentibus; nervis lateralibus 1 utrinque 12-18 erecto-patentibus, subtus exertis, in nervum collectivum a margine remotum (infimis utrinque 2 exceptis) confluentibus; pedunculis quam petioli brevioribus, rigidis; spatha linear-lanceolata, quam spadix breviore; spadice parvo breviter [2-3 mm.] stipitato, subcylindrico, flavo-virente; tepalis latitudine sua parum longioribus; ovario late ovato, ápice conico producto.

Tallo medianamente robusto, trepador, radicante en los nudos; entrenudos 6-8 cm. largos, 6-8 mm. gruesos, lisos blanquecinos; catáfilos 6-7 cm. largos, linear-lanceolados, cartilagíneos, frágiles, prontamente descompuestos y caedizos; pecíolos 12-15 cm. largos, rollizos, interiormente 1-sulcados, brevemente vaginados en la base; articulación 6-7 mm. larga, anteriormente plana y algo marginada en los lados; limbos ovalados 15-20 cm. largos, 6-8 cm. ancho, en la $\frac{1}{3}$ parte inferior y de allí angostados [por líneas convexas] gradualmente hacia el ápice, prolongado en cúspide linear mucronada, \pm 20 mm. larga, papiráceos ó membranáceos, verdes en la haz, blanquecinos en el envés; nervios laterales 1 prominente en la página inferior, 12-18 de cada lado, erecto-patentes (salvo los 2 inferiores) confluentes en el nervio colectivo distante 5-7 mm. del margen; pedúnculos poco más cortos que los pecíolos, rígidos, algo comprimidos de los lados; espata linear-lanceolada, puntiaguda, brevemente escurrida, 3 cm. larga, 4-5 mm. ancha; espádice brevemente (2-3 mm.) estipitado, cilíndrico ó cilindráceo obtuso, amarillento-verduzco, (todavía tierno) 4 cm. largo, 4-5 mm. grueso; tépalos poco más largos que anchos; ovario casi globuloso, prolongado en el ápice en el estilo cónico. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichinchá hacia Gualea (10/ 1900).

² Limbos truncados ó acorazonados, raro puntiagudos en la base;

* Limbos más ó menos 3-plo más largos que anchos;

† Limbos casi truncados en la base; pedúnculo robusto estriado; espádice se-sil, craso, cilindráceo, entrenudos muy cortos.

37. A. striolatum Sod. caule ascendente e nodis radicante; internodiis brevibus; cataphyllis late lanceolatis, internodia pluries superantibus, mox resolutis; petiolis basi

incrassata subcontiguis, intus breviter vaginatis, quam limbi brevioribus, subcylindricis, cum geniculo longulo, nervo medio et pedunculo angulato-striatis, purpurascens-tibus; *limbis* cartilagineo-membranaceis, supra intense viridibus, subtus pallidioribus, ex basi subtruncata retusa anguste ovali-lanceolatis, apice acuminatis, latitudine sua sub 3-plo longioribus; *lobis* basalibus brevissimis obtusis; *nervis* II omnibus e basi liberis subtus prominulis acietatis, infimis [2-3] approximatis in margine desinentibus, ceteris 20-15 mm. remotis, in nervum collectivum margini approximatim confluentibus; *pedunculo* petioli $\frac{1}{2}$ ± aequante; *spatha* ignota; *spadice* sessili subcylindrico, robusto, erecto, viridi; *tepalis* cuneatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus; *ovario* oblongo, subtetragono.

Tallo ascendente ó brevemente trepador en los troncos vetustos, radicante de los nudos; *entre nudos* muy cortos, 10-15 mm. gruesos; *catafilos* anchamente lanceolados, 10-15 cm. largos, prominentemente descompuestos; *pecíolos* aproximados, brevemente (2-3 cm.) envainadores, medianamente robustos, 25-35 cm. largos, casi cilíndricos y así como la articulación ($1\frac{1}{2}$ -2 cm. larga), el nervio medio y los pedúnculos, estriados, angulosos cuando secos; *limbos* cartilagineo-membranáceos, intensamente verdes en la haz, más pálidos en el envés, cóncavos en la base, ovalados ó oblongo-lanceolados, acuminados en el ápice, 35-45 cm. largos, 12-15 cm. anchos en la $\frac{1}{3}$ parte inferior y de allí gradualmente angostados hacia el ápice; *lóbulos* basales muy cortos, 2-3 nervios libres en la base y terminados en el margen; *nervio* medio sobre-saliente de ambos lados, los II tenues, prominentes y afilados en el envés, erecto-patentes, distantes 10-15 mm. uno de otro, terminados en el nervio colectivo, 2-3 mm. dentro del margen; *pe-dúnculo* ± = á la mitad del pecíolo; *espata* (en la muestra única que tenemos á la vista ya caída), abrazadora en la base y reflejada; *espádice* sesil, casi cilíndrico, erguido, rígido verde (después de la floración) 8 cm. largo, 10 mm. grueso; *tépalos* linear-acuñados, doble más largos que anchos; *filamentos* lineares, poco más largos que los tépalos; *ovario* oblongo, casi tetrágono algo angostado en el ápice y terminado en el estigma algo cabezudo. (D.s.e.v.)

Crece en los bosques de *Angamarca*. [11/ 1899].

† Limbos puntiagudos, obtusos, ó casi acorazonados en la base; pedúnculo y espata tenuis; catafilos 10-15 cm. largos.

38. A. ochreatum Sod. *caudice* ascendente radicante *internodiis* longulis; *cataphyllis* linearibus elongatis, pe-

tiolis erecte adpressis, mox marcescentibus; petiolis subteretibus, antice sulcatis [in sicco angulosis] basi breviter vaginatis, limbos superantibus, minutissime punctulato-scaberulis; limbis ovato-ellipticis, basi subcordatis, apice acuminatis, latitudine sua subduplo longioribus, membranaceis, praesertim subtus, viridi-glaucescentibus; nervis II approximatis, subparallelis, erecto-patentibus, omnibus vel uno alterove ex infimis excepto, in nervum collectivum crassiusculum confluentibus; pedunculo quam petiolus breviore; spatha linear-lanceolata, apice acuminata, spadicis sessilis, cylindrici, obtusi dimidium aequante.

Tallo ascendente ó brevemente trepador, radicante en los nudos; *entrenudos* 3-6 cm. largos, 8-10 mm. gruesos, blanquecinos; *catafilos* linear-lanceolados, 15-18 cm. largos, estrictamente envueltos al rededor de los pecíolos, prontamente marcescentes, finamente estriados y así como los pecíolos, nervios y los limbos en el envés, esparcidos de puntos blanquizcos muy finos; *pecíolos* casi rollizos, interiormente I-sulcados, angulosos cuando secos, brevemente envainadores en la base, 25-40 cm. largos; *limbos* aovado-elípticos, + doble más largos que anchos, truncados y ligeramente acorazonados en la base, terminados en el ápice en cúspide alesnada puntiaguda 2-2½ cm. larga, membráceos, pelúcido-punteados, blanquecinos en el envés; *nervios* todos prominentes en la página inferior, los II erecto-patentes, distantes 4-6 mm. uno de otro y todos ó salvo uno ó dos de los basilares, terminados en el nervio colectivo, distante 3-5 mm. del margen; *pedúnculo* gracil, casi mitad más corto que el pecíolo; *espata* linear-lanceolada, cuspidado-alesnada, herbácea, lívido-punteada interiormente, casi doble más corta que el espádice al tiempo de la floración; *espádice* sesil ó subsesil, cilíndrico, obtuso, 7-9 cm. largo, 4-5 mm. grueso, cobrizo ó anaranjado. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Nanegal y de Gualea.

** *Limbos* más ó menos doble más largos que anchos, acorazonados ó escotados en la base; *pedúnculo* más ó menos doble más corto que el pecíolo.

39. A. Hieronymi Engler; *caudice* subscandente; *internodiis* longiusculis; *cataphyllis* brevibus integris, sero deciduis; *petiolis* subcylindricis, antrorsum canaliculatis, limbos aequantibus vel superantibus; *limbis* subcoriaceis, ovato-vel subelliptico-lanceolatis, basi leviter cordatis, ab infima ¼ sursum longe angustatis; *nervis* lateralibus I

valde numerosis, infimis in marginem exeuntibus, reliquis in nervum collectivum a margine remotum coniunctis; *pedunculo* $\frac{1}{2}$ circiter petioli aequante; *spatha* linear-lanceolata, acuminata quam spadix paullo breviore; *spadice* subsessili.

Engler loc. cit. p. 386.

Tallo ± trepador; *entrenudos* 4-5 cm. largos; *catafilos* 5 cm. largos, enteros, ± persistentes; *pecíolos* $3\frac{1}{2}$ -4 dm. largos, acanalados interiormente; *limbos* poco más cortos que los pecíolos, 15-17 cm. anchos, subcoriáceos, aovado-ó casi elíptico-lanceolados, angostados desde la $\frac{1}{4}$ parte inferior hacia el ápice, ligeramente acorazonados en la base; *nervio* central semicilíndrico en el dorso; *nervios* laterales numerosos, paralelos entre sí, distantes ± 1 cm. uno de otro, erecto-patentes, reunidos, salvo los 2 ó 3 inferiores, en el nervio colectivo, distante 6-8 mm. del margen; *pedúnculo* ± = á la mitad del pecíolo; *espata* linear-lanceolada 6-7 cm. largo, 5 mm. larga, 1 cm. ancha; *espádice* subsesil, 6-7 cm. largo, 5 mm. grueso.

Crece en los bosques subtropicales en el valle de Mindo y cerca de San Nicolás, entre 900-1200 metros.

D *Tallo* y *entrenudos* como en C. *Limbos* verdes, apergaminados ó coriáceos; *catafilos* apergaminados, persistentes; *pedúnculos* más largos que los *pecíolos*;

A *Espádice* sesil ó subsesil, cilíndrico, erguido, rígido;

a *Espádice* amarillento; *limbos* lanceolados, 4-5 veces más largos que anchos.

40. A. Fraseri Engler; *caudice* radicante scandente; *internodiis* longiusculis; *cataphyllis* lanceolatis, acutis, sero resolvendis, internodia aequantibus aut brevioribus; *petiolis* semicylindricis, basi dilatatis, internodia superantibus; *geniculo* longulo instructis, quam limbi sub 3-plo brevioribus; *limbis* coriaceis, elongato-lanceolatis, basi contractis, apice gradatim acuminatis, longitudine sua sub 5-plo longioribus; *nervis* lateralibus creberrimis, i quam 11 vix validioribus, infimis utrinque pluribus in margine evanescientibus, ceteris in nervum collectivum margini approximatim confluentibus; *pedunculo* robusto, rígido, petiolum 2-3-plove superante; *spatha* linear-lanceolata, acuta; *spadice* breviter stipitato, cylindrico, obtuso, flavescente, spatham parum superante.

Engler in DC. Suites au Prodr. II p. 112 et Beiträge, . . . loc. cit. p. 377.

Terrestre y epífito; *tallo* (ó ramos) trepador y radicante de los nudos; *entrenudos* 6-12 cm. largos, 6-7 mm. gruesos, estriados; *catafilos* lineares enteros, finalmente solubles y caedizos, 10-12 cm. largos; *pecíolos* 10-12 cm. largos, interiormente asurcados; *articulación* 7-9 mm. larga, algo más gruesa que el pecíolo; *limbos* 25-30 cm. largos, 5-7 cm. anchos, obtusos ó brevemente acunados en la base y gradualmente angostados desde la $\frac{1}{3}$ ó $\frac{1}{4}$ parte inferior hacia el ápice mucronado, rígidamente cartilagíneos; *nervio* medio medianamente robusto, los laterales I poco más gruesos que los II; los inferiores (hasta 3 cm. de la base) terminados en el margen; *pedúnculos* 25-30 cm. largos, cilíndricos, erguidos, rígidos, 2-3 mm. gruesos; *espata* linear-lanceolada, 8-10 cm. larga, 10 mm. ancha hacia la mitad; *espádice* subsesil, cilíndrico, obtuso, 1-3 cm. más largo que la espata, 6-7 mm. grueso.

Crece en el valle de *Pallatanga*, cerca de *San Jorge*, y en las faldas del *Guanaxa*, en la orilla del R. *Pilatón*, colectada también por *Fraser*.

b *Espádice* craso purpúreo; *limbos* ~~ovado-elípticos~~, $\frac{1}{2}$ -doble más largos que anchos.

41. *A. sarmentosum* Engler; terrestre scandens; *ramis* elongatis, fistulosis; *internodiis* cylindricis elongatis; *cataphyllis* lanceolatis, acutis, integris, sero resolvendis, quam internodia parum brevioribus; *petiolis* basi dilatatis, intus cunaliculatis, quam internodia brevioribus; *genicula* longulo, leviter inflato; *limbis* ovatis vel ovato-ellipticis, basi \pm rotundatis, apice breviter et abrupte, nunc longius, acuminatis, coriaceis, impunctatis; *nervis* lateralibus I validis, patentibus infimis (utrinque 2-3) liberis, caeteris in nervum collectivum a margine \pm remotum confluentibus; *pedunculis* petiolos 2-3-plove superantibus, quam internodia plerumque longioribus; *spatha* lancealata, acuta; *spadice* breviter stipitato, cilíndrico, obtuso, atro-purpureo, spatham 2-plo superante; *tepalis* latitudine sua subdupo longioribus; *bacca* oblonga in apicem pyramidatum tetragonum producta, miniata.

Engler loc. cit. p. 375.

a brachypodium var. nov., *pétiolis* (geniculo inclusu) $2\frac{1}{2}$ -3 cm. longis; *spadice* (anthesi ineunte), tenui cylindrico, 10-13 cm. longo, quam spatha late linearis, duplo longiore; *limbis* ut in forma typica.

β ficiifolium var. nov. *foliis* angustioribus longioribusque, ovali-lanceolatis sursum gradatim angustatis, basi subacutis, nervis 11, etiam inferioribus, in nervum collectivum margini approximatum confluentibus; *spatha* linear-lanceolata; *spadice* subsessili, quam in typo longiore.

Terrestre, trepador; *ramos* largos, sarmentosos, fistulosos; *entrenudos* 8-12 cm. largos, 6-8 mm. gruesos, cilíndricos, lisos; *catafilos* lanceolados, puntiagudos, enteros, finalmente solubles, poco más cortos que los entrenudos y estrechamente aplicados á ellos; *pecíolos* enanchados en la base, inclusa la articulación (1 cm. larga) 4-6 cm. largos, angulosos, *limbos* aovados, obtusos en la base, breve y bruscamente acuminados en el ápice, 15-20 cm. largos, 7-12 cm. anchos en la $\frac{1}{3}$ parte inferior, coriáceos, lustrosos, no punteados; *nervio medio* robusto, los laterales 1 distantes 10-12 mm. uno de otro, los 2-3 inferiores (de cada lado) terminados en el margen; *nervio colectivo* interior, distante 5-10 mm. del margen, el exterior marginal; *pedúnculo* 10-15 cm. largo; *espata* lanceolada, 4-7 cm. larga, 10-15 mm. ancha, obtusa, cartilaginea; *espádice* sesil, cilíndrico, obtuso, purpúreo, 6-12 cm. largo, 5-10 mm. grueso; *tépalos* ± doble más largos que anchos, purpúreos; *baya* subtrígona, piramidada en el ápice de color de minio.

Crece en los bosques subtropicales en la orilla del R. Pilatón entre el m. Guanaxa y San Florencio, 1000-1300 metros.

a brachypodium *pecíolos* (inclusa la articulación igual ó poco más corta que ellos) $2\frac{1}{2}$ -3 cm. largos, membranáceo-marginados; *limbos* oval-elípticos, largamente cuspídos y mucronados en el ápice; *pedúnculos* 12-15 cm. largos; *espata* anchamente linear, 6-7 cm larga obtusa apiculada; *estípite* breve craso; *espádice* al principio de la floración 12-18 cm. largo, 3-4 mm. grueso.

β ficiifolium *limbos* más angostos y más largos, oblongo-elípticos, angostados gradualmente hacia arriba, algo puntiagudos en la base; *nervios* laterales 1 [aun los inferiores] confluentes en el colectivo, distante 3-4 mm. del margen; *espata* linear-lanceolada; *espádice* más largo que en la forma típica.

B Espádice sesil tenue, flexible; pecíolos 3-5 veces más cortos que los entrenudos.

a Limbos casi elípticos, doble más largos que anchos.

42. A. aristatum Sod. *caule* (ramisque) longe scandente robusto, fistuloso; *cataphyllis* lanceolatis, diu integris persistentibus, quam internodia elongata parum brevioribus; *petiolis* brevibus, ab latere compressis, supra planis marginatis, quam internodia et limbi pluries brevioribus; *limbis* papyraceis, ovato-ellipticis, basi rotundatis, apice abrupte breviterque cuspidatis, aristatisque, pellucido-punctatis, latitudine sua plus duplo longioribus; *nervis* II subtus prominulis patulis 10-15 mm. ab invicem remotis, omnibus, praeter duos infimos, in nervum collectivum late intramarginalem confluentibus; *pedunculis* erectis-rigidis, sub anthesi internodia et folii dimidium subaequantibus; *spatha* linear-lanceolata chartacea, quam spadix plus duplo breviore; *spadice* sessili, tenui, elongato, cylindrico, purpureo-nigrescente.

Tallo y ramos, largamente trepadores huecos; *entrenudos* 10-15 cm. largos, 8-10 mm. gruesos; *catafilos* lanceolados, obtusos y mucronado-aristados en el ápice, cartilagíneos, largamente persistentes; *pecíolos* 2-3 cm. largos (inclusa la articulación 6-8 mm. larga) interiormente planos, marginados, con vagina basilar muy corta; *limbos* grandes papiráceos, en seco (así como los ramos y los catafilos) cobrizos, esparcidos de puntos finos y glándulas pelúcidas, aovado-elípticos, obtusos en la base brusca y brevemente cuspidados y aristados en el ápice, 20-30 cm. largos, 8-12 cm. anchos; *nervios* II patentes, apartados 10-12 mm. uno de otro, confluentes, salvo uno ó dos de los inferiores de cada lado, en el nervio colectivo, distante 8-12 mm. del margen; *pedúnculo* erguido, rígido, 12-15 cm. largo; *espata* linear-lanceolada, cartácea persistente, 6-8 cm. larga, \pm 1 cm. ancha en la base; *espádice* sesil, cilíndrico, rígido, negro-purpúreo, 12-18 cm. largo, 3 mm. grueso al principio de la floración (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales de Nanegal (1/ 1901).

Por la robustez de los tallos y forma de los limbos, se aproxima al A. *sarmentosum*, mas se diferencia por las proporciones del pecíolo y del espádice; del A. *subandinum* y del A. *Mindensc*, á los cuales se acerca en lo tocante al espádice y á los puntos y glándulas del limbo; se distingue del 1º por la forma de los limbos y el nervio colectivo mucho más distante del margen, del 2º,

además, por el pecíolo mucho más corto. Es la especie más notable de este grupo.

b *Limbos* oblongo-lanceolados, más ó menos 3 veces más largos que anchos.

43. A. *subandinum* Engler; terrestre scandens; *ramis cylindricis*, fistulosis; *internodiis elongatis*; *cataphyllis integris*, persistentibus, parum infra apicem dorso aristatis, quam internodia brevioribus; *petiolis canaliculatis* quam limbi et internodia multoties brevioribus; *geniculis crassis*, intus sulcatis elongatis; *limbis tenuibus*, oblongo-lanceolatis, basi obtusis, apice acuminatis latitudine sua \pm 3-plo longioribus, papyraceis, impunctatis; *nervis lateribus* i valde numerosis, patentibus in nervum collectivum a margine remotum coniunctis; *pedunculo* folii $\frac{1}{2}$ subaequante; *spatha linearis acuta*; *spadice sessili*, myosoideo, atro-purpureo, spatham 2-4-plo superante; *baccis globuliformi-depressis*, maturis intense miniatis.

Engler, Beitraege p. 387.

Terrestre, largamente trepador; *ramos* cilíndricos, lisos, fistulosos; *entrenudos* 6-10 cm. largos, 6-10 mm. gruesos; *catafilos enteros*, lanceolados, cartilagíneos, ∞ -nervios, puntiagudos, mucronado aristados en el dorso, poco debajo del ápice; *pecíolos* 1 $\frac{1}{2}$ -3 cm. largos, interiormente acanalados cuando secos; *articulación* abultada, 3-8 mm. larga; *limbos* elíptico-oblongos, ó aovado-elípticos, 15-25 cm. largos, 5-8 cm. anchos, cerca de la mitad, subobtusos en la base, breve y bruscamente acuminados en el ápice, tenuemente coriáceos, no punteados; *nervio* medio robusto, carinado inferiormente; *nervios* laterales 1 distantes 5-8 mm. uno de otro, alternos con otros secundarios más finos y todos confluentes en el nervio colectivo, distante 2-3 mm. del margen, el marginal tenue; *pedúnculos* angulosos, gráciles, 12-15 cm. largos; *espata* linear-lanceolada, acuminada, membranácea, verde ó colorada, 6-8 cm. larga, 5 mm. ancha, hacia la mitad; *espádice* sesil, cilíndrico, purpúreo, 18-25 mm. largo, 3-4 mm. grueso, *tépalos* intensamente purpúreos; *baya* globulosa, deprimida en el ápice, madura de color de minio ó de cinabrio. (D. s. e. v.)

Crece en el valle de Mindo, 1,200 metros.

C *Espádice* estipitado, tenue, flexible; *pecíolos* = ó más largos que los entrenudos; *limbos* subelípticos, cuspidados.

44. A. *Mindense* Sod. *caudice* scandente; *internodiis elongatis*, crassiusculis; *cataphyllis lanceolatis*, integris,

persistens, internodia superantibus; *petiolis* intus sulcatis, internodia = v. superantibus, quam limbi sub 3-plo brevioribus; *geniculo* longiusculo, tumido, antrorsum sulcato; *limbis* oblongo-ellipticis, papyraceis, basi acutis, apice abrupte contractis et in cuspidem elongatam productis; *nervis* lateralibus, 1 subpatentibus, arcuatis in nervum collectivum 3-4 mm. intramarginalem, e basi ortum confluentibus; *pedunculo* petiolum 1 $\frac{1}{2}$ -plo superante; *spatha* lanceolata, acuta, papyracea, quam spadix florifer sub $\frac{1}{2}$ breviore; *spadice* longiuscule stiptitato, cylindrico, myosoideo; *tepalis* latitudine sua sub $\frac{1}{2}$ brevioribus.

Tallos sarmentosos, trepadores; *entrenudos* 5-7 cm. largos, 8-10 mm. gruesos, lisos, lustrosos; *catafilos* enteros largamente persistentes, lanceolados, 8-10 cm. largos; *pecíolos* semicilíndricos, interiormente acanalados, 7-8 cm. largos; *geniculo* 1 cm. largo, algo abultado, interiormente acanalado; *limbos* 25-30 cm. largos, 4-6 cm. anchos, puntiagudos en la base, bruscamente contraídos en el ápice en cúspide linear, 2-2 $\frac{1}{2}$ cm. larga; *nervios* todos prominentes; *nervio central* robusto, convexo en el dorso, afilado en la página superior; *nervios laterales* 1 desigualmente distantes entre sí, patentes, arqueado-ascendentes, todos reunidos con el nervio colectivo procedente de la base, 3-4 mm. dentro del margen; *pedúnculo* delgado, erguido, rígido, 12-15 cm. largo; *espata* cartilaginea, escorrida interiormente, prontamente reflejada, 6-7 cm. larga, 10-12 mm. ancha, puntiaguda en el ápice; *espádice* delgado, cilíndrico, flexible, 10-15 cm. largo, 5 mm. grueso durante la floración, sostenido por estípite, 6-8 mm. largo; *tépalos* amarillentos, \pm 2 veces más anchos que largos. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del *Pichincha*, valle de *Mindo* entre 1500-2000 metros.

Especie afne al *A. subandinum* y al *A. sarmentosum*, de los cuales, sin embargo, se distingue facilmente por el aspecto, por el espádice largamente estipitado y varios otros de los caracteres enunciados.

SERIE II DIGITINERVA. Terrestres; *tallo* breve; (v. N° 57-58) craso, erguido; *limbos* coriáceos, erguidos, con los pecíolos y los pedúnculos \pm negro-punteados, 3-11 nervios ó 3-11-plinervios; los 2 *nervios* laterales interiores con el central terminados en el ápice, los demás por lo común, en el margen, todos reunidos entre sí por ner-

vios 11 transversales casi paralelos; *pedúnculos* erguidos, rígidos, por lo común más cortos que los pecíolos, *espádice* estipitado ó subsesil, craso, erguido, rígido; *baya* comunmente prolongada en estilo anguloso.

I Rubentia. *Limbos* pálidamente verdes; *espata* y *espádice* más ó menos roados;

A *Limbos* 5-nervios 6 5 plinervios, puntiagudos en la base, acuminados en el ápice.

45. *A. subellipticum* Sod. terrestre; *caule* ascendente crasso; *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* lanceolatis, subcoriaceis, diu persistentibus; *petiolis* subcontiguis, intus breviter vaginatis, semicylindricis, antrorsum 1-sulcatis, quam limbi brevioribus; *geniculo* tumido incurvato, 1-1 1/2 cm. longo; *limbis* coriaceis, supra viridibus, subtus glaucescentibus, parce nigro-punctatis, oblongo-ellipticis, basi cuneata in geniculum decurrente, apice breviter acuminatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus, 5-nerviis; *nervis* lateralibus 1 infimis tenuibus, infra limbi dimidium in margine prodeuntibus, duobus superioribus, margini parallelis, sub limbi apice terminatis, nervos laterales costæ utrinque erecto-patentes, parallelos II et III tenuissimos excipientibus; *pedunculo* tenui ancipite, petiolum superante; *spatha* linearis-lanceolata; spadicem tenuem, longiuscule stipitato parum excedente (caetera ignota).

(Continuará).