

REPUBLICA DEL ECUADOR


TOMO XXIII } Año 25.—Mayo de 1908 } N° 162

ANALES
DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL

Aloisio Sodiro

X SERTULA

FLORAE ECUADORENSIS



ORD. AROIDEAE

G. 9 ANTHURIUM SCHOTT

(Suppl. III)

—
INTEGRIFOLIA—PINNINERIA

l (18*) *A. acutissimum* Engl. β *maius* var nov.
limbis ad metrum longis, ad medium 16-18 ct. latis, ner-
vo collectivo (ibidem) 12-14 mm. a margine remoto, spa-
tha ad 2 dc. longa, in triente inferiore 3½-4 ct. lata; spa-
dice [adhuc immaturo] 24 ct. longo, 1½ ct. crasso.

Crescit cum forma speciei

2 (26*) a) A. *ophites* Sod. sp. nov.; *caule* brevi, crasso; *internodiis* subcontiguis; *cataphyllis* dense cartilagineis, nitidis, albidis, exsiccando brunneis, sero et frustratim deciduis; *petiolis* gracilibus, cylindricis, rigidis, basi breviter ($1\frac{1}{2}$ cm.) vaginatis et (cum pedunculis) livido-maculatis; geniculo $1\frac{1}{2}$ cm. longo instructis; *limbis* subcoriaceis, nitidis, supra pallide viridibus, subtus albo-glaucescentibus, oblongo-ellipticis, basi acutis, apice breviter acuminatis, 20–45 cm. longis, 12–18 cm. (circa medium) latis; *nervo medio* subtus robusto, argute carinato, supra tenui, in dimidio superiore limbi, vix exerto; *nervis* I. utrinque 12–15, remotis, arcuato-ascendentibus, supra impressis, subtus exertis, cum II totidem tenuissimis anastomosantibus et in nervum collectivum robustum, a margine 8–10 mm. remotum confluentibus; *pedunculo* quam petiolus tenuiore, eoque (10–15 cm.) longiore ab latere modice compresso; *spatha* late linear-lanceolata, basi haud decurrente, apice breviter acuminata, consistentia firma cartilaginea, diu persistente; *spadice* breviter (4–6 mm.) stipitato, subcylindrico, sursum leviter attenuato, 8–15 mm. longo, primum albidu, demum sordide virescente; *tepalis* obovatis, concavis, apice dilatato, umbonato, REAL JARDÍN BOTÁNICO
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL *ovarium* obtegentibus; *baccæ* globuliformi, apice alba, deorsum rosea, pericarpio crasso instructa.

Crescit in silvis subtrop. prope. San Florencio.

Species elegans'. A. *maculoso* nostro maxime affinis, nisi forte veluti eiusdem varietas reputanda sit. Difert potissimum statura minore et forma limborum.

Limbis ellipticis, latitudine sua subduplo longioribus; *spadice* livido tenui cylindrico.

3 [41*] A. *pyrifolium* Sod. sp. nov. late scandens; *internodiis* 4½–5 ct. longis, vix 3 mm. crassis; *cataphy-*

a) Numerus uncis inclusus, qui species singulas praecedit, indicat locum in quo, juxta Monographiae nostrae ordinem, species illa colocanda erit.

*I*llis internodia vaginantibus, mox dissolutis; *petiolis* 1½-2½ ct. longis, subcylindricis, supra i sulcatis; *limbis* subcoriaceis, nitentibus, supra intensius viridibus, ellipticis, basi obtusis, apice acutiusculis, 8-10 ct. longis, 4½-5 ct. latis; *costa* utrinque modice prominente obtusa v. leviter carinata; *nervis* tenuissimis, in planta viva utrinque immersis, in sicco prominulis, I cum II binis ternisve alternantibus, obnibus in nervum collectivum a margine 4-5 mm. remotum, quam I paulo crassiorem confluentibus; *pedunculo* (per anthesin) ad 6 ct. longo, rigidiusculo, an-
cipiti, striato; *spatha* oblonga, pluri nervia, 2-2½ ct. longa, 7-8 mm. lata basi amplexante, apice subito con-
tracto mucronulata; *spadice* sessili, per anthesin 4½-5
ct. longo, ad 4 mm. crasso purpureo-livido; *perigonio*
rhombeo-tetragono, longitudine sua multo latiore; *ova-
rio* biovulato; *stigmate* vix prominulo.

Crescit ad rupes et arborum trunco*s* in silv. ad fl. Napa. Primo intuitu ad Tetraspermia referendum vide-
tur, sed ovario biovulato prorsus recedit.

Folia Pyri communis *glabra* satis fideliter refert.

4 (51*) A. *oreodoxum* sp. nov.; *caule* erecto, ro-
busto; *cataphyllis* triangulari-lanceolatis, 20-25 cm. lon-
gis, 5-6 cm. latis, subcoriaceis, in fibras intertextas ma-
ture dissolvendis; *petiolis* approximatis, erectis, rigidis,
limbos subaequantibus, ab latere parum compressis, basi
incrassatis, breviter vaginatis, dorso semiteretibus anti-
ce, cum geniculo complanatis, i-sulcatis, sulci lateribus
acutis; *limbis* coriaceis, intense viridibus, subtus crebro,
supra parcus nigro-punctatis, 35-40 cm. longis, 24-28
cm. latis, subellipticis, sursum obsolete asymmetricis, ba-
si ± acutis, apice obtusis, 7-9-nerviis; *nervis* I. 4 inti-
mis, cum centrali in apice limbi desinentibus, ceteris gra-
datim inferius in margine evanescentibus, omnibus, ut II,
supra immersis, subtus exertis; *pedunculis* quam petioli
crassioribus et subdupo longioribus, compressis, in sicco
-sulcatis; *spatha* dense cartilaginea, oblongo-lanceo-

lata, 15-20 cm. longa, 3-4 cm. (circa medium) lata, basi semiamplexante et longe decurrente, in apicem callosum desinente; *spadice* breviter (5-7 mm.) stipitato erecto, cylindrico, per anthesin flavidus, 15-18 cm. longo, 1 cm. crasso, maturescendo aucto, purpureo; *stylis* per anthesin vix emersis, in spadice maturo, tepala longe superantibus, subtetragonis.

Crescit in silvis suband vulc. *Pululahua* 10/907.

β . *stipitatum* var. nov.; *limbis* 7-9 nerviis, ovato-ellipticis; *pedunculo* quam petiolus longiore; *spadice* longius stipitato flavidus.

γ *cupreum* var. nov.; *limbis* 9-nerviis, ovato-ellipticis; *pedunculo* quam petiolus longiore; *spadice* crasso, postice subsessili; *tepalis* per anthesin apice cupreis.

CORDIFOLIA—RHITIDOPHYLLA

5 (69 *) *Anthurium* ^{NTR} *Treleasei* spec. nov.; *caule* crasso erecto; *cataphyllis* coriaceis, 20-25 cm. longis, e basi dilatata, sursum gradatim angustatis, dorso pulv-
rulento-puberulis; *petiolis* 7-8 dm. longis, robustis, basi breviter (6-8 cm.) vaginatis, subcylindricis, antice leviter 1-sulcatis, apice cum geniculo (1 $\frac{1}{2}$ - 2 cm. longo,) articulatis; *limbis* ovatis, basi profunde cordatis, latitudine sua $\frac{1}{3}$ longioribus; coriaceis, nervis subtus valde prominentibus rugosis et tenuiter pulv-
rulento-puberulis *lobis pos-
ticipis* quam anticus subtriplo brevioribus, conniventibus, 6-7 nerviis, sinu oblongo, ad medium costis denudatis, circumscrip-
to seiunctis; *nervis interlobaribus* utrinque 3-5, una cum nervis I lobi antici (utrinque 20-25) cum totidem tenuioribus alternantibus, et cum superioribus 3-4 lorum basali in nervum collectivum a margine 2-3 mm. remotum confluentibus, omnibus supra glabris, subtus pulv-
rulento-puberulis, *pedunculis* quam petoli tenuioribus et subdimidio brevioribus; *spatha* cubcoria-
cea, erecta, antice breviter decurrente, lanceolata, acuminata, per anthesin quam spadix parum breviore; *spa-
dice* breviter (1 $\frac{1}{2}$ cm.) stipitato, viridi-cinarescente, sub-
cylindrico, 20-25 cm. longo, 10-15 mm. crasso; *tepalis* 5-6 mm longis; *bacca* tetragona-elliptica, sepala aequante.

Crescit in silvis suband. occid. vulc. *Pichinche.*

Planta *Anthurio Umbraculo* Sod. omnino hætitu et statura similis. Differt potissimum spatha subcoriacea, erecta, spadice longiuscule stipitato, subcylindrico, rigido, spatham parum superante. & Ab *A. bulloso* nostro (Anth. Ecuat, Suppl I p. 51) differt nervis numerisioribus, valde exertis, lobis basal. maioribus magis coninventibus; sinu basali angustiore, costis brevius denudatis etc—Ab *A. procero* eiusque affinibus, quibus statura et forma limborum, spathae etiam et spadicis rationibus quadantenus accedit, differt, caule erecto, limbisque valde rugosis, nervis, crebrioribus, subtus valde exertis etc.

Spadice spatham subduplo superante (Sp. post. A Tungurahua collecta).


6(127*) *A. Candolleanum* Sod. sp. nov. *caudice* scandente, radicante; *cataphyllis* lanceolatis, supra basin dilatatam amplexantem, abrupte contractis, acuminatis. 10-12 ct. longis, diu persistentibus; *internodiis* 6-8 ct. longis, ad 2 ct. crassis, viridibus; *petiolis* 5-6 dc. longis, gracilibus, [vix 3 mm. crassis] angulatis. basi antice longe vaginatis, sursum [cum geniculo ad 4 ct. longo incrassato] 1-sulcatis; *limbis* cordato-sagittatis, subcoriaceis, saturate viridibus, nitentibus, utrinque subconcoloribus 4-4.5 dc. longis, ad petioli insertionem 2.5 dc. latis, atque inde sursum linea convexa, gradatim in apicem cuspitatum angustatis; *lobis basalibus* quam terminalis 3 plo brevioribus, obtusissimis retrorsis, sinu basi semicirculari, costis ad 2 ct. nudis circumscripto seiunctis, sursum (latere interno non nihil evoluto) modice convergentibus; *costa* supra modice, subtus alte prominente obtusa; *nervis omnibus* supra impressis, subtus exertis obtusis; *loborum basarium* 5, e quibus 4 inferioribus reflexis, dein erga marginem abrupte arcuato-ascendentibus, quinto cum interlobaribus [utrinque 1] et I. lobi terminalis (utrinque 6-7) in nervum collectivum a margine 8-3 mm. remotum confluentibus; *pedunculis* quam petioli 10-12 ct. brevioribus, gracilibus, subancipitibus, angulatis; *spatha* oblongo-lanceolata, subcoriacea, viridi, plurinervia 10-12 ct. longa, in triente inferiore ad 4 ct. lata, basi an-

tice modice aperta et spadicis stipitem paulo denudante, apice calloso-mucronata; *spadice* longe (2-2½ ct.) stipitato, subcylindrico, aut anthesi ad 1, 3 ct, longo, 12-14 mm. crasso, atrato purpureo, flexili cernuo; *tepalis* cuneatis, dorso argute carinatis; *filamentis* linearibus, dorso infra apicem purpureo-maculatis; *antheris* vix exertis.

Crescit in silvis subtrop. occid. secus fl. *Tandapi*.

Species e grege A. *scabrinervis*, tamen a ceteris affinibus facile distinguenda.

PALMATO TRILOBA



7 (143*) A. *heteroclitum* sp. nov.; *caule* plurimetrali, alte scandente, nodoso, parce radicante; *internodiis* inaequalibus, (3-5 cm.; 8-10 cm. longis) 2 cm. crassis, teretibus, laevibus, glauco nitentibus; *cataphyllis* cartilagineo-herbaceis, laevibus, lanceolatis, apice obtusis, demum in fibras reticulatas resolutis; *petiolis* robustis, cylindricis, 50-65 cm. longis, basi breviter (6-7 cm.) vaginatis, apice geniculo parum incrassato, cylindrico, instructis; *limbis* dense herbaceis, laevibus, utrinque viridis, ovato-cordatis, apice breviter acuminatis, duplo fere longis ac latis; *lobis basalibus* 10-12 cm. longis, obtusis, obiter divergentibus, sinu semicirculari vel leviter reniformi, basi breviter nudato seiunctis, cum lobo terminali linea uniformiter convexa continua, 6-nerviis; *nerviis omnibus*, et interdum cum 2 interlobaribus et iugo infimo lobi terminalis in margine desinentibus; *nervis lobi terminalis* (utrinque 9-10) in nervum collectivum submarginalem (iugo infimo quandoque excepto) confluentibus; *pedunculo* petiolum longitudine subaequante eoque vix graciliore; *spatha* lanceolata, sursum in apicem subulatum gradatim attenuata, basi breviter obliqua, ad 2 dm. longa viridi *spadice* (in specimine

adhuc in spatha inclusa) breviter (1 cm. stipitato) 12 cm. longo, cylindrico, apice optuso (Cetera ignota).

Crescit cum specie sequente, cui valde affine. Dif- fert statura maiore, limborum forma et nervatione et pe- dunculis magis robustis, spatha antice non decurrente, spadice modice stipitato, etc. Foliorum forma et struc- tura nonnullis *Leiophyllis* nostris e sectione *Achroosta- chya*, haec species et quae proxime sequitur, admodum accedunt, sed caeteris characteribus ad *Palmatiner- via* manifeste ad sensendae sunt, quorum seriem quo- dammodo aperiunt, nexusque evidenter ostendunt, quo haec postrema sectio cum priore coniungitur.

8 (143*) *Anthur bimarginatum* sp. nov. caule pluri- metrali, alte scandente, nodoso, e nodis radices numero- sas, tenues verticillatim mittente; internodiis 12-15 cm. longis, 10-12 mm. crassis, laevibus, plumbeo-nitentibus; petiolis 3-4 dm. longis, 6-7 mm. crassis, subcylindricis, antice leviter 1-sulcatis, basi incrassati, intus vagina 5-7 cm. longa instructi, in sicco sub 5-angulatis, apice geni- culo \pm 2 cm. longo, tereti, incrassato instructis; limbis blande carnis, pellucido-punctatis, supra intense glau- co-viridibus, subtus viridi-flavescentibus, late ovatis, \pm 40-45 cm. longis, 35-40 cm. latis, profunde cordatis, tri- lobis; lobis basalibus subsemirotundis, retrorso-diver- gentibus, sinu reniformi 10-12 cm. alto seiunctis, in lobum terminalem ovatum, apice breviter cuspidatum, lí- nea concava transeuntibus; nervis lorum basali utrinque 5-7 in costas sinus coniunctis, 2 infimis parum supra basin a costa liberis, ceteris gradatim apicem ver- sus a costa flabellatim solutis. omnibus marginem arcua- tim petentibus, et, ut interlobari et 3-4 infimis lobi ter- minalis in nervo collectivo margini approximato et fere ad limbi apicem ducto desinentibus, superioribus 4-6 lo- bi terminalis, in nervum collectivum late (10-12 mm.) intramarginalem et in limbi apice terminatum confluen- tibus; pedunculis teretibus, gracilibus petiolos aequanti- bus vel superantibus; spatha linear-lanceolata, 18-20 cm. longa, vix 2 cm. lata, basi antice longe decurrente in

apicem subulatum gradatim angustata; *spadice* breviter (10-15 mm.) stipitato (in specimine nondum plane evoluto) 25 cm. longo, 10 mm. crasso, subcylindrico, apice obtuso, primum flavidus, demum viridi-fuscescente, *tepalis* subellipticis, apice cucullato trigonis; *staminibus* inclusis, vix tepalorum dimidium aequantibus.

Crescit in silvis subtrop. occid. vulc. *Pululahua*, ad *Yanaureco*. 10/907.

G. 10. STENOSPERMATIUM SCHOTT.

Flores hermaphrod. apetali; stam. 4, antheris dithecis. extrorsum dehiscentibus; ovarium obpyramidatum, 1-2-loculare, loculis 2-∞-spermis; stylus brevis dilatatus subtruncatus; stigma lineare, semina cylindroidea, funculo longulo placentæ basilari affixa; embryo axilis, albuminosus.

ÁREA HISTÓRICA

- I. *Petiolis omnibus ad geniculum usque vaginatis, quam limbi brevioribus;*
 A. *Pedunculis 8-10 cm. longis, supra solium (bracteam) supremum 3-5 cm. longis; spadice subsessili ellipsoideo;*
 a *Petiolis 3-4 cm. longis, quam limbi subquadruplo brevioribus.*

I. *St. brachypodium* Sod. sp. nov. *caudice* ascendentē vel erecto; *internodiis* 2-4 cm. longis, 4-5 mm. crassis, in sicco striato rugosis; *petiolis* 3-4 cm. longis, basi dilatato aplexantibus, sursum usque ad limbi basin (geniculo vix distincto) vaginantibus, vagina apice oblique, retusa; *limbis* oblongis, vel oblongo-ellipticis, basi acutis, apice breviter acuminatis, subcoriaceis, glabris, subtus pallidioribus; *costa* supra immersa, subtus ad limbi dimidium obtuse exerta; *nervis* tenuibus, sub angulo valde acuto, erecto-ascendentibus, I paullo validioribus, II. 2-3 interiectis; *pedunculis* in caulis apice, sœpe geminatis, 4-5 cm. longis, erectis, 3-3 brakteatis, sub apice constrictis.

tis fere articulatis; *spatha* virescente, vix pollicari, mox decidua; *spadice* breviter [sub 3 mm.] stipitato, ellipsoideo, demum maturescendo cylindraceo, 3-4 cm. longo, vix 1 cm. crasso; *pistillis* latitudine sua parum longioribus; *filamentis* linear-ligulatis; *antheris* minimis instructis; fructu 1-looculari, 9-10 ovulato.

Crescit in silvis trop. prov. *Esmeraldas*.

b. *Petiolis* 5-6 ct. longis, quam limbi plus duplo brevioribus;

2 St. *subellipticum* Sod. sp. nov. *caudice* assurgente v. breviter scandente; *internodiis* 5-6 ct. longis, vix 1 ct. crassis, laevibus; *petiolis* basi dilatata fere amplexantibus, usque ad limbi basin (geniculo vix distincto) vaginatis; *limbis* leviter asymmetricis, subellipticis, 15-18 ct. longis, 8-10 ct. latis. basi acutis, apice breviter acuminatis, supra intense, subtus pallide viridibus, subcoriaceis, glabris, utrinque minute punctulatis; *costa* supra immersa, subtus ultra limbi dimidium obtuse exerta, striolata; *nervis* tenuibus, in sicco utrinque prominulis, sub angulo valde acuto ad marginem APL protensis, I cum II geminis alternantibus; *pedunculo* 6-7 ct. longo erecto, ultra dimidium petiolo folii supremi vaginato, eiusdemque (limbo fere abortivo,) bracteato, apice articulato, *spatha*, vix pollicem longa ovata acuta; *spadice* subsessili primum ovato conico, maturo ignoto.

Crescit in silv., tropic. prov. *Esmeraldas*.

B. *Pedunculis* longioribus; *spadice* cylindrico,

A. *Internodiis* 1½-3 longis,

a. *Pedunculis* petiolos aequantibus v. parum superantibus

0. *Petiolis* quam limbi brevioribus;

1. *Petiolis* pedunculos subaequantibus, quam limbi subduplo brevioribus; *spadice* stipitato.

3 St. *Porteri* Sod. sp. nov. *caudice* erecto vel ascendente; *internodiis* 2-3 cm. longis, vix cm. crassis; *epidermide* glaucescente; *petiolis* basi dilatata, subample-

xantibus, sursum ad geniculum usque angustius vaginatis, 10-12 cm. longis; *limbis* ad 2 dm. longis, 6-7 cm. latis, leviter asymmetrici, oblongis, deorsum in geniculum ± 1 cm. longo, cuneatim angustatis, apice acuminatis, mucronulatis, supra viridibus, subtus pallidioribus; *costa* supra immersa, subtus fere usque ad apicem obtuse exerta; *nervis* tenuissimis, sub angulo acuto arcuatim marginem petentibus. I. a II. vix distinctis; *pedunculo* tenui, 8-10 cm. longo; *spatha?* . . valde caduca; *spadice* longiuscule (5-7 mm.) stipitato, cylindrico, 8-10 cm. longo, ad 10 mm. crasso; *pistillis* obpyramidalis, apice dilatato, longitudine sua paullo latioribus; *ovulis* numerosis 20-25.

Crescit in silvis subtropic. reg. occid. m. Pichincha.

Species *St. densiovulatum* Engl. valde similis; differt petiolis quam limbi subdupo brevioribus, itemque pedunculis dimidio brevioribus; id est, vix unquam 1 dm. longis, itemque spadice evidenter stipitato et æque longiore.

2. *Petiolis* quam *limbi* vix triente brevioribus *spadice* sessili.

4 *St. densiovulatum* Engl. sp. nov. *caudice* 1 ct. crasso; internodiis, 2-3 ct. longis foliorum petiolus laminam subaequante, circ. 2 dm. longo: vagina basi amplectente, sursum angustata instructo, *lamina* subcoriacea, subtus pallidiore, lanceolata 2-3,5 dm. longa 6-7 ct. lata, acumine 1 1,5 ct. longo instructa; *pedunculus* fere 2 dm. longus; *spatha* elongata, longe acuminata, 6-7 ct. longa, convoluta. 6-8 mm. ampla; *spadice* sessili, 5-6 ct. longo; *pistillis* crassitudine sua paullo longioribus; ovario infra stylum paullum constricto, dense multiovulato; *ovulis* 20-30, funiculo brevi affixis.

Engler, Beiträge zur Kenntnis der Araceae. X, p. 112

Crescit in silv. subtropicalibus Nanegal Gualea et in tropical. ad fl. Tanti.

β . *Petiolis limbos et pedunculos subaequantibus*

5 St. *longifolium* Engl. loc. cit. p. 111, sp. nov.—
 Caudice circ. 1 cm. crasso, internodiis 2 cm. longis.
 Foliorum petiolo laminae subaequilongo vel ea longiore,
 vagina utrinque fere 1 cm. lata, basi amplexa, sursum
 paullum angustata, circ. 1 cm. infra laminae basin desin-
 nente instructo, lamina rigida, elongato-oblonga, utrin-
 que aequaliter angustata, basi acuta, apice acuminata,
 majorum 3-3,5 dm. longa, 1 dm. lata, superiorum circ. 1,
 8 dm. longa, 7—8 cm. lata. Pedunculo 3-3,5 dm. lon-
 go. Spatha..... Spadice stipite 1 cm. longo suffulto,
 1 dm. longo, 1 cm. crasso. Pistillis subquadragulis,
 latitudine sua paullo longioribus, unilocularibus; ovulis
 circ. 6 funiculo brevi basi insertis.

Crescit in silvis trop. et subtrop. ad vicum *Gua-*
lea 800 m. supra mare.

Engler, loc. cit. p. 111

b. *Pedunculis folium integrum aequantibus v. superantibus.*

6 St. *Mathewsi Schott.* caudicis; *internodiis* brevi-
 bus, foliorum petiolis quam lamina brevioribus, ad geni-
 culum usque vaginatis; *lamina* oblique, oblongo-elliptica,
 basi obtusiuscula, apice acuminata; *nervis* lateralibus I.
 utrinque circ. 8-15, angulo acutissimo patentibus, nervis
 lateralibus II. solitariis interiectis; *pedunculo* folium to-
 tum antecedens superante, subnudante; spatha subcoria-
 cea, alba, apice acuminata; 10-12 ct. longa, *spadice*....
 cylindrico, brevissime stipitato; *ovariis* breviter turbi-
 natis, loculis 4 ovulatis; baccis obovoideis, vertice trun-
 catis, loculis 4 spermis.—(Engler)

β *stipitatum* Engler.—var. nova *Caudice* erecto, *in-*
ternodiis abbreviatis. Foliorum petiolo quam lamina
 longiore, fere ad ejus basin usque vaginato. *Peduncu-*
lo folia superante. *Spatha* oblonga, fere 1 dm. longa.
Spadice stipite 1 cm. longo, suffulto, 5 mm. crasso. *O-*
varei loculis 3-4 ovulati. (Engl. loc. citato, p. 100).

Occurrit etiam *internodiis* ad 4-5, ct. longis.

Crescit, forma utraque, in silvis subtrop. occid. vallis Nanegal 900-1000 supra mare, et ad Angamarca.

a. caudice subscandente; internodiis 3-5 ct. longis, vix 3 mm. crassis
B. Internodiis 3-8 ct. longis;

7 St. *gracile* Sod. sp. nov. caudice subscandente, elongato; *internodiis* 3-5 ct. longis, laevibus glaucescentibus, vix 3 mm. crassis; *petiolis* 12-15 ct. longis, tenuibus; *vagina* basi parum supra insertionem antice truncata atque inde petioli latera anguste marginante; *limbis* oblongis, asymmetricis, subfalcatis, 20-25 ct. longis, 5-7 ct. latis, basin versus cuneatim angustatis, apice argute longeque acuminatis, tenuiter cartilagineis, subtus subglaucescentibus; *costa* supra immersa v. complanata, subtus leviter et obtuse exerta; *nervis* omnibus tenuibus, vix exertis, sub angulo valde acuto ascendentibus, plerisque intra marginem in nervulum collectivum ad apicem usque ductum confluentibus; I utrimque 8-10, a II pluribus interiectis bene distinctis, omnibus per venas venulasque in reticulum valde irregulare coniunctis; *pedunculis* quam petioli parum ($1\frac{1}{2}$ -2 ct.) longioribus et aequae gracilibus; *spatha?* . . . *spadice* sessili, ad 3 ct. longo, 6-7 mm. crasso, in specimine quod prostat, sursum leviter incrassato.

Crescit in silv. tropic. prov. *Esmeraldas*.

Non obstante defientia speciminis unici quod possidemus, hanc formam describere visum est ob characteres nonnullos, quibus facile a ceteris omnibus discerni potest.

a. *Petiolis* quam *limbi* subdupo brevioribus; *spadice* sessili

8 St. *Sodiroanum* Engl. sp. nov.; caudice 1 cm. crasso; *internodiis* longitudinaliter sulcatis, 4-5 cm. longis; *petiolis* quam lamina duplo brevioribus, ad 4-5 mm. infra lamina basin late vaginatis; *lamina* coriacea, elliptico-ovata, basi obtusa, apice breviter acuminata 9-12

cm. longa, 4½ - 5½ cm. lata; *pedunculo* 15 cm. longo; *spatha* 5 cm. longa, convoluta, 1 cm. lata, vix acuminata; *spadice* sessili, 4½ cm. longo, 5 mm. crasso; *pistillis* crassitudine sua sexquuplo longioribus; *ovario* incomplete uniloculari, 6-8 ovulato; *ovulis* funiculo tenui suffultis.

(Engl. loc. cit. p. 112)

Crescit in silvis subtrop. in valle *Mindo* et *Nangal*.

b. *Petiolis* quam limbi subtriplo brevioribus; *spadice* breviter stipitato

9 St. *Peripense* sod. sp. nov.; *caudice* subscandente; e nodis remote radicante *internodiis* 3-5 cm. longis, 3-4 mm. crassis, longitudinaliter striatis; *petiolis* 3-4½ cm. longis, 6-7 mm. infra laminae basin vaginatis; *vagina* lata, basi amplexante, ad geniculum evanescente; *limbis* dense cartilagineis, subellipticis vel obovato-ellipticis, asymmetricis, basi obtusis, apice breviter acuteque acuminatis, 10-12 cm. longis, 5-6 cm. latis; *costa* supra plana, subtus tenuiter obtuseque exerta; *nervis* omnibus tenuissimis, subangulo acuto in marginem protensis, I. quam II. vix crassioribus; *pedunculo* 9-10 cm. longo, ad ½ usque petiolo folii supremi 5-6 cm. longi vaginato; *spatha*? . . . *spadice* breviter (2 min.) stipitato, 5 cm. longo, 4-5 mm. crasso.

Crescit in regione trop. secus fl. *Peripa*.

c. *Petiolis* limbos superantibus; *spadice* stipitato

10. St. *latifolium* (Engl. loc. cit. p. 112) sp. nov.—
Caudice vix 1 cm. crasso, *internodiis* 6-8 cm. longis. foliorum; *petiolo* quam lamina longiore, fere ad laminae basin usque vagina utrinque 3-4 mm. lata instructo, lamina ovata, basi obtusa, apice acuta vel breviter acuminata, 0,9-1,2 dm. longa, medio 6-7 cm. lata. *pedunculo* 2,5 cm. longo; *spatha* oblonga, 6 cm. longa, convoluta 1,5 cm. ampla, breviter acuminata; *spadice* stipe 2-3 mm. longo suffulto, cylindrico, 5-5 cm. longo,

4-5 mm. crasso; *pistillis* depressis, crassitudine sua paullum brevioribus; *ovario* uniloculari, 5-6- ovulato; *ovulis* funiculo tenui, paullum breviore suffultis.

Crescit epiphyticum in silvis subtrop. secus fl. Pilatón, ppe. San Nicolás.—1.200 m. supra mare.

β . *Internodiis* aliis brevibus foliatis; aliis elongatis aphyllis.

11 St. *interruptum* Sod. sp. nov.; *caudice* elongato, subscandente, vix cm. crasso; *internodiis* nunc brevibus, 10-12 mm. longis, foliis normalibus instructis, nunc longioribus (7-8 cm. longis) vaginis, (limbo abortiente) aphyllis, apice aristatis, vestitis; *petiolis* normalibus, ex basi lata sursum ad geniculum usque anguste vaginatis; *geniculo* 7-8 mm. longo, dorso carinato; *limbis* asymmetricis, 25-20 cm. longis, 5-5 cm. latis, basi acutiuscula, apice ad 1 cm. acuminatis, subcoriaceis, subtus pallidioribus; *costa* supra immersa, subtus ultra dimidium exerta, obtusa; *nervis* tenuissimis, sub angulo valde acuto marginem petentibus, I. a II. vix distinctis; *pedunculis* (e basi partis apyllæ exortis), 20-25 dm. longis, in dimidio inferiore petiolo solii peduncularis, ceteris minoris vaginatis; *spatha?* *stipite* 2-3 mm. longo; *spadice* 7-8 mm. longo, ad 8 mm. crasso.

Crescit in silvis trop. prov. Esmeraldas ad fl. *Lita*.

II; *Vagina* petiolari \pm infra geniculum desinente;

A. *Caudice* gracili ascendente

a. *Petiolis* inferioribus ad $\frac{2}{3}$, supremo ad geniculum usque vaginato

12 St. *adsimile* Sod. sp. nov. *caule* ascendentē vel modice scandente, praeterquam ad basin, arrhizo; *internodiis* inferioribus 1½-2 ct. longis, 5-8 mm. crassis, superioribus paulo brevioribus; *petiolis* 15-18 ct. longis, basi late vaginatis, vagina inferiorum ad petioli dimidium, supremi ad geniculum (10-12 mm. longum) usque produc-ta, apice obtuse truncata; *limbis* petiolos longitudine subaequantibus, inferioribus parum brevioribus, 7-9 ct. la-

tis, asymmetricis, basi subacutis, apice breviter acuminatis, in sicco cartilagineis, supra glabris, subtus sub lente minute punctulatis; *costa* supra immersa, subtus modice exerta, obtusa, in limbi acumen mucronatum producta, *nervis* tenuibus, I. a II. vix distinctis, venulisque tenuissimis, mutuo remote reticulatis, omnibus a costa subangulo valde acuto ad marginem protensis; *pedunculo* 25-35 ct. longo, ultra dimidium folii supremi, ceteris plus duplo minoris, *vagina* ad geniculum usque producta, involuto; *spatha* in vivo carnoso-membranacea, in sicco dense cartilaginea, alba, subelliptico lanceolata, cuspidata, 9-10 ct. longa; *spadice* cylindroideo, (5 mm.) stipitato, luteolo, ad 6 ct. longo, 5-6 mm. crasso; *fructu* obconico, apice dilatato hexagono, longitudine sua subdupo latiore.

Crescit in silv. tropic. prov. Esmeraldas (8/904).

adsimile diximus propter quamdam similitudinem quam praesefert cum *St. spruceano*, Schott, a quo tamen non nullis excharacteribus enuntiatis, satis differre videtur.

b. *Vagina* foliorum omnium vix ad petioli dimidium producta;


13 *St. longipetiolatum* Engl. sp. nov.; *caudice* graciili, ascendente; *internodiis* 3-4 cm. longis, 4-5 mm. crassis, striolatis; *petiolis* 10-13 cm. longis, *vagina* basi dilatata, amplexante, sursum angustata, infra petioli $\frac{1}{2}$ desinente; in folio pedunculari ad 2-3 cm. infra laminam producta; *lamina* oblongo-elliptica dense cartilaginea, subtus pallidiore, basi obtusa, apice acuta vel breviter acuminata, 10-13 cm. longa, circa medium, 4-5 cm. lata; *pedunculo* 16-18 cm. longo, ad $\frac{1}{2}$ usque *vagina* folii peduncularis, arcte involuto; *spatha?*... *spadice* breviter (2-3 mm.) stipitato, cylindrico ad 5 cm. longo, 5-6 mm. crasso; *pistillis* crassitudine sua paulo longioribus; *ovario* incomplete 1-loculari, 4-ovulato; *ovulis* funiculo brevi suffultis (Engl. loc. cit. p. 112)

Crescit in silvis subtrop. occid. M. Pichincha inter Nanegal et Gualea.

B. *Caudice crasso, internodiis brevibus; limbis magnis;*
a. Petiolis quam pedunculi limbique longioribus,

14 St. *Hilligii* Sod. sp. nov.: *caudice brevi, erecto; internodiis* 1 cm. *longis, ad 2 cm. crassis; petiolis* 3 dm. *longis, limbos parum superantibus, multistriatis; vagina* basi 1 cm. *utrinque lata, sursum modice angustata, ad dimidium usque intructis; limbis coriaceis 2-2,5 dm. longis, subobovato-ellipticis, in triente superiore, 13-15 cm. latis, atque inde sursum in apicem acuminatum vel breviter abrupteque apiculatum et deorsum in basin obtusam contractis, geniculo 15-20 mm. longo suffultis; costa supra* \pm *immersa, subtus exerta obtusa, prope apicem evanescente; nervis tenuibus I. a II. vix distinctis, sub angulo acuto a costa ad marginem arcuatim divergentibus; pedunculo* 25 cm. *longo, quam petoli tenuiore; spatula? . . . spadice sessili, cylindrico, ad 10 cm. longo, 4 mm. crasso; pistillis subaequilongis ac latis, 2-locularibus, loculis dispermis; seminibus asymmetricis, arcuato-obclavatis, funiculo longulo suffultis.*

Crescit in silvis trop. prov. Esmeraldas.



Species eximia nullique, ex nostratis hactenus cognitis, affinitate coniuncta.

b. *Petiolis quam pedunculi longioribus, limbos \pm superantibus*

15 St. *maximum* Engl. *caudice ascendentem v. erecto; internodiis* 2-3 cm. *longis, 2 cm. crassis; petiolis* 35-40 cm. *longis, basi late vaginatis, vagina* 8-10 cm. *infra apicem desinente, quam limbi parum brevioribus; limbis oblongis, 35-45 cm. longis, circa medium ad 15 cm. latis, subcoriaceis basi in geniculum angustatis, apice breviter acuminatis, supra intense viridibus, albido-muriculatis, subtus viridi glaucescentibus, nervis omnibus tenuibus, sub angulo acuto erga marginem arcuatim ascendentibus, I. a II. aegre distinctis, supra exertis, subtus immersis; costa supra plana, subtus ad apicem usque exerta; pedunculis* 35-40 cm. *longis, ultra dimidium vagina folii*

supremi involutis; *spatha* alba, coriacea, ad 20 cm. longa, 3-4 cm. lata, apice acuminata, mucronata; *spadice* varie (1-3 cm.) stipitato, 12-15 cm. longo, 10-12 mm. crasso *pistillis* crassitudine sua parum longioribus; *ovario* 12-15-ovulato; *ovulis* funiculo brevi suffultis.

(Engl. loc. cit. p. 113)

Crescit in silvis subtrop. occid. inter *Nanegal* et *Gualea*.

G. II RHODOSPATHA POEPP.

Flores in spadice inappendiculato hermaphroditi v. inferiores foeminci, apetali; *Stam.* 4. filamentis late linearibus; *antheris* 2-4 thecis lateraliter dehiscentibus; *ovarium*, stylo tetragono, prismatico, apice truncato, medio stigmatifero superatum, 2-loculare; *loculis* polyspermis; *semina* lenticularia, campylotropa, funiculo brevi affixa; *embryo* hippocrepicus.

I. *Pedunculo* monostachyo nudo;

A. *Vagina* petiolari 7-10 mm. utrinque lata; ad geniculum usque producta.

a. *Vagina* petiolari integra persistente; *spadice* stipitato;

α. *Petiolis* 12-15 cm. longis, late vaginatis.

I Rh. Kraenzlinii Sod. sp. nov. *caudicis* assurgentis *internodiis* inferioribus 10-12 mm. longis, aequae et crassis; *petiolis* quam limbi adulti subaequilongis vel ad trientem brevioribus, basi amplexante late, sursum usque ad geniculum 8-10 mm. longum gradatim angustius vaginatis, vaginae lateribus apice obtuse truncatis; *limbis* dense cartilagineis laevibus, 2½ 3 dc. longis, 8-12 ct. latis, oblongo-ellipticis, ± asymmetricis, basi obtusis, apice breviter (3-5 mm.) acuminatis; *nervis* I. utrinque 12-15, cum II. pluribus alternantibus, omnibus arcuatim ascendentibus et in limbi margine evanescentibus; *pedunculo* quam petiolus tenuiore subdupo brevio-

re; *spatha* adulta ignota, iuvencula ad 1 dc. longa, cuspidata *spadice* longe (10-15 mm.) stipitato, post anthesin ad 10-12 ct. longo, circa medium 10-12 mm. crasso, utroversus modice attenuato, apice obtuso; *bacca* prismatica hexagona, apice truncata seminibus imbricatim superpositis, lenticularibus subreniformibus, margine acietato.

Crescit in regione subtrop. occid. ad basin vulc. Pujulahua et regionis Angamarca.

β *Petiolis* 20-25 ct. longis; *pedunculos* triente superantibus.

2 Rh. *robusta caudice* ascendente, basi radicante, internodiis 12 mm. longis aequa ac crassis, inferioribus cataphylla lanceolata apice acuta, 9-10 ct. longa, ad 2 ct. basi lata gerentibus; *petiolis* 2-3 dc. longis, vagina basi utrinque fere 1 cm. lata, sursum ad geniculum usque gradatim angustata instructis; *limbis* subellipticis, (in specimine) 25-35 ct. longis, 18-25 ct. latis, ± asymmetricis, basi parum inaequaliter rotundatis, apice breviter acuminatis, dense cartilagineis, glaucescenti-viridibus; *costa* supra complanata, subtus prominente obtusa; *nervis* a costa divaricato-patentibus, marginem versus arcuato-ascendentibus, I. fere 1 ct. ab invicem remotis, II. pluribus *pedunculis* robustis, 25-30 ct. longis, ex basi ad apicem vel ad trientem superiorem usque, cataphyllo, utrimque ad 15 mm. lato, apice acuto involutis; *spatha* coriacea 15 ct. longa convoluta angusta apice subulata alba, *spadice* breviter (7-8 mm.) stipitato, cylindraceo (basi apiceque sterili?) 15-18 ct. longo, 1½-2 ct. crasso; *pistillis* prismatico-tetragonis, apice complanato, medio stigmatifero, vix margine dilatato; *ovario* biloculari; seminibus in loculis 2 seriatim superpositis, in serie qualibet 4-5 lenticularibus, campy lotropis, funiculo brevi affixis; *texta* nitida, sub lente minutissime areolata, dorso callose aristata.

Crescit in silvis tropc. prov. Esmeraldas at fl. *Lita*. et *Cachaby*.

- b. *Vagina* petiolari lata, sursum denique in fibras \pm resoluta;
 a. *Nervis* I 8-10 mm. ab invicem remotis

3 Rh. *Dammeri* Sod. sp. nov. *internodiis* brevibus, 10-12 mm. crassis e nodis radicantibus; *petiolis*, 25-40 ct. longis, in sicco castaneis, deorsum profunde striatis, antice vagina basi 1 ct. utrinque lata, sursum angustiore, ad geniculum usque producta, demum in fibras \pm dissol-venda, instructis; *genicuto* 1 $\frac{1}{2}$ -2 ct. longo antice unisul-cato, marginato; *limbis* subellipticis, 4 $\frac{1}{2}$ -5 $\frac{1}{2}$ dc. longis, prope medium 20-25 ct. tatis atque inde utroversus lineis convexis gradatim angustatis, basi obtusis v. in genicu-lum angustatis, apice breviter acuminatis, asymmetricis, llatera altero 4-5 ct. alio latiore) dense cartilagineis, su-pra intense viridibus, subtus viridi-rufescensibus, *costa* supra impressa v. plana, subtus, fere usque ad apicem, prominente obtusa, et (cum nervis) tenuissime pulveru-lento-puberula; *nervis* a costa sub angulo fere recto pro-fectis arcuatim ascendentibus, in nervulum submarginal-lem confluentibus, I ab ivicem 8-10 mm. remotis, cum II et III interiectis alternantibus et irregulariter reticulatis; *pedunculo* (in specimine adhuc iuniore) ad 16 ct. longo gracili; *spatha* alba, mature caduca convoluta, 12-15 ct. longa; *spadice* sessili cylindraceo, 12-15 ct. longo, per anthesin 1 ct. crasso.


Crescit in reg. subtropic. prop. Gualea (7/903)

Spec. fere intermedia inter Rh. robustam et Rh. macropyllam; cum illa mutua nervorum distantia, concor-dat, differt statura maiore, limborum forma, pedunculis brevioribus etc., a secunda facile distinguitur nervis pau-cioribus et remotioribus.

β *Nervis* I 4-5 mm. ab invicem remotis.

4 Rh. *macrophylla* Sod. sp. nov. caudice assurgente; *internodiis* 5-6 ct. longis, 1-1 $\frac{1}{2}$ ct. crassis, e nodis radicantibus; *petiolis* 2 $\frac{1}{2}$ -3 dc. longis, dorso (in sicco) sulca-

tis, intus vagina ultra geniculum producta, utrumque ad 15 mm. lata, sursum obiter angustata, aetate longitudinaliter lacera et geniculo \pm 2½-3 ct. longo instructis; *limbis* 35-45 ct. longis, prope medium 25-30 ct. latis, utroversus arcuatim angustatis, basi rotundatis, apice acuminatis coriaceis, supra intense viridibus nitidis, subtus pallidioribus, pilis punctiformibus dense conspersis, in sicco utrinque fuscis; *costa* supra impressa, subtus prominente robusta, a medio deorsum carinata; *nervis* numerosis, subtus valde prominentibus, sub angulo magno á costa ad marginem arcuato-ascendentibus, 1 4 5 mm. ab invicem remotis, cum II et III paucis alternantibus et valde irregulariter reticulatis; *pedunculis* petiolos subaequantibus, robustis ancipitibus, cataphyllo petiolorum vaginae simili, arcte vaginatis; *spatha* . . . alba mox decidua; *spadice* postice sessili, antice stipiti 6-8 mm. nudo instructo (in specimine nondum maturo) ad 2 dc. longo, 10-12 mm. crasso, subcylindrico, sursum obiter attenuato; *pistillis* stylo prismatico, apice convexo, medio stigma prominulum oblongum gerente instructis; *ovario* biloculari pluriovulato; *ovulis* numerosis, campylo tropis, funiculo longo suffultis.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Crescit in silv. tropic. Prov. Esmeraldas et in reg. inferiore vallis Nanegal.

Vagina petiolari angusta, denique sere tota in fibras resoluta.

5 Rhi. *Statutii* Sod. sp. nov. caudice ascendentem; *internodiis* 2 4 ct. longis, 1 ½ ct. crassis; *petiolis* (in specimine) 3 3½ dc. longis, dorso striatis, antice basi lata sursum ad geniculum usque anguste vaginatis; *geniculo* 2-2½ ct. longo, marginato; *limbis* subellipticis, 3 dc. longis, circa medium 12 ct. latis, basi acutis, v. in geniculum breviter cuneatis, apice breviter acuminatis, subcoriaceis (in sicco fragilibus) supra intense viridibus, subtus pallidioribus; *costa* supra immersa subtus prominente obtusa; *nervis* supra immersis, subtus exertis, patentibus marginem versus arcuatim patentibus et in margine desinenti-

bus, I ab invicem 3-4 mm. remotis, cum II tenuissimis, uno altero ve alternantibus et reticulatis; *pedunculo* (adul-to) petioli dimidium aequante, graciliore; *spatha* (in spadice adhuc iuvenculo,) 10-12 ct. longa angusta, sursum subulato angustata, *spadice* (adhuc immature) longiuscule (8-10 mm.) stipitato, cylindrico, 10-12 ct. longo, 7-8 mm. crasso *stam.* 4, filamentis late linearibus, compressis basi dilatatis; *antheris* dithecis, thecis ultra connectivum modice productis; *ovario* obpyramidalato prismatico 2-loculari; loculis ∞ -ovulatis, *ovulis* parvis lenticularibus, anatropis; *stylo* coriaceo, apice truncato, tetragono, medio stigmatifero, *stigmate* oblongo;

Crescit in silv. subtrop. vall. *Nanegal* et *Gualea*.

II *Pedunculo* 2-3 bracteato, cum rudimentis alterius inflorescentiae.

6? *Rh. dissidens* Sod. sp. nov. *caudice* ascendentе; *internodiis* 1-1½ ct. longis acque ac crassis; *petiolis* basi late, sursum ad geniculum usque gradatim angustius vaginatis, 20-25 ct. longis; *limbis* geniculo 18-25 mm. longo suffultis, petiolos longitudine subaequantibus, 15-18 ct. latis, ellipticis v. ovato-ellipticis, asymmetricis, basi inaequali rotundatis, apice obtusis breviter acuminatis, subcoriaceis; *costa* supra plana, subtus prominente obtusa; *nervis* subtus prominulis, patentibus, prope marginem ascendentibus, I 4-6 mm. ab invicem remotis, cum II quinis-senis alternantibus; *pedunculo* terminali, 1-foliato v. distiche bibracteato, supra folium vel bracteam superiorem 5-8 ct. longo, subterete, cum rudimento, alterius inflorescentiae in axilla bracteae inferioris; *spatha* coriacea subelliptica, arcte convoluta, apice breviter acuminata, oblique decidua; *spadice* breviter (4-5 mm.) stipitato, cylindraceo, 12-15 ct. longo, ad 12 mm. crasso; *filamentis* anguste linearibus; *pistillis* prismatico-hexagonis; *stylo* ad 2 mm. longo, \pm 3 mm. crasso, apice modice convexo, medio stigmatifero-(ovula et semina in spadice nuncidine pereso, recognoscere non licuit; hinc dubium an huic generi, cui praecipue ob habitus similitudinem adscribimus, revera pertineat).

Crescit in silv. tropic. prov. Esmeraldas.

G. 12 HETEROPSIS KUNTH.

Flores, in spadice stipitato, innappendiculato, nudi, sessiles; *stam.* 4, filamentis late linearibus, antheris 2 thecis, apice dehiscentibus; *ovarium* obpyramidato-prismaticum, apice truncato, medio stigmatiferum, superne biloculari; *loculis* biovulatis; *ovulis* anatropis, erectis, placentae basi septo adnatae affixis.

Frutices scandentes ramosi; *foliis* alternis. *vagina* petioli axi adnata petiolo (seu geniculo) brevi; *lamina* subcoriacea lanceolata, oblonga, v. oblongo-elliptica; *spadice* pedunculato stipitato cylindraceo; *spatha* brevi, convoluta, apiculata, mox caduca.

I. H. *Ecuadorensis* sp. nov. *caule* lignoso, scandente, ramoso; *ramis* tenuibus, striolatis, basi persistente foliorum delapsorum annulatis; *internodis* 3-4 ct. longis; *petiolis* (seu geniculis) 3-4 mm. longis, basi amplectentibus, sursum compressis in sicco convolutis; *limbis* subcoriaceis, sub lente minutissime pellucido punctatis, oblongo-ellipticis, basi obtusiusculis, apice 1-2 ct. cuspidatis; *costa* supra impressa, subtus leviter prominente, obtusa; *nervis* tenuibus, in sicco utrinque prominulis, I in nervum collectivum sinuosum, 1 $\frac{1}{2}$ mm. a margine remotum (alteri sub marginali parallelum) confluentibus, II (inter I binis-ternis) tenuioribus, cum I valde irregulariter reticulatis et plerisque ad nervum collectivum pertin-gentibus vel antea deliquescentibus; *pedunculi* 8-10 mm. longis, subclavatis; *spatha* subelliptica, 4 ct. longa 2 $\frac{1}{2}$ ct. lata, apice breviter aristato-acuminata, subcoriacea, mature caduca; *spadice* breviter (3-4 mm.) stipitato, subcylindrico, 4-5 ct. longo, 5-6 mm. crasso.

Crescit in silv. subtropic. secus fl. *Pilatón* prov. *Quitensis* et in tropicalibus prov. *Guayas* prope "El Naranjito."

(Continuará)